






15255





Ex Libris  
JOHN AND MARTHA DANIELS












# VEGETII

RENATI ARTIS VETERINA-  
RIAE, SIVE MVLOMEDI-  
cinæ libri quatuor, iam primum  
*typis in lucem editi. Opus sane in rebus  
medicis minime aspernandum.*

B A S I L E A E

1528





ILLVSTRISSIMO PRINCIPI FER.  
dinando Regi Hūgaria, Bohemia &c.

Transuexerat olim, Ferdinande Regum serenissime, ad nos D. Hermannus Inclytus à Neuenare Comes, Vegetij Renati artem Veterinariam, ut eam doctissimorum uirorum auxilio, à mendis, quibus scatebat, expurgaremus, & typis excussam ederemus in publicū. Sed cū exemplaris infinita deprauatione desperantes ab incepto negotio deterriti fuissetus, codicemq; illum peructustum rursus ablegassetus, instigauit ad desperatū manus redeundū, q; tuæ Serenitatis nomini opus hoc dedicādū afferebat, nimirū ut cui nō ingloriosum esset, et egregios, et ualidos equos habere etiā p multos, quos hic author & à peste præseruari, & iam egrotantes sanari nō incommode perdocuit. Verū etsi non integre natiuo nitori me redditurū considerē, sperabam tamē me & Cels. tuæ rē gratā, & posteris ansam id studiū diligentius pquirēdi præbiturū. Habeant itaq; p Serenitatē tuā et cæteri, Vegetiū hūc, nostro labore à uitijis pmodū infinitis expurgatū. quāq; sint pleraq; quæ absq; αὐτοῦ γράφῃ restitui posse nō crederē, quæ, ubi nūsum fuerat, uel obelo, uel asterisco, uel alia quādā notula cōsignauimus. Nonnulla, licet immutatis uel uerbis uel uerborum ordine, sententias tamen plenas, & intellectu faciles insinuare comperimus, quæ lectoris iudicio immutanda uel corrigenda reliquimus. mei enim candoris non esse censebam si mea alienis ingererē. Quædam etiam morborum, simul & herbarū, remediorū uel uocabula licet immutanda cognosceremus, constās tamen exemplariorum consensus, ne qcūq; immutaremus prohibuit. nā ita fortassis scriptū ab authore nō uulgares neque ineruditi persuadebant amici. quod eo facilius effecerant, & q; nō ignorem Antonij Codri de hoc authore iudiciū, & q; sciam apud plerosq; medicos permulta esse uel corruptissima. Quædam etiam cū uel uariarent exemplaria, uel abundare uiderentur, aut etiam uel parum, uel nihil ad sententiā facerent, parenthesi interdum cinximus. De his Serenitatem tuam admonendam duximus. Precantes nostrum hunc laborem (qui certe quantus fuerit, nemo facile crediderit) hilari fronte suscipere nō dedignetur. Vale felix.

S.

M.

T.

Obsequentissimus Ioannes Faber  
Emmeus Iuliacensis Typographus.  
Basileæ.



# SERENISSIMO

AC ILLVSTRISSIMO PRINCIPI D. FER-  
dinando, Regi Hungariæ, Bohemiæq, Archiduci Aus-  
triæ, Duci Burgundiæ, &c. Domino suo Cle-  
mentissimo.



Nter tot, tamq, uarios & ancipites fortu-  
næ casus, quos infracto hucusq, animo  
superasti, Ferdinande Rex Sereniss. illud  
merito in te miramur omnes, quod in ca-  
ætate cōstitutus, ita animum institueris,  
ut neq, in rebus prosperis audaciæ, neq,  
in aduersis timiditati unquam induleris.

Nam tot iam partis abste triumphis, nihil immoderate, ni-  
hil arroganter egisse uisus es. Sed ne in ipso quidem bellico  
furore mentē tuā passus es à recta ratione dimoueri, quod  
heu nimīū multis contigit, alioqui laudatissimis uiris, ma-  
gno suo, suorumq, malo. Alios non paucos bellum ipsum  
exitialis rerū humanarū pestis, inhumanitatē, feritatem, et  
crudelitatem docet. Tu contra in ipsis bellorū tumultibus  
mansuetior, in militiā reddi cultior uideris. Quā rem maio-  
re etiam admiratione dignā facit Celsitudinis atq, dignita-  
tis tuæ consyderatio. Tu quippe citra omnē controuersiā  
post Cæsareū numē secundū in rebus humanis obtines lo-  
cū. Quē qdē ita & magnanimitate & gratia tueris, ut nez  
mo uideri possit eo obtinēdo dignior. Intellexerūt hoc Bo-  
hemi & Hūgari, qbus nec uisus antea, nec plene cognitus  
inter tot undiq, cōpetitores dignissimus es iudicatus, qui  
triusq, regni gubernacula suscipies. Mirātur multi Cn. Pō-  
peiū, q, Mithridatē regem. 70. regnorū cū tota ferē Asia, na-  
tura imbelli; Mariū, q, Cymbrorū colluuiē: Cæsareū, q, Gal-  
los agrestes tunc hoīes bello superant. Te adhuc puero Sue-  
uorū gens, quorū uires ipsis aliqñ Romanis formidabiles  
erāt, tuo. i. Austriæ Imperio accessit, idq, felicissimo quodā  
auspicio



## EPISTOLA

auspicio, uidelicet ut ex tam auspicato exordio Regni tui, homines intelligerent, ipsos aliquando, ditionis tuæ terminos longe lateq̃ propagandos esse. Venetos gentem totius Italiae florentissimam, ad conditiones acceptandas sola nominis tui auctoritate compulisti, receptis oppidis alijs quot, quæ Maximiliano Cæsari, iniuste ablata, iure debebantur. Accesserunt etiam finibus tuis pars lacus Benaci, nec non alpium, ac florisulij loca quedã per Venetos iam dudum uiolenter occupata. Heluetios multo iam tempore graues illis, quos eo in tractu tibi habes subditos, facile cõtines tua auctoritate, Satius iudicantes, quietem agere, quàm quicquam quod tu uiolari nolis, attingere. Vnigaricum bellum, quod prædonis illius Reguli inuidia exarserat reſtrinxisti, ut prius quã copiae tuæ, ditionis illius fines attigisse crederentur, ille iam toto regno pulsus exularet. Sunt hæc quidẽ argumẽta summæ fortitudinis & prudentiæ, maioris etiam felicitatis tuæ. An nõ uidemus hoc agere deum? ut Cæsarea maiestas ac tua Celsitudo tantum emineant potestate, quantum modestia & bonitate excellitis. Amisit nuper Germania decus et ornamentũ suum Diuum Maximilianum Auum uestrũ, Cuius in re bellis ca non inferior Scipione, uirtus atq̃ industria habebatur: Amiserat ante Philippum patrem, adeo amabilem & charum omnibus mortalibus, ut pulcherrimum Titi & Vespasiani elogium illi iure competierit, Deliciæ generis humani; sed deus qui nunquam deest rebus humanis, quanto cum foenore, quod perijisse uidebatur, refarciuit, excitans nimirũ duo ornamenta, duo humani generis præsidia, quorum auspicio, boni ad excolendas uirtutes accendantur, mali uero benefacere discant. Sed hæc epistolaris non cõprehendit angustia: celebrabunt ea, quibus & plus otij & ingenij erit. Aperuisti tu uel solus campum patentiſſimum, ubi & ingenium & eloquentiam exerceant omnes.

nes.



# DEDICATORIA.

nes eruditi. Sane iniquum fuerit, nos ita suspicere antiquitatem, ut nostra, cum non sint inferiora, contennamus. Ego, ne inter aulicos tuos, solus nihil agere uidear, chartaceum munusculum tuæ offero Serenitati, Vegetij inquam Renati, eius qui de re militari libellum cōscripsit, artis Veterinariæ siue Mulomedicinæ opus, multis seculis absconditū. quandoquidē equos habere & multos & bonos regij decoris esse uidetur, quos non tam ad pompam, quàm ad res gerēdas alere cordati homines solent. Qua in re Mulomedicorum opera minime contemni debet. Hoc itaq; opusculum Beato Rhénano, necnon Ioanni Emmeo, conterraneo meo, uiris cum eruditis, tum mihi amicissimis, primum commisimus, ut illorum opera castigatum exiret in uulgus. Nam erat propemodū infinitis locis corruptum. Verū cum Beatus ille uarijs obstrictus negotijs muneri obeūdo adesse nō posset, solus Emmeus, nō absq; summis laboribus, operi castigando manum applicuit. Huius igitur industriæ debetur, quod ab infinitis uindictatum mendis nūc podit in lucē. Tu uero Serenissime Rex Ferdinande, ut illos tui gratia potissimum susceptos labores recōpenses, bonas literas, quiq; illas sincere colunt, pro regia indole tua, quemadmodū hactenus fecisti, ornare & tueri non desinas. id enim tuis pulcherrimis factis, non parum splendoris adiūciet. Interim Deum Opt. Max. precor, ut imperium tuum, perpetua felicitate coretur ad honorem dei, & utilitatem Reip. Christianæ. Meq; tibi obsequissime commendo Ferdinande Regum Illustrissime. Ex arce nostra Bedburtina, quarto Nonas Iulij. Anno domini  
M. D. XXVIII.

E. R. Maiestatis Tuæ  
deditissimus, & obsequentissimus Here  
mānus Comes à Nuenare, Præpositus  
primariæ adis Coloniensis.



# ELENCHVS TI=

TVLORVM CAPITVM LIBRI PRIMI.

- Quibus signis ægritudo animalium cognoscatur. 1  
Quot sint genera morborum. 2  
Signa morbi humidi. Cap. 3  
Signa morbi aridi. 4  
Signa morbi subtercutanei 5  
Signa morbi articularis. 6  
Signa morbi farciminosi. 7  
Signa morbi subrenalis. 8  
Signa morbi elephantiasis. 9  
Cura morbi humidi. 10  
Cura morbi aridi. 11  
Cura morbi subtercutanei. 12  
Cura morbi articularis. 13  
Cura morbi farciminosi. 14  
Cura morbi subrenalis. 15  
Cura morbi elephantiasis. 16  
Causæ & curæ generales morbi mali. 17  
Potio anniuerfaria Physica. Cap. 18 lib. primi.  
Compositio suffimentorum contra morbum maleum. 19  
Alia compositio suffimentorum uehementior, ad lustranda  
animalia, quæ & fascinum tollit. 20  
De ratione flebotomi. 21  
Quæ diligentia adhibeat in sanguinis detractiōe. 22  
Castrata animalia non deplenda. 23  
Admissum facientes non deplendos 24  
In quibus passiōibus & ex quibus locis sanguis sit auferendus. 25  
De his quibus sanguis in ungulam tollitur. Alias. Qui un-  
gulam cogunt, uel ciecerint, quomodo sanguis tollatur. 26

De Epist



# I N D E X .

De epistomicis, uulsis, colicis, strophosis, & q morbo sub- renali tenentur, unde sanguis tollendus sit.	27.
De ratione foci atq; cauterij.	28
De passione & curis febrium.	29
De lassitudine, quæ uidetur febribus similis.	30
De febribus internis.	31
Si in Autumno februerit.	32
Si æstate februat.	33
Si hyeme februat.	34
Si ab indigestione februat uel pletura.	35
Si ex uulnere oris aut faucium februat.	36
De coactionibus. i. de nimia lassitudine.	37
Quæ genera ægritudinum ex coactione nascantur.	38
De diuersis passionibus uentris	39
De aqualiculo, i. stomacho.	40
De colo & coli dolore.	41
Cura longanoni & ilei.	42
Causæ & curæ strophæ.	43
De lumbricis, collicis, tineis & pediculis.	44
De clysterijs ad curam lumbricorum & tinearum.	45
De calculosis iumentis.	46
De emphragma.	47
De ileo.	48
De dolore uentris.	49
De dolore coli.	50
De dolore uesicæ.	51
Colli & lumbrici qua cura tollantur ad manum.	52
De syncopatis & confixis.	53
De his qui sanguinem per nares emittunt.	54
De infestatione sanguinis.	55
Quæ adhibenda est diligētia ut animalia sana per- durent.	56
Potio æstiuæ.	57

Potio hy



## I N D E X .

Potio hyemalis.	58
Potio in autumnno & uere præbenda.	59
Potio omni tempore necessaria.	60
De difficultate urinæ.	61
De Stropho.	62
De dorso curando.	63
De potione probatissima Diapente.	64

## CAPITA LIBRI SECVNDI.

De ualitudinibus capitis.	1
De Appioſo.	2
De Frenetico.	3
De Cardiacis.	4
De Rabioſo.	5
Qua ohſeruatione curentur cyclo animalia, at unũ exemplariorum habebat, cibo.	6
De cerebro commoto.	7
De capitis dolore.	8
De Diſtentionibus.	9
De Appioſo.	10
De Rabioſo.	11
De Inſania capitis.	12
De Chirurgia.	13
De Auribus.	14
De pilis qui naſcuntur in oculis.	15
De Suffuſione oculorum.	19
De paracentheſi oculi.	17
De Lunatico oculo.	18
De Staphylomate oculi.	19
Ad album de oculo tollendum.	20
De ſuffuſione curanda per nares.	21
De diuerſis paſſionibus oculorum.	22



# I N D E X .

De strumis iumentorum.	23
De glandulis	24
De pullaribus	25
De fistula maxillæ, uel de conficiendo collyrio fistulari.	26
De expositione fistulæ.	27
De tumore faucium uel capitis.	28
Si ex pletura sanguinis fauces tument.	29
De intomatibus. i. tuberibus.	30
De lingua incisa.	31
De gingiuis & dentibus.	32
De osse fracto.	33
De cartilagine narium si sanguis fluat.	34
De palato si uena se non clauferit.	35
De genere & qualitate mucorum qui per nares fluunt.	36
De cuserino. i. cū post cursum sanguis de naribus fluit.	37
De polyposo	38
De siderato.	39
De obseruatione flebotomi.	40
De ceruicibus	41
De malandria. i. de uulneribus ceruicis.	42
De distillatione ceruicis.	43
De distillatione scapularum.	44
De armislæsis.	45
De genu commoto uel basi.	46
De fractura articuli, uel cruris, uel coxæ.	47
De flegmone, marmore, siue mallonibus.	48
De aquatilibus & ozœnis.	49
De pedibus reumaticis, siue uentosiss.	50
De impetiginibus.	51
De uligine.	52
De podagra iumentorum.	53
De orthocolis siue stillosis.	54
De pedibus & ungulis.	55



## I N D E X .

Si pulmunculum ad aperturam fecerit.	56
Si ex ungula uerit iumentū, & si suffusione pedū patiat̃.	57
De pedibus attritis siue mollibus.	58
De dorso confirmando.	59
De dorso curando iam læso.	60
Si pulmunculus nascitur in dorso animalis.	61
Si uulnus fecerit.	62
Vt pilī renascantur.	63
De denigrandis pilis albīs.	64
Vt pilī nigri albelcant.	65

## CAPITA LIBRI TERTII.

De obseruanda boum sanitate, Rubricæ cap.	1.
De morbis boū, & primo de maleo.	2. cap. Rub.
De cruditate.	cap. 3. Rub.
De febre.	cap. 4. Rub.
Si uermes animal fecerit.	cap. 2. lib. 3.
De cura lumborum.	3
Quibus signis dolor renū indicetur.	4
De internis musculis renū.	5
Si talus exeat animali.	6
De dolore renū.	7
De tumore testium.	8
Si natura reuocari non possit.	9
Si iumentum sanguinem minxerit.	10
De dysenteria.	11.
Si ociosum animal sanguinem mingat.	12.
Si animal sanguinem euomat.	13
Si percussa uena claudire non possit.	14
De indignatione uesicæ.	15
De fluxu uentris.	16
De uerrucis.	17



# I N D E X .

De uitijs coxarum.	18
De laccis gambarum.	19
De gambofo,	20
De his quæ læduntur à rotis.	21
De syrmatiko. i. quod coxam subito trahit.	22
De morbo alienato.	23
De roborosis.	24
De hydropicis.	25
De sarcoftis.	26
De tympaniticis.	27
De lienosis.	28
De implectico.	29
De phragmatico.	30
De eo qui aquam timet.	31
De spafmo.	32
De epilepfia.	33
De eo qui aquam reuomit.	34
De fideratitio.	35
De percuffo à sole.	36
De cruditate.	37
De bulimo.	38
De anhelitu.	39
De æftu,	40
De paralytico.	41
De intrinsecus rupto.	42
De infania.	43
De pletura ex hordeo.	44
De paffione pulmonis.	45
De eieronica, uel orthotonico, uel ortholiftophico.	46
De opifthotonico, & empifthotonico.	47
De lethargico.	48
De morbo regio.	49
De bili, i. coleribus.	50



# I N D E X.

De biliarida.	51
De coli passione.	52
De uomica.	53
De coriagine.	54
De stomachico.	55
De icterico.	56
De stropho.	57
De dolore iecoris.	58
De inflatione uentris.	59
De intestini uexatione.	60
De tussi.	61
De tussi quæ uenit si quid faucibus hæserit.	62
De tussi ex perfrictione.	63
De tussi à colibus.	64
De tussi ab interioribus.	65
De uulsis.	66
De tussi quæ ex humorum acerbitate generatur.	67
Ad tussim siccam, uel ad suspirium, & arteriam exasperatam.	68
Ad uomicas & tussim.	69
De diuersis potionibus uulforum & tussientium.	70
De scabie.	71
Si animal foeno malo lædatur.	72
Si hordeo malo lædatur.	73
Ad fascinum.	74
Remedium contra omnes morbos.	75
Si animal lædatur dum accipit potum.	76
Si animal à uenenatis bestiis mordeatur.	77
Si bustrephem comederit animal in foeno.	78
Si uispera percusserit animal.	79
Si araneum comederit.	80
Si sphalangius percusserit animal.	81
De mure araneo.	82



# I N D E X.

Ad ictum scorpionis.	83
De canis rabidi morfu.	84
Si animal comederit sterqus gallinarum.	85

## CAPITA LIBRI QVARTI.

De numero & positione ossium	1
De numero & qualitate membrorum.	2
De numero & qualitate neruorum.	3
De qualitate uenarum.	4
De indicatijs & ætate equorum.	5
De signis quibus agnoscitur patria.	6
De temporibus uitæ.	7
Potio ad reficiendum iumenta, & diapente.	8
Ad tussim & uulsos.	9
Ad collos, uermes, uel tineas.	10
Aduersum omnia genera morborum.	11
Confectio suffimentorum salutaris.	12
Confectio pulueris quadrigarij.	13
Compositio caustici.	Ca. 14
Compositio malagmæ.	15
Compositio collyrij fistularis.	16
Compositio malagmæ crudæ.	17
Compositio syncrismæ.	18
Compositio traumatici.	19
Compositio malagmæ basilicæ.	20
Alia compositio malagmæ.	21
Compositio prima anacollimatis.	22
Compositio alia malagmæ crudæ.	23
Compositio malagmæ ad uligines.	24
Compositio malagmæ ad neruos.	25
Compositio traumatici.	26
Compositio collyriorum.	27
	b 3



I N D E X .

Sequuntur medicamentorum genera quædam, ad finē  
quarti libri adiecta. Folio .70.

Cephalicum emplastrum ad claudenda uulnera.

Medicamentum consuetum.

Chlora medicamentum ad uulnera lympidanda.

De tetrapharmaco, ad uulnera claudenda.

Glicium, ad uulnera sordida & cancrofa.

De ossoclari, ad omnia ossicula.

De styptico, ad uulnera humecta.

Medicamentum ad omnia uulnera claudenda.

Implectoricum, ad caua supplenda.

Ad oculorum rupturas, & glaucomata.

De syncrisma, aliud.

De lipparijs.

Traumatici compositiones uariæ, ad uaria.

Caustici compositiones aliæ ad diuersa.

De malagmatis quibusdam.

Emplastrum quoddam.

De ceroto.

Fomentum ad tumores, uel quamlibet duriciam.

Potio hyemalis.

Potio æstiuallis.



# VEGETII RENA

TI ARTIS VETERINARIAE, SIVE  
MULOMEDICINAE, PRAEFATIO.



Mulomedicinae apud Græcos Latinosq; authores non fuit cura postrema. Sicut enim aīalia post hoīem, ita ars Veterina post Medicinā secunda est. In equis enī ac mulis & adiumenta belli, & pacis ornamenta consistūt. Sed quoniā minus dignitatis uidebatur habere professio quæ pecudū promittebat medelā, ideo minus splendidis exercitata, minus eloquentibus collata docetur in libros, Licet proxima ætate et Pelagonio non defuerit, & Columellæ abūdauit dicendi facultas: uerū alter eorū cū rusticæ rei præcepta conscriberet, curas aīaliū leui admonitione perstrinxit: alter omīssis signis causisq; morborū, quasi ad doctissimos scriberet, tam magnæ rei fundamenta neglexit. Chiron uero & Absirtus diligentius cuncta rimati, eloquētiae inopia, ac sermo uis ipsius uilitate sordescūt. Præterea indigesta & confusa sunt oīa, ut partem aliquā curationis quærenti necesse sit errare p̄ titulos, cū eisdē passionibus alia remedia in capite, alia inueniantur in fine. Additur etiā q, studio lucri quædam ita sunt compositæ potiones, ut pretium enorme contineant, & curæ taxatio, animalis æstimationem propē uideatur æquare: ut plerūq; aut parci homines, aut certe prudentes, aīalia sua canibus dedant, aut à dānosa curatione dissimulent. His & talibus rationibus inuitatus, cum ab initio ætatis alendorum equorum studio flagrarem, hanc operam nō inuitus arripui, ut conductis in unū Latiniis dūntaxat authoribus uniuersis, adhibitis etiam Mulomedicis, & Medicis non omīssis (nam Mulomedicinae doctrina ab arte Medicinæ non adeo in multis discrepat, sed in multis plurimisq; cōsentit) inquantum mediocritas ingenij patitur, plene ac breuiter omnia epitome congererem, causasq; & signa morborum omnium declararem. Nam si laus prima medicorum est genus ægritudinis in homine reperire, qui passionem suam & manu potest, & uoce signare, quāto magis in Mulomedicina necessariū creditur genus ægritudinis nosse, cum mutum sit aīal, & non possit propriū  
indicare



## P R A E F A T I O .

indicare languorem, & ab imperitis ad opus aliquod laborēque cogatur. Sic geminū subeat ex morbo & fatigatione discriminē. Aut certe neglectū, inueterata aegritudine nequeat sero curari. Sicut Mantuanus poëta diuino ore testatur: Morborūq; & causas, et signa docebo. Absq; dubio aut oīs cura uacabit, si genus passionis ignoretur. Ex inani p̄suatione illud generatur incommodū, ut honestissimus q̄sq; erubescendū ac uile credat iumentorū nosse medicinā. Primū, nullius rei scientia uilis est. Nā cum humanæ uitæ conuersatiōe aliud fugiendū, aliud uero sequēdum, nō est p̄fecta peritiā, nisi quæ utraq; cognouerit. Deinde, quis aestimet erubescendū talem peritiā quæ damna submo-  
als (aut saluti)
ueat? Nā sicut incolumitas iumentorum habet lucrū, ita eorū interitus afferre uidetur incommodū. Præsertim cū mancipia, quorum plebeia curatio nō putatur, sæpe uilioribus pretijs, quàm equi uendantur aut muli. Postremo siue ad uehendos locupletes aptos, siue in circi cōtentione uictores, siue in prælijs (ut ita dixerim) probatissimos bellatores, acerrimū studiū amoremq; constat habere dominorū. Nec immerito uoluptati natū animal (salutis) gratiam meretur ab hoīe. Quis aut nosse curas iumentorum erubescendum putet, cum optima iumenta habere gloriosum sit? Quis uitupationi det id posse curare, quod laudi ducitur possidere? Forsan ipsa opera Mulomedicorū uidetur abiectior, notitia aut curationis nō solum honestissimis, sed etiā disertissimis conuenit: ut prouisione & ordinatione sollerti curatis animalibus, & damnis careant, & uoluptatibus perfruantur. Sed alij morbi sunt, qui ea tantū aīalia, quæ occupauerunt, uexant; Alij etiam ab uno uel paucioribus quæ pereūt, in plura, quæ pariter stabulātur uel aluntur, in totos sæpius greges seuissima contagione transmigrant, ut quamuis sanū aīal intra breue tempus, alienæ aegritudinis afflante uicinia, repente depereat. Rectius est ergo eorum prius morborū & signa & causas prædicere, curasq; mōstrare, qui quodā trāsitu pluribus nocēt. Nam aduersus maiora dispēdia, maiorem sollicitudinē oportet impendi. Prima igitur iumentorum utilitas est domini, uel procuratoris, uel pastoris ipsius amor atq; diligentia. Comes enim semp est affectionis, industria: & incolumia cupimus quæcunq; diligimus. Domita aīalia aut præsepibus aluntur, aut pastu. Indomita latioribus nutriuntur in saltibus. Quotidie ergo, uel frequentissime speculari conuenit habitum iumentorum. Nam diligentibus morbus ipse se prodit.

F I N I S .



# VEGETII RE=

NATI ARTIS VETERINARIAE,  
SIVE MVLOMEDICINAE LI  
BER PRIMVS.

QVIBVS SIGNIS AEGRITVDO  
animalium cognoscatur. Caput. I.



CONTINVO ANIMAL QVOD  
ualetudo tentauerit, tristius inuenitur, aut pi-  
grius, nec consueto utitur somno, nec solito se mo-  
re transuoluit, nec requiem ut assumat accūbit,  
nec deputatum cibum assumit ex integro, & po-  
tum aut intemperantius accipit, aut omnino fasti-  
dit, stupētibus oculis, auribus flaccidis, erecto ui-  
su, turpi pilo, exhausta sunt ilia, fit spina rigidior, anhelitus crebrior aut  
grauior, incessus ipse, quo maxime notatur, segnis ac nutās. Cum huius-  
modi signa in iumento unum uel plura conspexeris, statim illud separabis  
à cæteris, ut contagionem non inferat proximis, et facilius in solo iam cau-  
sa morbi possit agnosci. Si diligenter habitum, post unam, secundam, uel  
tertiam diem ab illa mœstitia fuerit absolutū, nihilq; resederit in corpore  
ipsius quod putetur ambiguum, scito ex leuioribus causis illam uenisse tri-  
stitiam, & animal consuetudini pristinae esse reddendum. Nec exploran-  
di omittatur intentio nam frequentius inspicere debet & cautius, quod se-  
mel cœpit esse suspectum.

Quot sint genera morborum. Caput .II.

**M**orborum quid in diuersa sunt passionēs, sed uno generali uoca-  
bulo continentur, quod ab antiquis Malleus nominatū est, ipsa  
appellatione uim cladis periculumq; testantes. Sunt autem spe-  
cies Mallei numero septem: Humidus, Aridus, Subtercutaneus, articula-  
ris, ele



## ARTIS VETERINARIAE

ris, Elephantiasis, Subrenalis, Farciniosus. Signa omnium dicamus.

### Signa morbi humidi. Caput .III.

**H**umidus morbus est, cui de naribus pro mucis humor defluit male olens, & spissus, colore pallido. Huius grauatur caput, oculi lachrymantur, & stridet pectus, sit gracilis horrentibus pilis, tristis aspectu. quem profluuium atticum ueteres uocauerunt. Quandoque autem sanguinolentus humor uel croco similis per nares fluere coeperit, iam insanabilis est & uicinus morti.

### Signa morbi aridi. Caput .IIII.

**A**ridus autem morbus his agnoscitur signis: Nullus ei per nares supra solitum humor emanat, suspirat tamen grauiter, & nares habet extensas, ilia curuabit intrinsecus, et contractionem spinæ duriciamq; patietur, testiculi eius ita substringuntur, ut apparere uix possint, cibi parcius, bibendi appetentior ultra morem. Propter quod pulmone siccato, internum patitur ardorem, tensis oculis in obliquum respicit, nec facile cubet. Hunc suspirium uocant & insanabilem, nisi ab initio festina curatione subueneris.

al. t. cacabit.

### Signa morbi subtercutanei. Caput .V.

**S**ubtercutaneus morbus autem his proditur signis: Vulnera in corpore eius scabiei similia nascuntur, ex quibus humor effluit liquidus & uiridis, qui pruriginem mouet, ut scalpere parietibus uel columinis animalia sepe fricare compellat, quo ulcera corticem ducent. Huic nec humor per nares emanat, nec anhelat, nec cibum recusat, nec respuit potum. Propter quod diu bibet. Et ideo si cura non desit, ex hoc plurima iumenta liberantur. Quidam uero scabiem subtercutaneum morbum dicere tentauerunt, quod similia supradictis signis uideatur ostendere, & contagionem transferre per proximos, & tardius sanari. Sed quia nec necem, nec gregi infert facile periculum, à pestiferi illius mallei societate discretus.



discretus est, & scorsum ab illa dicetur.

### Signa morbi articularis. Caput .VI.

**A**rticularis autem morbus, quem ἀρθρίδης Græci uocant, per hæc monstratur indicia: Interdum paucis, interdum plurimis diebus ab articulis claudicabit, ut aut ictu calcis animalis alterius percussus, aut negligentia impactus, aut saxo uel fuste uideatur elusus. Sed hæc solet esse distantia, ut illa quælibet læsio loco figatur, hæc autem passio, quia erratica est, subito ad pedem alterum migrat. Præterea ossibus astringitur cutis, & ad tractum tractanti dura resistit, Rigescit spina, corpusq; contrahitur, pilus erectus & horridus, ac deformis aspectus, macie corpus affectum. Et quamuis non recuset alimenta, nec curat si desint, indies tamen deterior fit & tristior, difficulterq; curatur.

### Signa morbi farciminosi. Caput .VII.

**F**arciminosum uocabulum ex genere passionis euenit. Huiusmodi deprehenditur argumento: In lateribus & in coxis, & in uerendis quoque partibus, & præcipue in iuncturis membrorum, uel in toto corpore collectiones inflantur: rursumq; his uelut sedatis, aliæ renascuntur: cibum potumq; ex more recipiunt, macrescunt tamen. quia digestio eis plena non prouenit, hilares aspectu, sanisq; similes creduntur ab indoctis artis mulomedicinæ, quia exterius agitur causa; quibus imperita artificum sanguinem festinat auferre. Sed contraria ista curatio est. Nam affectis farcimino, quicquid superest uirium, tollit. In initio tamen ne morbus increseat, uel in fine cum iam uires redire cœperint, emissio sanguinis iuuat.

### Signa morbi subrenalis. Caput .VIII.

**S**ubrenalis morbus nō minus noīe, quàm ipsa passione monstratur.

A 2 Nam



## ARTIS VETERINARIAE

Nam animal uelut renibus lēsis, à posteriori parte deficiens, prodit mortiferæ necessitatis indicium, tuſſiet grauitē, horrebit aspectu, cuius duritia ex spinæ rigore proditur, partius polum, partius adpetit cibum. Huic quia tota uis morbi possidet lumbos, à femoribus incipit prima curatio.

### Signa morbi Elephantiasis.

### Caput. IX.

**E**lephantiasis autem dicitur ex similitudine elephantis, cuius naturaliter pellis dura & aspera, morbo nomen & in hominibus, & in animalibus dedit. Cuius signa hæc sunt: In toto corpore uredo nascitur, præcipue in dorso, squamas similes corticibus facit. In naribus, in pedibus etiam, & in capite, papularum feruor emergit, uel oxæne asperiores frequenter oriuntur. Priusquam hæc ostendantur indicia, uentre soluto erit, & marcescit, et aspere tuſſiet. Cuius os totum cum lingua asperum & simile creditur esse combusto. Quæ passio pullis à matre depulſis plerunq; perniciem consuevit inferre. Hunc diligenter curare cupientes, non ante deforis aliquo medicamento fouere contendunt, nisi prius positionibus datis, pestis eleuetur interior. Nā extrinsecus cepta medicamenta morbum non eximunt, sed ad interiora compellunt, & hac ratione periculum generant. In animalibus eiusmodi morbo laborantibus generalia ista sunt uitia: tuſſis aspera & crebra suspiria, spina contracta & rigida, macies semper increscens cum studium & alimenta non desinant, demissior ceruix, stupentes oculi, tardior incessus. Nunc signis omnibus generaliter singulariterq; digestis, singulorum morborū speciales, propriasq; curas oportet adiungere. Post hæc de generali minutione singulorum, et adustione docens, concludam librum primum.

## DE MORBORVM CVRATIONIBVS.

### Cura morbi humidi.

### Caput. X.

**M**alleus morbus si humidus fuerit, ita ut per utranq; uarem uirides defluant muci, inter exordia caput eius adhibita curatione purgandum est ita; Olei optimi uncias. 3. liquaminiſ floris uncia  
i. uini.



.i. uini ueteris cyathos. 3. sereno tranquilloq; die pariter commisces, & cum tepesceris infundes in naribus, caput religabis ad pedes, sensimq; iumentum impeditum compelles incedere, ut omnis humor emanet. († ad siphonem autem paulatim infundes non semel à cornu) Quod si sanguis postmodum coeperit fluere, nihil timendum, sed potius sciendum est, animal legitime fuisse purgatum. Post quod seuum caprinum resolutum oleo miscebis, sic infusis naribus exulcerationis illius mitigatur asperitas. Radicem quoq; laseris tonsam, & per fistulam uento naribus insitam, ut sternutum prouocet, adhibere commodum est. Caput etiam extrinsecus auriculasq; oleo calente diligenter perūges, & lana cerebro indita, ab omni perfrictionis necessitate munebis. Nasturtij quoq; semen bibendum dabis ex aqua. Præterea potionem dabis, qui diapenton uocatur, et hac ratione conficitur: Murræ, gentianæ, aristologiæ longæ, baccis lauri, rasuras eboris benetratas et cribratas æquis miscebis pōderibus, seruabisq; Exinde prima die unum coclearium cumulatū cū sextario uini ueteris, secūda die unum & semis, tertia autem die duo coclearia tepescēto mero aspersa, & diligenti agitatione permixta dabis ad cornu. Postea ex ceruice de matricali uena sanguinem detrahes, permixtūq; acerrimo aceto, omne equi corpus perunges, & contra pilum diligenter fricabis, ut ad similitudinem glutinis adhæreat. Iumentum quoq; in loco calido cōstitues. Si cibum fastidit, † æstate dūtaxat farinæ hordeacæ sextarium unum quinque sextarijs aquæ permixtum equo dabis in potu. Triticeam quoq; farinā simili mensura & ratione offeres a† bibendum. Si autem fastidit, nō ideo aliud dabis, quousq; hoc ex ista necessitate sanitatem percipiat. De palato quoq; postea sanguinem detrahes, ut omni ex parte, si qua morbus prægrauare coeperit, releuetur. Scito nisi diligenter occurras, hūc esse periculosissimū morbum. Nam cito in suspirium, hoc est, anhelitum transit, & spem omnem salutis excludit.

Potio diapente.

† al. statim.

## Cura morbi aridi.

## Caput .XI.

**A**Ridus uero morbus, qui & suspiriosus præcipue dicitur: & hic negatur à quibusdam posse curari, propterea, quod phibiti, quæ

A

3

homini



## ARTIS VETERINARIAE

hominibus mortifera est, similis inuenitur. Quotidie enim macie crescente, exilior redditur, penitusq; siccatur. In omni autem ratione medicinae, facilius est quae abundauerint diminuere, quam quae uidentur deesse supplere. Salus tamen iumentis etiam in hac passione praestatur, si inter principia possit occurri. Sanguinem siccis detrachere contrarium est, Sed uino & oleo sufficienter admixto & tepefacto, perungendum toto corpore animal est, Ita ut caput & maxillae, & extrinsecus fauces eidem largius infundantur, & contra pilum usque ad sudorem diutissime confricentur. Intrinsecus autem à prima die hac potione curandum est: Succum ptisanæ, adipem suillum remissum, & amilum ex melle passo quae decoctum per cornu in potione dabis, ut canalis gutturis eidem, maxillarumq; compago laxetur, quam siccitas astrinxerat morbi. Quo facto, in loco calido stabit. Infusum hordeum herbamq; uiridem, si inuenta fuerit, debet accipere, ut omni ex parte periculosa ariditas temperetur. Consequenter talis eidem potio praeparetur; Passi optimi sextarium unum, iridisillyricæ unciam unam, piperis nigri semiunciam, croci scrupulum, mirrhæ († trigonitis) semiunciam, pollinis thuris unciam unam, oua cruda quinque pariter mixta prima die dabis ex integro, ita ut per triduum ipsam misceas semper & offeras, ut tam grauis morbi asperitas, potionis dulcedine mitigetur. Post hæc, melle, butyro, axungia, salibus, et († pauulcaophis) pro æqua omnium portione confectis, succo ptisanæ ac passo inuolutis, adtinctum animal replebis, & die prima quinque pillulas, sequenti septem, tertia die nouem daturus ex more. Expensis autem his, nec ungere cum uino & oleo tepefacto desit industria, nam amarissimus morbus cum sit, aliter non potest, nisi amaris potionibus solui. Contraria enim non nisi contrarijs medicinis curantur. Potionem diapenten, sicut superius monstratum est, non solum per triduum cum uino, sed per dies plurimos dabis, ut tantum discrimen possit euinci. Quod si grauior tussis & strangulās urgebit, accipe sabæ fractæ sextarium unum, seui caprini uncias tres, allij capita maiora tria, permixta decoques, & cum passo, uel succo ptisanæ hordeaceæ tepidum dabis ad cornu. Quod si tardius profecerit ista curatio, ficus siccae pondera duo diligentissime tondis in pila, foenugræci sextarium



tarium decoques, quousq; aqua ad medietatem ueniat, post colabis, et fœnugræcum in mortario cum sicu conteres, allij quoq; uncias tres contundes similiter in mortario, et tam rutæ quàm apij fasciculos ternos: quibus oïbus pariter mixtis diligenter tritis, addis dracontij uncias duas. Aqua in qua fœnugræcum coctum fuerit, superfundis, potionemq; facias quæ per cornu possit effluere: quam etiam tuſſientibus uel uulsis aut ruptis animalibus per triduum dabis. Sequens remedium ad aridum morbum: Inter nares iumentis scalpello secabis, & aquam frigidam per fistulam latam eius ori suppones, naresq; ipsius assidue diebus plurimis merges, ut suspirium distabescat in aqua. Potionem quoq; ei quotidie dabis huiusmodi: Succum ptisanæ cum seuo caprino decoctum, sextarium unum, sulphur, uinum, thus quoq; masculum æquis ponderibus deteris atq; commisces: ex eo coclearea singula diebus singulis cum ptisana permixta defundis ad cornu. Cum autem coeperit esse ualidior, de ceruice sanguinem detrahes, additoq; aceto animal perfricabis.

### Cura morbi subtercutanei. Caput .XII.

**S**ubtercutaneus morbus, cum humor pestifer intra corium & uiscera com meat, hac ratione curandus est: Fistulam ei facies uel cauterium, inter armos eius & uentrem loco consueto ad mensuram incisa cute, die sereno, & si spaciū est, luna minuente, indis ut mos est, per quā oīs ē uisceribus humor educitur, coloris aurei uel crocei, languoris tabe corruptus. Quæ si minus traxerit, radicē herbæ tytimali eodem uulnere inferes septem diebus, quæ residuū uirus educat. Est et aliud remediū. Radiculā quā qdam cōsiliignē uocant, qdā pulmonaceā, qua mulo medici frequēter & bubulci utuntur, in pectore aīalis hac ægritudine laborātis eatenus pones, ut acuto cuprino circines locum. Postea corio pforato radiculam interseris, quæ ibidem spōte tam diu permanebit, quousq; cutis quatenus cuprino signata, in putredinem sit uersa, & à toto corpore ad illum locum humor trahatur, & per uulnus emittatur. Hinc portionem diapenten superius designatam, cum uino ueteri optimo, per triduum, uel si necessitas erit, p dies plurimos dabis. Apium quoq; uiride, & baccas



## ARTIS VETERINARIAE.

Et baccas lauri. uel istae res si non inuenirentur, lauri et cucumeris syluatici folia, per partes minutissimas concides, hordeoque miscebis, ut animal sicut est potione diapenton, ita ex cibo sentiat medicinam. Huic tamen aquam tepidam cum farina hordeacea uel triticea dare te conuenit, et in loco tepido stabulare. Nam frigus humoris augmentum est, et reumatis. Cibum quoque magis siccum quam uiridem in hac passione debet accipere, et exerceri uehementer, ut sudore siccetur humor infestus.

### Cura morbi articularis. Caput XIII.

**A**rticularis morbus his declaratur signis: Claudicabit alternis pedibus, modo prioribus, modo posterioribus, et quasi tumor eidem in articulis circa coronas, uel certe in genibus apparebit. propterea quod pestilentia morbi corruptus sanguis, nervos et uenas implet, et laedit atque debilitat. Huic sanguinem primo de ceruice, hoc est, de maxillari uena detrahes: quem aceto acerrimo permixtum, per totum animalis corpus induces, ita, ut illa loca, quae uexata sunt, diligentius ungas. quia creditur sanguis emissus est corpore, et corpori rursus cum aceto impositus, uitia morbosa siccare. Quod si uel in genibus, uel articulis se morbus ostenderit, de eisdem locis sanguinem detrahes, cui adijcies cretam cimoliam, id est, albam, urticae libram, tres sextarios aceti, cimini triti libram, resinae frixae libram, picis liquidae libram, salis communis pugillum, steracis babulinum recens quantum creditur posse sufficere; ex hoc ubicunque tumor apparuerit diligenter saepius illinies. De palato specialiter sanguinem detrahes, ne contagio caput occupet. Ab armis quoque deplendum est, si in prioribus pedibus claudicatio apparuerit. Vel certe de coxis auferendus est sanguis si a posterioribus coeperit claudicare. Dabis quoque ei potionem aduersus omnes morbos probatissimam: Centauream, absinthium, peucedanum, serpillum, sagapinum, betonicam, saxifragam, aristologiam rotundam haec omnia aequis ponderibus tondes diligenter et cernes: si febrit animal, cum aqua: si uero non febrit, cum uino optimo dabis, ut singulis diebus per sextarium uini uel aquae tepidae cocti praedicti medicaminis singula maiora coctlearia plena et cumulata commisceas, et per fauces dige

Potio probatissima  
contra omnes morbos.



ces digerat, ut amaritudinem morbi herbarum amaritudo compugnans possit expellere.

Cura morbi farciminosi. Caput .XIIII.

**F**arciminosus autem morbus à similitudine farciminis appellatus est; quia uelut per fistulas quasdam inter cutem & carnem corruptus humor emanat, & per totum corpus collectiones plurimas facit, et alij uelut minuentibus alij rursum nascuntur. Sed passio licet contagiosa sit, facilius tamen inter principia curabitur. quia interna eorum adhuc sana sunt, sed corruptus humor ex morbo, inter cutem & carnem uersatur. Huic tamen in initio tantummodo, antequam incipiat marcescere, aut in fine, cum iam bene fuerit reparatum, detrahendus est sanguis. Nam in media passione si flebotomia uti uolueris, egrotum animal nequaquam curabis. Sed collectiones quasque fecerit, inuri rectis cauterijs conuenit: & ut efficacius prosint, cuprinis cauterijs est utendum. quæ uulnera pice liquida, admixto oleo & melle, curantur. Potiones catharticas, uel nimis amaras debet accipere, id est, diapenten cum uino, sicut superius dictum est, quæ ad omnia genera morborum animalium efficaciter prodesse consuevit. Præterea radices ebuli lib. .i. infundis per triduum sextarijs tribus uini optimi. Post semiuinciam optimi aloes, cetaureæ unciam. .i. opopanacis unciam. .i. diligentissime teres, & de illo uino, in quo ebuli radices infusæ fuerint, sextarium. .i. mittes, & tepidum per cornu dabis. Quam mensuram triduo custodire te conuenit, ut etiam per uentrem huiusmodi catharticis potionibus digeratur humor infestus. Quæ exercere in cursu, quousque ad plenum sudorem ueniat, sæpius conuenit: & curatum obseruatione prædicta, in pascua mittes, ut diu noctuque æstiuo tempore sub diuo & libero aëre pascatur, quatinus & uarietate herbarum oblectatus, & solis calore siccatus, rursumque noctis aura & rore contactus, facilius digerat morbum.

Cura morbi subrenalisis. Caput .XV.

**S**ubrenalisis morbus, ut periculis plenus est, ita ad intelligendum aptissimus inuenitur. Nam renes iumentis occupat atque dissoluit. Propter quod animal in primis partibus alacre, posteriora trahere consuevit. Huic hac ratione succurratur: De utroque latere, uel de femore incisus competenti loco uenis, copiosus sanguis emittatur, qui acri aceto permixtus, per omne cor-

B

pus, &amp;



## ARTIS VETERINARIAE

pus, & precipue super renes animalis inducitur. Potionē notissimā diapenten ad cornu per os debet frequēter accipere. Sed & per anū calidissimis speciebus clysterij ingestioe curandū est. aloes unciā 1. pyretri unciā 1. euphorbij unciā semis, pulegij bene triti unciā 1. baccarū lauri unciā 1. castorij semi unciā, seminis sinapis uncias 3. salis triti heminā: hæc oīa diligenter cōtusa in tres diuides partes, & diebus singulis cum aqua, in qua surfures tritici decocti fuerint, tepida, sicut curæ exigat ratio, quasi singulos semisextarios clystere per intestinum aīalis infundis, ut calefactis intrinsecus renibus, resolutus humor possit per uentrē cū stercore e nitti. Præterea lumbi ipsius oleo laurino uino calido permixto confricandi sunt uehementer & sæpe, ut deforis & intrinsecus acerbissima passio possit euinci. Cauteria quoq; renibus imponuntur, ut uis morbi ignis ardore siccetur. Danda quoq; est potio octo spetierū decocta, cuius in articulari morbo fecimus mentionem, quia in omnibus efficaciter prodest.

### Cura morbi Elephantiosis. Caput .XVI.

**E**lephantiosis morbi causa superius est indicata, cui talis est adhibenda medicina, ut non extrinsecus uredinem uel uulnuscūla ipsius curare tentemus. Nam morbus refugiet intus, & penetrabit uiscera, ac periculum gignet. Sed primū de matrice tollendus est sanguis, & acri aceto cōmiscendus; ac toto inducendus est corpori. Postea de palato, & si uires permiserint, de cæteris locis quæ morbus infestat, pro modo & tempore minuendus est sanguis, & cum aceto rursum imponendus. Pulli autem à matre depulsi, & ad stabula religati, præcipue solent hūc morbum incurrere. quia digestio cibi, qua in pascuis utebantur, primæ exercitationis aufertur, & nondū ad residendū robusti, ad præsepia stare coguntur. Elephantiosi morbo, & omnibus mali passionibus non solū diapente, cuius experimētis indubitatae sunt uires, & sine quo Mulomedicus mutilus est, sed hæc quoq; potio preparanda atq; seruanda: Mirræ trigonitis librā 1. thuris masculi lib. 1. corij malipunicifelibrā, piperis unciā 1. croci uncias 6. acaciæ rufæ selibrā, absinthij ponticifelibrā, serpilli libram 1. betonicæ librā 1. centaureæ libram 1. sagapini uncias 3. saxifragæ uncias 6. tensedoni uncias 6. hæc omnia tusa & bene cribrata cū melle optimo decoques, et in uase uitreo uel stagnæo recondita serua  
bis nam



bis. nam per uetustatem magis ualet. Ex quo medicamento singula cochlearia cumulata singulis animalibus morbidis cum sextario aquae calidae et tribus uncijis olei optimi permixta per triduum dabis. Vbi proficere coeperit, cum uino optimo et oleo dabis (sicut dictum iam est) cochlearia singula continuis diebus. Ex qua potione non minus quam diapede quolibet morbo correpta animalia liberantur. Pulli tamen beneficio aetatis euadunt facilius: saepe incurati moriuntur.

### Causae & curae generales morbi mallei. Ca. XVII.

**E**A quae ad morbi mallei execrabilis curationem pertinebant, abundanter constat exposita, sed tanta uis ipsius morbi est, ut nihil expediat omitti. Nam gregum in pascuis funestus interitus, animalium quoque in stabulis mortes innumerae ex ipsius contagione proueniunt, et ab imperitis uel negligentibus curam, aut diuinæ iracundiae imputatur aut fato. Denique sicut supra declaratum est, ab uno animali incipit ipsa perniciēs, et festinanter ad ceterorum transit exitiū. Propterea semper sunt separanda in quibus suspitio tantae pestis coeperit apparere, usque eo, ut etiam corpora mortuorum animalium quae ab illo morbo intercepta fuerint, exportanda sint ad ea loca, per quae aliorum animalium transitus non sit, et profunde obruenda sub terra. Nam et uiuorum, quae corrupta fuerint, et mortuorum foetidissimo odore, sana primo iumenta corrumpuntur ac pereunt. Cuius morbi causas plurimi Mulomedicinae authores reddere tentauerunt; asserentes ex nimia lassitudine cursus uel saltus uiolenter extorti, aut ex calore aestatis, uel frigidityte hyemis, aut si uolentes emittere lotium, non sinantur, uel si hordeum sudantes acceperint, et si post cursum calidi biberint, et si plena uesica uel post potum cogantur ad cursum, aut foenum comederint, hordeumque corruptum. Ex his uel huiusmodi causis malleus morbus consuevit generari. Vitanda quidem sunt ista omnia, nam ex his periculosa aegritudines iumentis saepe proueniunt. Malleus autem morbus ex aeris corruptione praecipue descendit. Nam Austro et Africo uento flantibus, interpositis annorum spacijs, recursu (ut asserunt) cataclysmatis, sicut certo tempore homines pestilentia corrumpuntur, sic animalia ille aer corrumpit et perimit. Vnde probatissima et plures necessariae sunt potiones, quae aduersum tantam uim prestare ualeant salutis auxiliū. Quarum partem superiori iam pagina comprehendimus, partem ex omnibus autoribus collectas consequenter adiunximus. Remedium perficiēs ad omnes



## ARTIS VETERINARIAE.

ad omnes generales morbos. Semen cucurbitae aegyptiacae. i. colocynthidem quantum acetabulum capiet, frangis & conteris, addita uini optimi hemina una, quod diligenti agitatione permixtum linteolo colabis, & per dextram iumentum narem infundes, ut peruenire possit ad uiscera. Quae compositio ad dysenteriam plurimum prodest. Alia quoque uilior, sed non minus apta curatio est; Radices cucumeris syluatici uirides contundes, et in aqua nocte una macerabis, deinde sublatis contundes & colabis, ex quo succo tria cochlearia cum nitro trito permixta, cum uino, si animal sine febre fuerit, tepesfacto quotidie faucibus ingeres, ita ut septem diebus continuus curare non desinas. Nitrum quoque bene tritum, & cucumeris syluatici radices minutatim concisas, addita hemina uini tepidi, in hordeum bene purgatum animali languenti ad pabulum infundas, ut non solum potum, uerum etiam pabulum medicamentum temperatum faciat ad salutem. Item aliud. Radicem ebuli, & radicem urticae equis ponderibus minutim incisas, & infusas in liquamine optimo macerabis, colabisque per linteum. ex quo mensura unius oui tepesfactum per nares animalis triduo digeres. Consequenter ita factururus, ut iumentum quod morbum patitur, hordeum cum apio & cucumere syluatico minutatim inciso, semper accipiat, contusumque ipsum agrestem cucumerem, & aquae sufficienter admixtum, bibere cogatur. Laudatur etiam haec potio. Herbae sauinæ libræ .i. trixaginis uncias tres, centaureae uncias 2. aristologiae uncias 4. baccarum lauri uncias 4. murræ uncias 4. omnia contundes & cernes, & in puluerem minutissimum rediges, & cum necesse fuerit cochlearium magnum plenum cum sextario. i. uini tepesfacto faucibus tedeantis infundes. Haec quoque aduersus omnes morbos medicina succurrit, si quatinus uires patiuntur, interpositis diebus, cum praescriptis minutionis obseruantijs, primo de ceruice, post de palato, & in quibuscumque locis se († humor) ostendit, ut si in facie de capite, si in primis partibus de armis, si in posterioribus de coxis sanguis est auferendus, & cum aceto miscendus, ex quo animal perfricetur. Cui haec per triduum potio dabitur: Pannaces radicum uncias tres, yringij radices poderis tanti (yringion autem herba melior est, quae in littore uicina marinis fluctibus nascitur, cardo syluestri penè similis, flore galbino, cuius eruendae sunt radices, nam longius penetrare dicuntur) feniculi quoque seminis uncias 3. aloes uncia una semis contusa & cribrata in tres particulas diuidentur, & cum fracti & moliti tritici far

al. † morbus.



fici farina sextario candenti aqua misceatur, & ad cornu per fauces triduo animali infundantur. Pelagonius aduersus omnes morbos efficacissimū puluerem credit esse, si pullū ciconiæ nondum adhuc stantē, sed iam plumas habentem uiuum in cacabū mittas, & gipses, perustumq; uapore furni, in puluerem redigas, & tritum uirio uase custodias, grāde, cumulatūq; cochlearium cū uini sextario animalis faucibus infundas, donec recipiat sanitatem. Chiron uero Centaurus prater alias cōpositiones quæ iam relatæ sunt, asserit catulum lactantem uiuū in aqua feruenti missum ac depilatū ita decoqui ut ossa separentur à carne; quibus diligenter ablatis, eius caro cum aqua in qua decocta fuerit liquamine optimo uino ueteri & oleo & pipere cū melle condita usq; ad sextariū debere seruari, ac singulis animalibus binas cotylas tepesactas, donec ad sanitatē perueniant, diebus singulis dari debere per fauces. Caput quoq; hædinū, omnesq; pedes depilatos ad caldarium eadē ratione, qua catulū, excoqui, ablatisq; ossibus condiri, & binis cotylis per diē in potione per cornu sæpius datis, animal morbidū liberari. De gallo quoq; gallinaceo albo, eadem quæ de catulo obseruanda demonstrat. Radicem quoq; herbæ tithymali decoctam cum uino dulci dare morbidis animalibus suadet. Ei quoq; animali, quod profluuiū attico cœperit laborare, ita ut uiridis ei uel pallidus per nares humor erumpat, ex lotio humano aut arietino duas cotylas cum uino, & cyatho olei rosacij putat esse miscendas, & p nares, quæ humorem funestum egerunt, digerendas. Quam curationē & pulmonis sanitatem, & naribus siccitatem præstare confirmat.

Potio anniuersaria physica. Caput .XVIII.

**P**RO physico autem & anniuersario remedio tradidit ulpicum beticū uel allium maius, quod quidam gallicum uocāt, capitella singula cū singulis semiuncijs sagapini, & singulis cyathis olei optimi diligenter trita, singulis aquæ heminis oportere misceri, et heminas singulas per caput animalium dari octauo Kalendas Iulias, hoc est in initio caniculariū dierū, septimo & sexto; quo factō, trinis potionibus stagnata, ut dicuntur animalia armentina uel domita integro anno à morbo intacta seruari.

Compositio suffimētorū cōtra malleū. C. XIX.

**A**Duersi morbū malleū, cuius diuersæ sunt species, quæ in potiōibus

B 3 tam per



## ARTIS VETERINARIAE

tum per os quàm nares dirigendis, uel clystere, quæq; in cauterijs uel flebotomo faciēda sunt declaratū est, sed restat alia nō minus necessaria efficaciorq; curatio, quæ suffimentorum genere & odore præstatur. Nā cū ipsa tabes ex corrupti aëris foetore nascatur, et usq; in pulmonē & uiscera penetrādo descendat, nō minus austeritate odoris, q̃ potionū amaritudine cōsueuit expelli. Pro numero itaq; aīaliū eliges locū humilē ex omni parte clausum, in quo induces aīalia iā egrotātia quæ curare desideras; uel adhuc sana & separatim quæ nō uis morbi contagione perfundi. Origanū asium, mentam, aspaltum, peucedanum, castoreum, & opopanacem, æquis ponderibus permisceas, & exinde quantum tribus digitis eleuare poteris in carbones uiuos mittas, animaliumq; os & caput super fumum tenebis, ut austeritas odoris per os & nares intrinsecus ingressa, omnia compleat, & ad pulmonē usq; penetrādo perueniat, & præstet animalibus medicinam.

Alia compositio uehementior ad lustranda animalia,  
quæ & fascinum tollit. Caput .XX.

**E**st & alia compositio suffimentorū ad morbos prohibendos, sumptuosior quidem, sed putatur utilior. Sulpharis uiui libras 2. bituminis iudaici lib. 1. opopanacis uncias 6. achanti uncias sex, galbani & castorei, yreos crudi aīi uncias 6. salis armoniaci uncias 2. salis capadoces uncias 3. cornu ceruini, lapidis gagatis masculi, lapidis gagatis foeminae, aīi uncias 3. lapidis ematitis, lapidis sideritis, lapidis argeritis aīi uncia 1. equuleos, id est caballiones marinos numero septē, caudas marinas, ungues marinos aīi numero septem, uue marinae uncias tres, medullæ ceruinæ, cedrei, picis liquidæ aīi pondera tria, ossa sepiæ numero vij. auri semiunciā, ballucæ siliquā: hæc uniuersa cōmixta atq; succēsa, odore suo mortis tā hoīm q̃ aīaliū resistūt, et demones fugāt, grādines prohibere, et aērē defecare dicūtur. Sed si memoratos lapides aut inuenire nequiueris, aut enormitate pretij ab emptiōe cessaueris, reliqua efficaciter prosunt.

De ratione flebotomi. Ca. XXI.

**M**edicina oīs aīaliū, uel si uerū quærimus, etiā hoīm, nisi rationē curationis ante cognouerit atq; prædixerit languētibus piculū, errabit frequenter. Exposita enim curandi ratio, & cum genere congruēs passionis



passionis, indubitāter praeſtat auxiliū. Ideoq; pluribus mēbris ac morbis generale remediū diligenter oportet exponi, qđ praeſcipue in ſanguis detractiōe conſiſtit, ſi rationabiliter pro tempore & uiribus animalū, et pro aequitate pfecti mulomedici adhibeatur induſtria. Qui ſi ignarus fuerit huius ratiois, nō ſolū p detractiōē ſanguinis nō curabit, uerū etiā piculū iumentis frequētiſſime generabit. Nā cum uita uirtuſq; aīantiū conſiſtat in ſanguine, ruruſuſ tēpeſtiue detractuſ ſanguis corpori praeſtare adſolet ſanitatē. Cuiuſ rei talis redditur ratio. Sanguis enim ciborū humorūq; indigeſtiōe corruptuſ, p mēbra diſcurrit, et languorē dolorēq; aut uniuerſo corpori, aut certis q̄buſdā partibuſ conſueuit inferre. Nam per cōſtriſtionem neruorū, uenarūq; tenſionem, inflatio, indigeſtiōq; generatur: quae tenſura (ut ita dixerim) corporiſ aliter laxari, niſi p detractiōē ſanguis nō poteſt. Vnicū enim cōpendiū atq; remediū eſt, corruptionē illā quae nocet, et quaſi infeſta tabe aegritudinē uel periculū gignit, cum ſanguiniſ ipſiuſ uitioſa parte detrahere.

Quę diligentia adhibeatur in ſanguiniſ detractiōe. Caput .XXII.

**H**Inc pleriq; ueriſ tēpore quotanniſ de ceruice iumētis ſanguinē decimere, & ſic in herbā mittere neceſſariū putāt, ne ueteri corruptoq; ſanguis nouuſ admixtuſ natura caleſcēſ, debilitatem, ualitudinīſ ue periculū faciat. Veteres autē, prudētioreſq; authoreſ abſq; neceſſitate depleri animalia uetuerunt: ne conſuetudo minuēdi, ſi tempore aliquo facta nō fuerit, ſtatim intra corpus morbū ac ualeitudinem generet. Rectiuſ ergo eſt minoris etatiſ animalibuſ & bene ualētibuſ ex nulla parte corporiſ ſanguinē detrahi abſq; palato: de quo aſſidue tā minoribuſ, q̄ maturiſ detrahenduſ eſt humor, ut caput, oculi, cerebrūq; releuētur. Maturiſ uero aīalibuſ nō in cōmodū eſt pulſare uenā cū mittūtur in paſcua. Illa tamē in omniibuſ, q̄ deplendi ſunt, conſeruanda eſt conſuetudo, ut pridie quā uena pulſetur, ſubſtententur leuioribuſ & parcioribuſ cibis, ut per diſtēma compoſito corpore ſint, non turbato per indigeſtionem. In ſolo autem equali ſtatueſ iumentū, ceruicemq; illuſ loro cingēſ, quo ſtriſtiuſ ſuper ſcapulaſ tangatur, ut uena poſſit ab aliquo clariuſ intueri. Tunc ſpongia cum aqua uenam ipſam lauabiſ, & ſepe detergeſ, ut altiuſ emineat. Pollicem quoque ſiniſtrę  
manuſ



## ARTIS VETERINARIAE

manus interius deprimes, ut non ludat, sed tumidior atq; inflatior uena redatur. Consequenter iuxta præceptum artis, uel animalis ipsius positione, sagutam dari calibis exiges cotibus bene acutatam. Obseruabis quoq; ne altius imprimas manum, & gulam atq; gurgulionem rumpas, & arteriã præcidas. Hoc enim uitæ consuevit inferre periculum. Percussa uena, fœnũ uel farraginem ad edendum apponas animali, quatinus agitatione maxillarum per uenã melius erumpat sanguinis impetus. Cũ aut niger uel corruptus humor egeretur, uel coeperit manare purior, statim iumentum tolles à cibo, & imposita fistula uenæ plagam astringes. In plaga uero pitaciũ imponas, ut diligentius claudat, licet quidam utantur & creta. Deinde in tenebroso loco & calido statues iumentum, & farraginem si tempus est, uel fœnum mollißimum dabis septem diebus ac noctibus. Aquam etiam offeres, ut si uoluerit bibat. Sed truitia farrago hordeaceæ præfertur: quæ si defuerit, hordeaceam dabis. Memento etiam quod ea melior sit, quæ uicinior marinis fluctibus fuerit. Propter quod uentrem facilius soluit, humoremq; deducit. Pulsata etiã quocunq; loco uena, omnem sanguinem diligenter excipies, & aceto oleoq; permixtum, uel alijs medicaminibus quæ ratio deposcit, animalis ipsius corpus perunges, præcipueq; illum locũ, ex quo detractus est sanguis, & qui esse putatur in causa. Constat enim, naturali quadam ratione atq; beneficio (ut quidam aiunt) ipsum sanguinem, cum supersusus est languentibus membris præstare medicinã, uitiumq; siccare. Quam curatiõis sollertiã nõ oportet omitti. Præterea interpositis diebus post flebotomiũ animalia producuntur ad solem, & sanguis detrahatur eis de palato. Despumantur etiam tertio gradu à dentibus caninis, quos oportet suspendi altius propter sanguinis fluxũ. ita ut ea die mollißimis cibarijs utantur & furfure. Sequentibus aut diebus non ex integro hordeũ consequantur, sed à uilibus incipiant, & ad consuetudinem per singulorum dierum augmenta perueniant. Consequenter tepido die ducantur ad mare uel fluuiũ, diligenterq; loti tergantur. Vino quoq; & oleo in sole perungendi sunt diligenter, & confricandi, ut corpora eorum calefacta aut repellant, aut perferant perfricationis iniuriam. Quibus perfectis equi nobiles tunc demũ ad labores cursusq; itineris reuocentur.

**S** Castrata animalia nõ deplenda. Ca. XXIII.

Sciendum est præterea, castrata animalia nunquam oportere depleri  
causa



causa herbae, quae iam partem uirium cum testibus amiserint, et si depleta fuerint, uehementius eneruantur. Hinc est enim quod asinis non detrahendus est sanguis, quia naturaliter minus habent sanguinis, gracilioresque sortiti sunt uenas.

Admissum facientes non deplendos. Ca. XXIII.

**A**dmissarios etiam equos flebotomare non est opus: partem enim uirium et sanguinis in coitu natura digerit. Si tamen ab admissura cessauerint, nisi annis omnibus herbarum tempore depleantur, incidunt in cecitatem, quia id quod coitu digerere consueuerant, declinat in oculos.

In quibus passionibus, & ex quibus locis sanguis auferendus est. Caput .XXV.

**N**unc ne quid relinquatur ambiguum, in quibus passionibus, et ex quibus locis sanguis emitti debeat indicabimus. Morbidis et quibuscumque totum corpus in causa est (sicut febrientibus, unde infra dicendum) de matrice detrahendus est sanguis. Cephalargicis autem, arpiosis, insanis, cardiacis, caducis, freneticis, bistrutitijs, sicardicijs, rabiosis quoque modo praecipitur de auriculis sanguinem demere. Verumtamen melius est de temporibus, quae in dextra ac sinistra sunt parte, detrahatur, id est, sub cauitate temporum tribus digitis ab oculo interpositis inferius uena perquiritur, et ex utraque emittitur sanguis. Eis uero quibus suffusio contingit oculorum, uel extra uitia quae oculis nocent, inferiores uenae sub oculis posita, quae descendunt sub angulis oculorum inferioribus, quatuor digitis inferius quam oculi sunt, inciduntur. Quibus quidem fastidium inhaeret, uel arteriarum uel faucium tumor, uel praegratio capitis, de palato auferendus est sanguis. Quibus autem pulmo est in causa uel iecur, uel caetera quae his uicina sunt membris, de pectore minuendus est, ex uenis quae posita sunt in dextra ac sinistra, ubi brachio la coniunguntur, et flexura fit cum armus plicatur. Quibus quidem armus est in causa, de brachiolis sanguis minuatur; quae uenae posita sunt interius, ubi centuriae, id est, musculi brachiolares sunt, sex digitis superius quam genu, tribus uel duobus digitis inferius quam centuriae. Haec uenae sagitta percutiuntur, sed caute modesteque tangantur, propter debilitatem animae. quia haec commixtae sunt nervis. Quibus autem articuli in causa erunt, uel si articulus insertus uel intortus fuerit, uel aut aquatilia habuerit, uel quiduis simile in articulis contigerit, de



## ARTIS VETERINARIAE

subcirro sanguis subtrahi debet: quæ uenæ posite sunt inferius quàm articuli tribus digitis sub coronâ. quæ uenæ cum summa cautela tangendæ sunt, quia articulorum coniunctæ sunt neruis. Creciaco uel si basim mouerit, de coronis rectis tollitur sanguis.

De his quibus sanguis in ungulam tollitur, alîs, qui ungulam cogunt uel eiecerint, quomodo sanguis tollatur. Caput .XXVI.

**Q**uibus aut iumentis uel suffusionis uitio, uel p uoluntatē excruciata ungula fuerit, uel qbus remorata basis longi temporis claudignem fecerit, eiusmodi curatiōe sanatur. Componis omnem ungulā quasi ad uiuū, ad lides q; t uirantū, hīc suffraginē illius alligatā lino uehemēter striges, totūq; simul ungulæ solū in circuitu scalpelietur, et circūgyrabis ut à corona ungula subleuetur ex pte, tūc circūcisorīū inferes inter unguē et solū, et cū bene elimpidaueris, suffraginē soluis, et inuenies de calcaneo uenas fluere, et cū sufficiēter effluxerit cruor, sale pfricabis, postea aceto et oleo inunges, et linteolis munies diligenter. Sparciā calciare curabis, ut post egestionē humorū ungula reparetur. Huiusmodi aut curā nūq nisi singulis pedibus adhibere debebis, ut in tanto dolore aīal duret ac stet. Si aut in alio pede similis est causa, cū in illo q prius curatus est, firmiter aīal stare cœpit, tūc eū elides, et ut dictū est, simili obseruatōe curabis. Si uero in his causis aīal cremare uolueris, semissabis illud hoc modo. Compones ungulam eius ad uiuū, et cōtra uenā addita sagitta ptūdis, ut possit sanguis acōtizare p solū quod sagitta ptuderit. Sili aut modo sale fricabis, oleoq; et aceto, linteolisq; munibis, dūtaxat singulos pedes, ita ut portare se possit. hi plane q semissatur nō elidūtur

Epistomicis, uulsis, colicis, strophosis, & qui morbo subrenali tenentur, unde sanguis tollendus est. Caput .XXVII.

**E**pistomicis, uel qui morbo subrenali leduntur, uulsis etiam, colicis, et quibus uenter frequenter dolet, de cauda sanguis emittitur, licet melius putetur propter huiusmodi causas ortas de uisceribus debere sanguinē tolli. Quod si de cauda tollere uolueris, sic facies: Erige et resupina caudā ad lumbos.



## VEGETII LIBER I.

10

lumbos, quatuor digitis ab ano ubi pilos nō habet cede caudam cū tabula aliā  
quā nō ponderosa, quousq; se uena demonstraret, & in cauda media diuisura  
quatuor digitis ab ano sagitta percuties uenam, ut acontizet sanguis, post de-  
cursionem fasciola colligabis. Cum autem de uisceribus emitte uolueris, sub  
inguibus de dextra sinistraue in singulis femoribus eminentes uenas medias  
sagitta percuties, post decursionem sanguinis cretam impones, sed caute, pro-  
pter uicinā mixturā neruorū. Si laccae in gambis fuerint, aut aliquis dolor co-  
xae uel gambae, sanguis detrahatur gābis: sunt enim uenae à uisceribus descen-  
dentes p gambas interius, quas medias propter uicinā mixturā neruorū cau-  
te transuerso flebotomo percuties, & post decursionē fasciola ligabis.

### De ratione foci atq; cauterij. Caput .XXVIII.

**I**N animalium curis ac medicinis duplex remedium authores esse uolue-  
runt, Minutionem sanguinis, per quā constricta laxantur, & Vstionem  
cauterij, per quod laxata firmantur. Sed cū flebotomi ratio euidenter ui-  
deatur exposita, Cauterij quoq; licet nouissima cura sit, apīda uidetur utili-  
tas. Nā adustio laxata cōstringit, inflata attenuat, humectata desiccatur, coagu-  
lata soluit, sarcinomata praecidit, ueteres dolores emēdat, alienatas corporis  
partes ex qualibet causa ad statū suū reuocat, sup naturā excrescētia, subla-  
ta, et adusta crescere nō patitur. Nā cū candēte ferro rupis cutē, uitiū oē con-  
coquitur atq; maturatur, et beneficio ignis dissolutū, p forāmia q̄ facta sunt ef-  
fluit cum humore. atq; ita sanatur passio et tollitur dolor. Post q̄ cicatricibus  
clausis, cōstrictior et robustior redditur locus, ac prope insolubilis cutis. Sci-  
endū uero cuprina cauteria plus effectus ad curandū habere q̄ ferrea. Prae-  
terea si in capite morbus est, inuritur ceruix: si subrenalis est, lūbis ignis ad-  
bibetur. Interdū aut puncta infiguntur, interdū ad similitudinē lineae candēs  
deducitur ferrum, aliquando uelut palmulae fiunt. In hoc enim laudatur Mi-  
lomedici ingeniū, si ita animal cauterio curauerit ne deformet. Pro locis aut  
in quibus est passio, & pro pellis aestimatiōe cauteria uehemētius imprimuntur  
aut leuius. Memoria aut retinendū est, † quassaturas, emota uel extorta, aut  
eiecta de locis suis, uri penitus nō debere. nā ppetua debilitas cōsequitur. sed me-  
lius est cū locis suis reposita fuerint, & ligaturis diligētius cōmunita, atq; ita  
naturae industriae q; beneficio cōroborata, colusticis unctiōibus et malazmis,  
C a postremam

ap̄s † fracturas



## ARTIS VETERINARIAE

postremū causticis eadem percurare ad spem perpetuæ sanitatis. Quod specialiter admonendū est, ne Mulomedici festinantes, dū foco curare cupiūt, animalia debilitent aut deforment, cū flebotomis, potionibus, unguentis, syringis, medicaminibusq; diuersis ante sit temptanda curatio, & si nihil profecerint, ad extremum ignis adhibetur.

### De passione & curis febrium. Caput .XXIX.

**Q**uæcumq; passiones plus iumentis periculi inferre consueuerunt, & difficilioribus obscurioribusq; indigent curis, has primo amplectimur libro, ut et facilius reperiātur quæ in exordijs ipsius occurrēt, et legentibus fastidiū nō possint adferre. De curis quæ prima sunt. Febrientibus itaq; aīalibus primū cōuenit subuenire. Nā nō amplius q̄ triduo caloris uim sustinere posse creduntur. Intra quod si curata nō fuerint, moriuntur. Oportet igitur prius passionis huius signa causasq; prædicere, & max medicinæ exponere. Febriens iumentū deiectū caput ē terra alleuare uix poterit, erit oculis apertis, labijs demissis, tristitia turpis & grauitas totius corporis insequitur, testiculi tumidiores laxius pendent, membra caloribus feruent, uenæ uehementi pulsu saluunt, anhelitusq; creber & calidus, tuſsis assidua, incessus nutans, fastidiū cibi, bibendi cupiditas, uigiliæ iuges. Causa aut huius passionis ex magno labore et fætigatione est, si negligentia cōsequatur. Interdū æstu nimio, aut perſtrictione uehemēti, uel ex cruditate ciborū, aut sudoris subita inſrigidatione, uel ex feruore hordei nouelli euenire cōſueuit. Curatio aut ista solennis est. Continuo sanguinem eis de facie, uel de temporibus, aut palato oportet emitti, ab omni esca prima die penitus abſtineri, foeni optimi aut herbe uiridis subinde pusillū offerri oportebit, & quiescere etiā ab omnibus rebus, & etiā sequeſtratū temperato tpe, et inambulationibus leuibus aīal cōmoueri, calidis quoq; locis coopertū stabulari. Cū cœperit melius esse, herbam minutatim concisam porrigito. quæ si defuerit, hordeū maceratum, ablatiſq; suis folliculis tuſum in modum ptisanæ paulatim offeratur et frequenter exiguū.

### De lassitudine quæ uidetur febribus similis. C. XXX.

**P**lerunq; aut equi ultra uires ad cursum coacti, aut ponderibus prægrauati, ac sudore defecti, similia febricitantibus signa demonstrant.



## VEGETII LIBER I.

II

Quos sic intelliges: Oculi sublachrymantes erunt, & tanq̃ subfusi sanguine, præterea spiritū crebrius agitat, foenumq̃ fastidit, & de posterioribus pedibus melius se sustentabit. nā primos quasi subtritos tardius ponit.

### De febribus internis. Caput .XXXI.

**Q**uod si febris interna fuerit non facile aīal dormiet, et quotidie deterius fiet, interdū furunculos in dorso uel in lateribus habebit. Scias eum à morbo qui superius disputatus est malleus, detineri. Cui lotiū aliquot dierum tam hoīm quā arietum per nares infundes. Et sic potiones quæ de isto morbo suprascriptæ sunt, dabis.

### Si in autumno febrerit. Caput .XXXII.

**S**i autem autumnī tempore cœperit febrire iumētum, statim de ceruice sanguinem detrahes, uel gradu tertio de palato; post herbæ trixaginis sextariū, draganti, rosarum añ unciā 1. in pila lignea pistabis, cernesq̃ subtiliter, ex aqua cū mulsa et oleo potionabis, atq; ita restitues sanitatem.

### Si in æstate febriat. Caput .XXXIII.

**S**i autem æstate febrire cœperit, totū sudabit, sataget salientibus uenis, mincturam & naturam simul dimittere, ad terrā transuerse ambulabit. De coxa media quatuor digitis ab ano uenam inq̃ris, et ex ea sanguinem detrahes. Si aut nō inueneris, de ceruice tollendus est. Cui hanc potionem pro tempore dabis: Herbam portulacæ plenā manū tundis, succūq̃ eius cū dragante & thure, & succo rosæ campanæ mulsa addita offēres, potionem non satis grandem ne plus quā oportet infrigides: quia cum quasi splene car. at simul & defectione sanguinis calore priuatur.

### Si hyeme febriat. Caput .XXXIII.

**H**yeme uero si febrerit, supradictas species aridas contūdito, diligenterq; misceto, & per sinistram narem dato, sanitas consequitur. Febrientibus aut hæc potio utilis traditur: Mannæ thuris uncias ij semis, yrisillyricæ uncias 6. piperis unciā 1. baccarū lauri, seminis apij añ unciā 1. cū passo potionabis. Item post detractionē sanguinis de matrice aut de palato sic potionabis febrientē: Hysopi librā unā, abrotani uncias 6. la



## ARTIS VETERINARIAE

Lactis caprini sextarium, amili cyathum, olei optimi uncias 3. herbe urciolaris succi cyathum unū, misce cū cæteris, & per cornu faucibus infunde, erit salutare remediū. Item alia potio. Lactis sextariū, olei cyathos 2. croci scrupulū 1. mirre 2. appij seminis cochleariū plenū, miscebis piter, et dabis ad cornu. Hyeme farinā triticeā cū aqua tepida, æstate aut farinā hordeaceā cū aqua frigida dabis in potū. Si febrient mensuram nō des, iliorū aut loca cauterio inurenda sunt, & usta curāda. Item alia potio. Lactis caprini heminā, amili cyathū, oua 4. olei cyathū, succū herbe urciolaris quotidie potū dabis usq; ad sanitatē. Item unctio qua pfricandi sunt febrientes. Rosæ librā, olei ueteris librā 1. aceti heminas 3. lactis caprini librā semis, portulacæ seminis et nucis amarae aī uncias 6. menthæ uel rutæ quantū expedit. s. teres et commisces, et tepefacto utere, ita ut diutissime confrices contra pilū, et in loco tepido unctū aīal coopertūq; statues.

Item potio alia si hyeme febrierit.

Gentianæ unciam unam, aristologie, hyssopi, absynthij, abrotani, singulorum unciam unam, caricarum uncias 6. seminis apij uncias tres, rutæ fasciolum 1. omnia in cacabo cum aqua decoques ad tertiam, & cum nigrescere uideris, coctum est. Exinde uini heminam misceto sicut suprascriptum est, & per cornu faucibus infundito.

Si ab indigestione uel pletura febriat. Ca. XXXV.

**S**I quod iumentū ab indigestione uel pletura febricitauerit, naribus spiritum ducet, & ilia frequenter agitabit, anhelitusq; erit seruēs et aridus, spinam facilius flectet, nam qui ex perstrictione febrit, rigidus est: quia calor membra dissoluit, frigus astringit. Ex pletura igitur febrienti, copiosus sanguis emittitur de ceruice, nares aceto pfricātur ut sternutet sæpius. Venter quoque febrientis si durior fuerit, per anum iniecta manu, stercus extrahatur, à cibo abstineat, paucissimum potum per interualla suscipiat, & unctum suprascripto medicamine, diuq; fricatū, loco stabit calido horis tribus aut 4 cooptū, postea ad ambulandū producet, nihilominus inuolutū.

Si ex uulnere oris aut faucium febriat. Ca. XXXVI.

**S**I quando ex uulnere aliquo uel suppuratione oris aut faucium nascitur febris, de temporibus, nec non etiam de palato detrahendus est sanguis.

De max



De maxillis quoq; siue de ceruice, & ad postremū quicunq; locus febrienti doluerit, ex eodē cum mensura sanguinem oportet auferri. Quod si cibū penitus respuerit, farinā aquæ mixtā ad cibi instar faucibus eius infundes. Offas quoq; de passo facies iustæ magnitudinis, et septenas cū oleo digeres, ut possit habere substantiā. Ita deniq; febrienti utilis est, ex quacūq; pte detractio sanguinis fiat, si consideratis uiribus animalis mēsurā seruetur. Nā ut emissus rationabiliter releuat, ita enormiter ablatus euirat uel turbat.

### De coactiōe. i. de nimia lassitudine. Cap. XXXVII.

**C**oactio in animalibus passionis est nomen, ex qua ægritudinū diuersa genera nascūtur, ideo sic appellata, quod ab iniuria uel labore uel ex coactione contingat. Quoties enim lassū aīal fatigatione itineris, uel nimietate cursus, uel magnitudine ponderū, non studiose resouetur, uel æstate sicire, uel hyeme algere compellitur, uel certe penuriā sustinet cibi, aut hordeo nouo, aut foeno pessimo leditur. et p dies aliquot circa curā eius nulla adhibetur industria, & sic totius corporis compago, & interiorum uiscerū dispositio per iniuriam & fatigationem uitiatur.

### Que genera ægritudinū ex coactiōe nascanť. C. 38.

**E**x qua coactione hæc passionū genera nascuntur. Ex perstrictione enim fiunt epistomici, podagrici, phthisici. Ex æstu aut̃ euenit grauedo febris, insania, capitis dolor. Ex sudore oritur tumor in cruribus, suffusio in pedibus, febris, spasmus, et tussis. Ex humore quoq; q de naribus profluit, passio aptissima declaratur. A' cerebro enim uel à capite uenit multa pituita crebra et spissa. A' pstrictione erit humor tenuis, aquaticus, & frigidus: ex qua re fiūt coriagrosi & epatici & phthisici. A' colibus & glandulis & arterijs humor erit candidus & uiscosus, ex quo euenit fastidiū & faucium præfocatio & synanches. A' pulmone aut̃ humor crassus, sanguinolentus, & maleodoratus emanat, colore pallido. Ex qua causa fiūt peripleumonici, uomicosi, ortomici, et phthisici. A' morbo aut̃ malleo uenit humor multus et crassus, & pallidus. Ex qua re fit ortomicus, profluuius atticus, et suspiriū articulare. A' iecore humor erit liuidus, yricus, et uiridis, et tabidus, non ualde crassus, neq; olidus. Ex qua re fiunt sciatici, hydropici, febricosi. Ideo autem signa passionum causas que diuisimus, ne ingratus

error



## ARTIS VETERINARIÆ

error noceret, & facilius euidentis doctrina curaret. Absyrthus huiusmodi de  
 coactionibus prodidit medicinas: Si equus, inquit, coactus de uia uenerit, oculi  
 eius intro abibunt uel uersabuntur, spirat calidum frequenter atq; suspirat.  
 & auriculæ huius ac reliquū corpus extensum erit. Cuius talis est curatio:  
 ut parū hordei accipiat, fœnūq; nō multū. Potio aut huiusmodi præparabi  
 tur, hysopi, abrotani ~~at~~ uncia 1. sampsoci uncias 6. fœnugræci librā unā, li  
 ni seminis pondo duo: hæc omnia tusa & cribrata in cacabo nouo cum sex  
 aquæ sextarijs infundis, addisq; nouem duplices ficus, quæ cū ad partē dimi  
 diam decocta fuerint, uniuersa conteres atq; liquabis, præterea uini ueteris  
 optimi sextarios tres, mellis heminā, piperis triti drachmā adijcies supra  
 scriptis, rursumq; feruere facies oīa, ex qua calidā potionē plurimis diebus  
 dabis, quæ mirifice iuuare consuevit. Si de labore itineris suffusio pedū for  
 te prouenerit, caue ne sanguinem calido detrahas, sed requietū pausatūq;  
 flebotomabis, huiusmodi beneficio potionis usus: Turis masculi drachmas  
 2. foliorū caprifici librā, grana piperis 25. fermēti uncias 3. croci drachmā:  
 Omnia bene trita in tres partes diuides, & ex pausatū iumentū triduo cum  
 oleo potionabis & uino: si hyems fuerit, tepida os ablues, æstate frigida: si tar  
 dius, aut non recte ambulat, † sulphurē & resinā calentē ungulis imponis,  
 alis † surfurē non semel tantū, sed aliquoties donec rectus incedat. Si uero ista nō profue  
 rint, semissabis eum ut de ungulis sagitta contactis cōpetenter profluat san  
 guis, & uulnera traumatico curabis pharmaco. De laxis hæc signa erūt:  
 toto corpore grauabitur, & posteriora crura quasi inligata habebit. posca  
 itaq; & pulegio nares eius & totam faciem fouebis, panem & merū dabis  
 ut manducet, offeresq; ei lactucas uel gramen diligenter lotū atq; cōcisum,  
 consequenter daturus huiusmodi potionē, Succū ptisanæ, passum, oua, oleū  
 rosatum, quæ omnia pariter mista per triduū dabis, ita ut hordeū primo de  
 corticatum siccatumq; māducet. Præmonendū autem est, ne iumento ex co  
 actionis iniuria laboranti pulses uenas calenti. continuo enim neruorū con  
 tractio & debilitas cōsequitur. Oportet aut armos eorū & genua uino cali  
 do & oleo tepido suffundere, totūq; corpus multorū manibus diutissime cō  
 fricare, & loco statuere tepido, mollia de siccato stercore uel de paleis strata  
 præbere. Posteriorē ptē flebotomo laxis nō oportet cōtingi, ne penitus eui  
 tur. Qd si uenæ in cruribus tumēt, et plenæ sunt humore, de coronis sanguis  
 auferatur.



## De diuersis passionibus uentris. Caput .XXXIX.

**N**on minus multæ & obscuræ ualitudines in internis animalium quàm hominum existere consueuerunt. Imò si uerum querimus, propè pares atq; consimiles sumus. Nam animalibus quia rationales sumus, sola mente præstamus; corporis uero natura cõmunis est, maxime in doloribus. Dolorem uentris in iumentis Veterinorũ impitia putat facile posse curari, quod graue, nescit, Et ex uentositate, uel constipatione uitium, torsiones uocant & interiorũ incisiones. quibus aut præcantationes anicularũ more, aut aliud quod quasi physicũ remediũ adferre conantur. Cũ quid enim intrinsecus iumentis dolere inceperit, statim se allidunt & uolutant, et solius uentris creditur esse causa, cũ plures & difficiles sint passiones, ex quibus dolor & uolutatio illa contingit. Et nisi singulis pro causarum genere competens medicina subuenerit, sanitas redire non poterit. Efficaciter autem curare potest nemo, nisi qui internarum ægitudinum signa rationesq; cognouerit.

## De aqualiculo. i. stomacho. Caput .XL.

**P**rimus uenter ipse, qui aqualiculus nominatur, totius corporis obtinet dominatum, in cuius capacitate cibus potioq; miscetur, ac per digestionem naturali calore decoctus, separatis humoribus, partem ad substantiam membrorum conuertit in sanguinem, & partem in urinas resoluit, partemq; secum trahit in stercora. Quod si loca illa præstrictio longi temporis uiciauerit, intestinorum dolor, & corruptio digestionis necessario sequitur. Nam pars humoris coagulatur ex frigore, & fit conglutinosa in præcordijs, atq; in intestinorum partibus, quæ ducuntur ab aqualiculo usq; ad collum, quod appellatur t enteron, retinetur & hæret, quod latine ieiunum dicitur, per quod in collum humor pessimus transit, & interclusione sua cibum non patitur ad interiores partes more solito peruenire. Hinc etiam tortura & extensio uentris dolorq; cũ magno periculo generatur: quæ passio græce emphragma, latine præoccupatio dicitur.

## De colo &amp; coli dolore. Caput .XLI.

**E**xoritur & alia causa doloris asperior, quæ græce chordapsos appellatur, cum præclusa intestina uiscerum uento sumoue se urgente colligant,  
D usque co



## ARTIS VETERINARIAE

usq; eo, ut aquā, & cibum, & stercus animalia etiam interdū reuomere cogātur. Præterea ad similitudinem hominū propter inflatiōis iniuriā, coli quoq; dolore uexantur, propter quam necessitatē animalia diuerse uehementerq; uoluēdo rumpuntur, quod curari iam non potest, & ideo moriuntur.

### Cura longanonis & ilei. Caput .XLII.

**I**Lei quoq; uitia ex persfrictione huiusmodi humoris nascuntur: qui cum intestina maiora & præcluserit, & in eorū sinibus stercora coeperit detinere, prohibet illa ad catachlytum longanonis decurrere (Longanon autē intestinum uocatur, per quod stercus egeritur) tunc uenter crassus uel præclusione ipsa intra uiscera increscit, ac sibi met dolores morsusq; excitat uehementes, ex quo iumenta se proijciunt ac uolunt, extensisq; pedibus calcitrant. sed per impatientiam se sepe iam iactando uentus increscit, & mixtus stercore usq; ad intestina descendit, nec iam, ut supra, rumpitur, sed iumento qđ in uitium, qui Ileos uocatur (ex eo, qđ intestina locis suis exclusa, aīa quasi elices facere faciunt) inciderit, ea ualetudo periculosa est, nisi cum celeritate subueneris. Huiusmodi autem sunt adhibenda remedia: Aqua calida renes animalis diutissime fomentabis, fœnumq; cum calida, ut uapor magis penetret, frequenter apponis, post cilicijs diligenter absterges, oleum uetus & picem liquidam, & oleum laurinum misces, calefacies, & diutissime persfricabis, ita & testiculos eius perunges, & in auriculas calidum medicamen infundes. Tam diu autem fricabitur, ut sudare incipiat & uentū emittere, ex quo spes ostenditur sanitatis. Quod loco calido statues, ac sagis cooperies diligenter, hanc daturus quotidie potionem; Piperis grana quinquaginta, petroselinum quantū quatuor digiti comprehendunt, cimini alexandrini tantūdem, cimini quoq; africani tantūdem, semen apij, murrā, nepitā, trixaginē, æquis ponderibus, quibus ad dimidiam omnium partem nitrum admiscere te conuenit. Quæ omnia bene trita ex uino calido & oleo æquis ponderibus, et melle quantum satis fuerit dabis. Hæc autem potio & calefacit, & uentrem resoluit. Quod remediū si tardius subuenerit, saccellos cum surfure calentes per totum dorsum & renes animalis imponis. Clysteriabis etiā ex aqua calida & oleo, quod cum sale & melle afro, et nitro, quoq; miscebis, & ita uentre laxato & stercora emittuntur & uentus. Quod si clyster defuerit, sal bene tritum



ne tritum & mel coques, pastillosq; longos & duros facies, & in anum iu-  
menti interius immittes. Quæ res omnem spurciciem humoris intus stantem  
abstrahit, & ad sanitatem perducit, nec est aliud qd magis ualeat subuenire.

Causæ & curæ strophæ. Caput .XLIII.

**S**unt animalia quibus assidue uentris impendit dolor, qui strophus ap-  
pellatur, & hac ratione concipitur. Interdum sudor animalium uel ni-  
mio cursu, uel labore profluens, in internis residet intra uentris intesti-  
norumq; compaginem, q punctiones doloresq; præstat interius. Et cū totū à  
labore cessauerit, ac refrixerit corpus animalis, cessat & dolor. Sed cū à la-  
bore calefieri cœperit, rursus exoritur, & ideo strophus uocatur. nā frequen-  
ter uolutatur, et cū surrexerit, terrā pedibus tundit, & interdū terrā quasi  
manducare conatur, et iacēs uidetur quasi pusillū regescere, et surgēs citius  
ābulare se cogit. Sed ex hac iniuria frequēter uolutādo uētū sibi nutrit intri-  
secus, et fit tympanites, ex quo et iumentū rūpitur, et præsens uita & piculū cō-  
sequitur. Qd uitiū si in ppetuū auferre uolueris, paracenthesim facies sic: qua-  
tuor digitis sub umbilico ueretrū uersus, medio climate uētris sagittā inijcies  
ut non solū cutē, uerū etiā periconiū ipsum aperias. Periconiū enim dicitur  
membrana quæ intestina omnia continet. Ad mensurā autem cū magna cau-  
tela periconium aperies, ne intestina lēdas, & præsens discrimen inferas.  
Post exempta sagitta subijcies fistulā centimalem, quā Mulomedici portare  
cōsueuerūt, minutis foraminibus multisq; pertusam, p quā foras humor ema-  
nat, quē suscipies in uase, et inuenies limpido lotio similē, tolles uero non mi-  
nus sextario. Hæc cura etiā illa animalia sanabit, quæ uel stupida uel macra  
sunt ex coactiōe longi tps, qbus nitrū diligenter cribratū in hordeū debes a-  
spargere, qd omnes asperrimos humores et spurcicias corporis purgat. Sed  
strophosis dabis potionē superius declaratā plurimis diebus. Etiā acopo ter-  
mātico renes eorū, totūq; corpus punges, et diebus aliquot à pluribus facies  
cōfricari. Ad ultimū renibus eorū causticū induces, et sic reuoces ad laborē.

De lūbricis, coctis, tincis, et pediculis. Cap. XLIII.

**I**ntolerabilē dolorē itestinis inferūt lūbrici, uermes, et tineolæ, quas alij pe-  
diculos appellāt. Nā coagula et aqualiculū itus erodūt et uulnera faciūt.  
ex q necessitate aīalia macrescūt, et coriaginosa fiūt, et sine febre nō erūt

D a & celer



## ARTIS VETERINARIAE

**E**ccleriter moriuntur. Huiusmodi passionis signum est, cū inuenitur humor in ano fabæ coctæ similis; est nāq; sanies ex illis uulneribus quæ bestiola intrinsecus fecerunt. Ieiuna animalia ex hac necessitate uehementius torquētur. Nā cū his deest cibus, magis uitalia consumūtur à uermibus. Hi nō sunt inflati, & tamen per dolorē se uolutant, et in spinā se proijciunt, & caput sibi intra pedes mittūt, & ostendunt doloris sui locū, dentibus illa sibi quasi scalpunt, & rodunt nonnūq; lumbos, & caudam parietibus confricant. Cū ista signa ostendere cōperint, & crebro clamare, hoc est, uehementer hinnire, scias eos iam morti esse uicinos. quibus adhibetur ista curatio: Olei uiridis et amari sextarios 2. fasciculū absynthij pontici concoques. præterea nasturcij seminis, santonici, coriandri seminis, radicū seminis, sinopidis pontici uncias singulas, mirtis & foenigræci selibrā: hæc infusa et decocta in oleo illo facies permanere, ex quo heminam olei, & aquæ tepidæ heminā dimidiam per cornu dabis. quæ uirtus medicamentorū, & lenitas olei animala ipsa intus occidit, & foras eijcit. Ex qua potione si per multos dies acceperit, p̄mixto nitro tunso & castoreo, oēs lūbricos & tineolas & uërmes discludit à corpore, et cū stercore eijcit, & restituit sanitatem. Alia potio ad lūbricos, tineolas, & cossos: Santonici, absynthij pontici pulueris, lupini crudi, seminis nasturcij, scobis cornu ceruini, seminis radicū uncias ternas, sinopidis pontici pastillos tres, pollinis erui uncias 3. uini austeri sextarios tres, olei hispani sextarium unū, opopanacis uncia 1. seminis coriandri heminā: hæc omnia diligēter trita decoques, & quotidie ieiunis heminas singulas dabis.

### De clysterijs ad curam lūbricorū & tinearū. C. XLV.

**S**ed quia pestes ipsæ sæpius ad coagula se conferunt, & potio quæ per os data, ad loca ubi morantur rarius peruenit, ideo etiam per anum adhibenda sunt clysteria: aceti acerrimi sextariū unū semis, olei uiridis tantundem, opopanacis uncia 1. centaureæ uncias 2. absynthij pontici uncias 3. santonici uncias 3. farinæ lupini crudi uncias 3. erui uncias 3. seminis rafani, seminis coriandri uncias ternas, nitri triti uncias 3. radicis capparis tunse uncias 3. hæc oīa decoques cū oleo & aceto, & per triduū singulos sextarios bene calentes per anū de clystere diffundis animali. Memēto aut quoties per os potionē das, animal contra cliuū teneri debere, ut facilius quod acceperit ad interiora



Interiora descēdat. Quoties autē clysteriabis, caput animalis in ualle statues, & clunes ad altiora conuerteres, ut quod per clysterem diffundis ad interiora perueniat. Diutissime autē post potionē in talibus locis animal retinetur, ut facilius necentur uel eiiciantur pestes internæ. Ad cossos & lumbricos specialis potio. Herba camelcontis radicem ex aqua ad tertiam decoques, et cū opopanax duabus uncijis misces, ac uini heminā, & ad cornu per sinistram narem diffundis. Item alia ad lumbricos. Seminis coriandri quantū una manus cœperit friges, nasturcij quoq; seminis tantundē diligenter teres, quæ utraq; cū aqua tepida per triduum faucibus infundes. Ad matricis dolorem medicamen. Aloe, epaticū, masticē, castoreū, lauri baccas, amoniacū, uino & melle mittis in ollam, & bullita atteres, dabisq; ad bibendum.

## De iumentis calculosis. Caput .XLVI.

**S**I quod iumentū calculosum fuerit, hæc signa monstrabunt: torquetur, gemit, extendet se ad conatum mingendi, stillat ueretrū eius guttis materiam, modicum mingit & plene mingere nō potest, quod quotidie patitur. Sed huiusmodi uitiū teneris ætatibus plerunq; contingit, quod sic inuenies: Manū ad interiorē partē mittes, et a ceruice uesicæ sub ipso ano ad hippocentaurū uersus palpabis digitis, & calculū ibi inuenies. Quod uitiū difficile curatur. Nam interdū nimio conamine prope ipsum anū uesica disrūpitur, & lotiū per anū emittit, & quasi aquæ adsimilatur. Ideoq; missis digitis per foramen quod fecerit, longanonis & ipsius uesicæ aculeo calculum eximis, & curabis clysterijs collecticijs, id est, quæ glutinent, ut foramina illa sanentur. Potionabis autē illos duritica potione. Difficilis autē huiusmodi cura est, quia uim patientes ex corruptione uesicæ tortione moriuntur.

## De emphragma. Caput .XLVII.

**Q**Uodcunq; iumentum ex qualibet causa inueneris uolutare, oleo manum perunges, & ipsum anū oleo satiabis: post quod manū in interiorē partem longanonis protendis, & si inueneris ipsum longanem clibano subtili patere, scias eū strophū pati, & continuo stercora eiicias paulatim ad manū, quibus egestis cito noueris animal percurandū. Si uero manu iniecta longanonis præclusionē inueneris, & stercoris modicū, hoc est, duas aut tres pillulas squibala, et præfocatū longanem qua manus uix

D. 3. introeat



## ARTIS VETERINARIAE

Introeat, scias eum emphragma pati et periclitari, & ideo curādi sunt renes medicaminibus suprascriptis, & clystere utendum, quod indignationem intestini resoluat & curet.

### De ileo. Caput .XLVIII.

**S**I manum inieceris, & totum uentrē tympano similem pertractando senseris, scias eum ileum pati, & cito periclitari. Et ideo unctionibus calidis fricandus est uehementer & diu. Si uentum coeperit emitte, tūc in illo spes incipit esse uiuendi.

### De dolore uentris. Caput .XLIX.

**I**tem si manum miseris, & inueneris ualde pati longanone, & stercora nō multa habere, nec esse uehemēter inflatū, scias ipsum uentrē dolere, id est, aqualiculū. Cito req̄scere solet, si celeriter supradictas et calidas accipit potiones, diligenterq; ex calido unguento fuerit p̄fricatū. Si morā curatiōis non abstuleris, difficile euadet. nā ex hac passione chorda p̄sus fieri cōsuevit.

### De dolore coli. Caput .L.

**S**I manum miseris, et similiter longanone pati sine ulla inflatione repereris, & non frequenter uolutantem se, sed proijcientem subinde in dexterā partē, et quasi extēsiōnem interdū ad conamē minctiōis, inuenies duriciem in intestinis ingentem cucurbitae similem, scias animal coli dolore ueari: & quanto durius intestinū inueneris, tanto pluribus diebus dolore cruciatur. Ex qua causa raro periclitantur, & dolent biduo, uel triduo, uel si nīmiū quinq; diebus. Sed quāto inueneris molliorē ipsum locū, tāto uelocius mitigabitur dolor. nā quēdā stercora in lōganone repies, et erit salubris curatio si post clysterē uel potionē multū stercoris adsellatus ediderit. quo facto statim intestinū, quod à colo induratū fuerat, & tumebat, nō apparebit reddita sanitate.

### De dolore uesicæ Ca. LI.

**S**I currendo fuerit inuersa, similis dolor sine inflatiōe ex cursus iniuria & nimietate frequēter emergit. Huic manū subijcies in anū, & depri-  
mes usq; ad ueretrū uersus, ubi inuenies uesicā eius lotio plenā, quā à  
dextra & sinistra pte leniter adducis sursum ad anū uersus cū oleo, et min-  
ctionem



tionem prouocas, tã diu donec urinã faciat: liberabitur piculo de quo animalia difficile euadũt.

Colli & lūbrici qua cura tollant̃ ad manũ. C. LII.

**S**unt alij qui assidue dolorem uentris patiuntur sine ulla inflatione, nec uehementer se uolutant, & quasi in cursu prouocant, aliquando se proijciunt, et ilia sibi corrodunt, et quasi scalpunt. In huiusmodi dolore manũ mittis in longanone p circuitũ et interiore pte p plurima loca diligẽter tentabis, & inuenies uermes collectos exisse in singulis locis, et intestinũ pertundere. Ex qua necessitate nascitur dolor periculosus. Digitis euellere eos, q quidam uix euelluntur, & ipsa tibi in manu cohæret ut difficile eos proijcias. ex qua ratione multa iumenta caudam frequenter parietibus fricant, propter morsum uermium, quos purgare de longanone studiose debebis, & potionẽ dare per plurimos dies eam, quæ ad lumbricos faciat, ita omnes uermes, quos cossos appellamus & tineolas purgabis. Similiter etiam qui lumbricos habent in uentre, sic eos conuenit mederi: Pice liquida & oleo calido renes & totam spinam cum dorso perfricari oportet tam diu, donec calefactionem patiantur ex manibus. & auriculas eorum et anum ex oleo complebis. uentrem quoq; & testiculos perunges, sal tritum cum melle decoctum mixtum in anũ subicies, animal potionibus crebris ambulatiõibus potionatũ exercebis. Si ex hac ratione non mitigauerit, clysteriabis eũ calida, & afronitro et sale. Præterea super renes & dorsum saccellos calidos ex fursure plenos imponis, & tam diu innouabis calefactionẽ donec uentum reddat. Potionabis eũ potionibus supradictis & clysterijs ut à discrimine liberetur.

De syncopatis & confixis. Caput LIII.

**S**i quod iumentum syncopauerit his agnoscitur signis: Pigrius ambulabit, tanquam suffusione constrictum. Inter suffusos autem & syncopatos hæc distantia est, ut suffusi licet tardius à terra leuent pedes, flectentes crura incedere solent: Syncopati autem uniuerso corpore constricti & rigidi sunt, etiam cum se proijciunt, non sine gemitu & toto corpore decidunt. Hi uero non sine febre erunt, cibum & potum fastidiunt, magis iacere cupientes. qui cum se leuare uoluerint, impetu conantur exurgere, sed propter dolorem omnium membrorum tardius exurgunt. Quod contingit ex magno



## ARTIS VETERINARIAE.

ex magno labore & cursu nimio, uel ex humoribus nimijs, cū plurimus sudor fatigatis neruis mēbra conquasset, unde syncope, id est, defectio nascitur: cuius ista curatio est. Calida cum flore sceni eū somētabis à spina, armis, et renibus, tepefactumq; diligenter tergendō siccabis, Tunc uino et oleo calido totum perūges, diutissimeq; confricabis: coopertū deinde locis calidis statues, molliaq; substernes ut dormiat. Quod cū per triduū feceris, hac potione refouebis. Mirræ uncias 2. dragāti uncias 4. croci drachmas 4. meliloti unciam unā, anagallici librā, thuris masculi pondus unū. quæ omnia cribrata in puluerem rediges, ex quo duo coclearia cū aquæ calidæ hemina, & mellis coclearibus duobus, et olei rosei cyathis duobus potionē dabis plurimis diebus, donec sanum fiat. Etiam uulsis hæc potio, & tensione laborantibus prodest.

De his qui sanguinē per nares mittūt. Ca. LIIII.

**S**æpe ex cursu nimio iumēta sanguis infestat, & per nares emanat, qui difficile ueluti ruptis uenis labore & calore substringitur, & uelocissimam etiam postulat medicinā. Succū itaq; uiridis coriandri, uel si defuerit, porri satiui succū in naribus periclitantis infundes. pollinis triticei drachmam, thuris puluerizati drachmā 1. anagallici unciam 1. amyli semiunciam, commixta & in tres partes diuisa, ex uino nigro suffundes naribus, sanguinemq; præcludes.

De infestatione sanguinis. Cap. LV.

**A**nimal sanguine laborare hæc signa declarant: Oculi tumbunt, frigidum erit corpus et ceruix, tristitia fastidiumq; iungetur, difficileq; curabitur. Hac ratione curandum. A cibo potuq; temperabitur, somniq; indulgebitur copia mollibus stratis, tum de matrice quantū ratio postulauerit sanguis auferatur, nec potionis cura cessabit. Succū itaq; uiridis coriandri, uel si defuerit, porri sectui, trixaginis quoq; & centaureæ uiolacæ, & nitri æqui ponderis mixtura inungitur. Ex quibus tumsis atq; cribratis diurnū cochleare ex hemina aquæ tepidæ infundatur faucibus. Quæ potio humores & sanguinē, iminentesq; alios morbos purgat, phibet et sanat.

Quæ adhibēda diligētia, ut aīalia sana perdurent. C. LVI.

**O**bscuras difficilesq; curas prima fronte digessimus, consequenter ad cætera pergentes: sed necessarium credimus ostendere rationes, ex quibus



quibus incolumitas iumentorum incorrupta seruetur. Melius enim est diligēti studio custodire sanitatem, quā aegritudinibus præstare remedia. Diligēs itaq; dominus stabulum frequenter intrabit, & primū dabit operam ut stratus pontilis emineat, ipsumq; sit non ex mollibus lignis, sicut frequenter per imperitiam uel negligentiam euenit, sed roboris uiuacis duricia & soliditate cōpactum. Nam hoc genus ligni equorum ungulas ad saxorū instar obdurat. Fossa præterea quæ lotium recipiat, deductoriū debet habere cuniculum, ne pedes iumentorum redundans urina contingat. Patena, quæ appellatur, hoc est, alueus, ad hordeum ministrandū sit munda semper, ne sordes aliquæ cibarijs admisceantur et noceant. Loculi præterea uel marmore uel lapide uel ligno facti distinguendi sunt, ut singula iumenta hordeū suum ex integro nullo præripiente cōsumant. Nam sunt animalia ad edendū auidissima, quæ cū celeriter propria deuorauerunt, partem consortis inuadunt. Alia uero naturali fastidio tardius comedunt, & nisi separatim acceperint, uicinis rapientibus macrescūt. Cratis, quæ iacca uocatur à uulgo, pro æquorū statura nec nimis alta sit, ne cū iniuria guttur extendatur, nec nimis humilis, ne oculos contingat aut caput. Luminis plurimum stabulo infundi oportet, ne tenebris assueta, cū producantur ad solem uel caligent, uel aciem uisus imminuant. Aestate in apertis locis tã noctibus quā diebus iumentis libera aura præstanda est. Hyeme uero tepere debent stabula potius quā calere. nam nimius calor licet custodiat pinguedinem & reficere uideatur, tamen indigestionem facit, & uehementius nocet naturæ. Propter quod diuersa genera morborum ex uapore ipso animalibus generantur. Si producantur ad frigus insolitum, statim aegritudinem ex frigoris nouitate percipiūt. Curandū est præcipue, ut siue fœnum, siue paleas, uel manipulos uiciæ pro regionum usu uel copia animalibus præbeas, incorrupta ac bene olentia & munda mittantur. De hordeo quoq; non erit sollicitudo dissimilis, ne aut puluerulentum sit, aut lapidosum, aut mucidum, aut uetustate corruptū, aut certe recens de arcis sumptum, & ipsa nouitate præferendum. Aqua etiam limpida ac frigida, etiam perhennis ac profluens ministranda est. Nā quicqd importunius fluit, uirus non admittit. Bis in die multorum manibus animalia sunt toto corpore confricanda: quæ cura & mansuetudinem docet, & laxata cute pinguedinis præstat augmentum. Hordeū quoq; non semel nec bis, sed pluribus portionibus præ-

E                      bus præ



## ARTIS VETERINARIAE

bus præberi conueniet. quicquid enim paulatim acceperint, legitima digestione conficiunt. Quod uero semel et enormiter sumpserint, cū simo indigestū integrūq; transmittunt. Vicinum uero stabulū conuenit esse loco arido, stercore uel paleis mollibus adopertum, in quo ante potum animalia uolūtētur. Quod exercitium & sanitati proficit, & aegritudinis uitium commonstrat. nam quoties animal, aut non solito more se transuoluit, aut omnino detrahetat accumbere, scias illud ex tædio laborare, & ideo separari debere, atque curari. Ad quod opus quoque plurimum iuuat, si sæpius & cum moderatione animalia sedeantur. Nam imperitia rectoris & incessus eorum debilitat, & mores, præcipue seruorum impatientia, qui absentibus dominis ad cursum equos uehementer stimulant, & non solum flagellis, sed etiam calcariibus cædunt, dum aut inter suos uelocitatem cupiunt experiri, aut cum alienis uehementi obstinatione contendunt, nec reuocant aliquando currentes, nec temperant. neque enim de damno domini cogitant, quod eidem contingere gratulantur. Quam rem diligens paterfamilias summa seueritate prohibebit, et iumenta sua idoneis & moderatis hominibus, scientibusq; tractare committet. Post sudorem quoque si æstus sit, pusca os ablui conuenit: si hyems, muria. Vinum quoque & oleum faucibus infundi oportebit ad cornu, æstate frigidum, hyeme tepesactum, ita ut hyeme meri sextario, olei unciae tres, æstate autem duæ tantummodo misceantur. Nec conuenientium potionum debet cura cessare. nam languor, macies, & tußis, & internorū dolor facile submouetur, si sulphuris uiui semiunciā. i. 3 12. myrræ 3 4. redactos in puluerē, ouoq; crudo imixtos cū hemina uini optimi p os dederis. Est alia sumptuosior, sed accōmodatior potio ad oēs morbos, quæ et celeriter reficit et cū intrisecus purgauerit, curat oēs morbos, tußim ueterē, phthysicos, uulso, et quæcūq; uexata sunt in opertis. Ptisanæ sextariū i. seminis lini hemina, scæni græci hemina, croci uncia i. acronē salsum porci pinguis, uel lōgano nē, uel si porcina defuerint, caput hædinū depilatū, cū pedibus suis, et cordulis intestinorū mūdis, hyssopi fāsces duas, cochleas germanas xv. bulbos xv. ficus duplices xx. rutæ fasciculū i. baccarū lauri cū uirēt sextariū, dactylos xx. allij capita tria, seui caprini uncias 6. pulegij sicci fasciculū; hæc oīa purgata leniterq; cōtusa decoques in aqua cisternina, donec acron ille, uel certe caput hædi lique scat et dissoluatur ab ossibus. propter quod assidue aquā re-

fundis.



fundis ne cōburatur, sed seruēdo pinguescat, uel succus ipse pinguior efficiatur. Post hæc diligentissime colabis ad colum, tū draganti unciam 1. in tres diuides partes, ita q̄ exinde in unā potionē missurus es pridie infundas in calidā ut inturgescat. tunc addis passi sextarios 3. & tribus diebus singulos sextarios dabis, oua numero sex, († inde secundo olei rosati oua plena nūero 2) butyri uncias 3 (In die tertio) anagallici uncias 3 amyli uncias 3. pulueris quadrigarij sēlibrā, lomenti fabæ sēlibrā. Quæ oīa misces, ut dictum est, æquis ponderibus p̄ tridū diuides, & ieiunū aīal potionabis, et horis aliquot deābulare facies, usq; ad septimā, à cibo abstineatur & potu. Animalia uero macie attenuata, nō absq; studio diligenti reuocantur ad corporum firmitatē. Nā oleo ueteri uinoq; permixtis, & tepēctis in sole, per totum corpus unguntur, & contra pilum multorum manibus perfricantur, ut & nerui mollescant, et cutis laxetur, & sudor erumpat. Quo factō cooperta in pontili strato collocentur. Et si hyems fuerit, condita cū semiuncia appij seminis triti, & olei tribus uncijis calefacta p̄ os ipsius oportet infundi. Si æstas fuerit, absynthiū uel rosatum cū 4 scrupulis croci, & duabus uncijis olei frigidū p̄ os similiter debet accipere. Quorū si nō suppetit copia, uinū simpliciter conuenit præberi cū cæteris. Præterea eiusmodi species tpe hyemis cū hordij modij 4 misces, fabæ sextarios 8. tritici sextarios 4. ciceris sextarios 8. fœnigraci sextarios 4. erui sextariū 1. & si meritū equi uel facultas domini suppetit, uuæ passæ et nuclei sextarios singulos. quæ omnia sollerter cōmista cū fuerit, unū modiū in aqua mundissima pridie debes infundere, et paululū mane siccare, ex quo equo semimodiū ante prædiū, et semimodiū ad uesperā dabis p̄ plurimos dies in loco optimo. uiginti uno die ita stabuletur ut intrinsecus bibat. Quod si ulira modum sagina prouenerit, ne pletura noceat auferendus est sanguis à matrice. Præterea graminum radices, quas aratrum frequenter euellit, studiose collige, et quā potueris longas minutatim concide, hordeoq; cōmisce, et quotidie præbere nō dubites. Aestate uero, excepto cruo, species illæ quæ diximus, pro estimatione mensuræ ferragines adinuicem præbeantur, hoc est, hordei uiridis plures maioresq; fasciculos, tritici uel ciceris uel fœnigraci minores & pauci. Quæ oīa cōtusa oportet apponi. Præcauēdū tamē ut in lōgiore uetustatōe uel itineribus, iumēis urinæ copia nō negetur. quæ res nō sine piculo plerūq; differtur. Pedes quoq; eorū post uia erucendi sunt diligēter, ne quid luti

E a uel sord



## ARTIS VETERINARIAE.

uel sordium in articulis basiꝑ; permaneat. Vnguēto etiam confricādi sunt, quo ungule nutriantur, & medicaminis beneficio subcrescat quod itineris attriuerat iniuria. Alij capita tria, rutæ ueteris fasciculum, aluminis scissi et cribrati uncias 6. axungie ueteris pondo 2. stercoris asinini recentis manū plenam, quibus cōmixtis atq; decoctis domi, ut uolueris in itinere uteris ad uesperam. Præterea aliud quod ungulas nutrit & firmat. Picis liquidæ libras 3. absynthij librā 1. allij capita 2. axūgie librā 1. olei ueteris librā semis aceti acrioris sextarium unum, uniuersa contundes & misces, et decoques, & ex eo coronas uel ungues animalīū confricabis. De palatis singulis mensibus minuente luna sanguis detrahatur. quo factō si qua est capitis passio releuatur, & ciborum fastidium tollitur. Oportet autem ferramento concisorio animalium soleas ramulasq; purgari, quod euaporat atq; refrigerat, & fortiores ungulas reddit. Si animal domi forisq; perfrixerit, calidioribus unguentis, quæ multa sunt, lumbi eidem confricentur & cerebrū, potionibusq; & pigmentis, & herbis quarum seruentior est uis, per os continuo oportet infundi, ut perfrictionis incommodum euincatur atq; pellatur. Nā si in uisceribus permanserit algoris iniuria, diuersos, periculososq; procreat morbos. Si uero dierum canicularium tempore æstu animal fatigabitur, uel aquis frigidis est perfundendū, uel in mare flumen ue mittendum. frigidis etiam potionibus recreandum, ut necessitati laboris aut temporis aptior medicina succurrat. Sed in equis non solum utilitas, uerum etiam decoris ratio seruāda est. Nunquam itaq; nisi necessitas passionis exegerit, de articulis refecandi sunt cirri. Naturale enim ornamentum pedum natura in illis constituit. Cervicē etiam ipsam diligens debet ornare tonsura. Multi enim sicut currulibus, ita & sellaribus iumentis pressius colla radunt. Quæ res licet præstare creditur augmentum, tamen sub honesto sessore deformis est. Alij ita tondent, ut arcū uideantur imitari. Nonnulli Armeniorum more crines aliquos in tonsura ipsa per ordinem derelinquunt, Sed gratiora sunt quæ translata de Persis posterior usus inuexit. Nam media iuba ad omnē accurationem ex sinistra parte tondetur, à dextra uero omnino insecta seruatur. Et nescio quo pacto plurimū deceat, quia illud quod naturaliter laudatur Vergilius imitatur:

Densa iuba, & dextro iactata recumbit in armo.

Quod si bicomis fuerit, ut uulgus appellat, mediæ cervicis setas equaliter oportet



portet attondi, ita ut tam dextri quàm sinistri limitis continuata serie iube relinquantur intactæ. Quod nihilominus inuētum constat à Parthis, quibus consuetudo est equorum gressus ad delicias dominorum hac arte mollire. nō enim circulis atq; ponderibus prægrauant ut soluti ambulare cōdiscant, sed ipsos equos, quos uulgo Trepidarios, militari uerbo Tottonarios uocāt, ita edomant ad leuitatem, & quedam blandimenta uecturæ, ut Asturconibus si miles uideantur. In sicco itaq; æqualiq; solo quinquaginta passus in longum, & qnq; in latum plenus cophinis digeritur per ordines creta, ad similitudinē stadij, quod aulicibus asperius sit, tum difficultate coronam uelocitatis optantibus ingerit, in quo spacio cum equus frequētissime exerceri cœperit, in illos aulices necessario offendit, et priores & posteriores ungulas impingit, et aliquādo uel cadit, uel sic offendit ut cadere uideatur, post quod admonitus iniuria, tollit altius crura, & inflectione geniculorum atq; gambarum molliter uehit. Præterea minutos gressus imitatur, ut inter aulices ungulas ponat. nā si extendere uoluerit, offendit in cumulum. Minutim autem equus ambulās commodius uehit, & pulchrius uidetur incedere. Potiones etiam hyemales æstiuasq; conscripsimus, quibus aut conseruetur sanitas perpetua, aut uehemens ægritudo pellatur.

Potio æstiuo tempore danda. Ca. LVII.

**D** Vin æstus incanduit, hæc potio animalibus commoda est, quia humectat & refrigerat: Croci unciam unā infundes in uino ueteri, draganti uncias tres infundes in aqua calida, his adiunges fasciculū uiridis porri 1. item fasciculum uiridis apij, herbæ portulacæ succi heminam, lactis caprini sextarios tres, oua septem, olei rosei librā, mellis uncias 3. passi sextariū 1. uini ueteris quod sufficiat. Ex quibus omnibus diligenter commistis atq; contritis, ad cornu per triduum sextarios singulos animalibus dabis. Alia quoq; refrigeratoria potio: Vini ueteris sextarium, olei librā semis, oua tria, succi coriandri cyathum 1. lactucarum cyathū 1. sollerter admisces, & in tres diuides partes, daturus per triduum iumentis æstuantibus salutare remedium. Tamen eo momento quo potionem defusus es, per singula animalia singulas heminas aquæ frigidæ & recens sumptæ potioni debes adiungere.



# ARTIS VETERINARIAE

## Potio hyemalis Caput .LVIII.

**H**yeme quoq; potio ista præbetur: Vini ueteris sextarios 3. olei selibrā,  
pipis uncia 1. rutæ uiridis uncias 6. cerefolij uiridis uel seminis ipsius  
uncias 3. draganti uncias 3. seminis feniculi uncias 3. baccarū lauri un-  
ciā 1. mellis uncias 6. oua quot uolueris, et passi quantum usus exegerit.

## Potio in Autumno et uere præbenda. Ca. LIX.

**C**osti semiuncia, cassiæ fistulæ uncia, celticæ semiuncia, petroselini se-  
miuncia, betonice semiuncia, glicericæ semiuncia, sagapini semiuncia  
spicæ indicæ semiuncia, saxifragæ, eupatorii, meliloti, irisillyricæ, añ  
semiuncia, centaureæ, gentianæ, aristologiæ longæ, añ uncia 1. anomi, aristo-  
logiæ rotundæ, añ semiuncia, scinoanthos semiuncia, asari, aloë, añ semiun-  
muræ uncia, opopanacis, radicis dracontæ, añ semiun. croci uncia, dragā-  
ti unc. 6. castorei uncia, absynthij pōtici fasciculos 2. hæc oīa in puluerē red-  
da ad. xij. aīa lia p triduū sufficere credūtur, ita ut cū uino optio digeratur.

## Potio omni tempore necessaria. Ca. LX.

**C**osti, meliloti, hyssopi, irisillyricæ, aristologiæ, sampsoci, dracontij,  
asari, draganti, centaureæ minoris, marrubij, gentianæ, spicæ celticæ  
folia, æquis ponderibus misces, redactaq; in puluerem cernes. sed  
si æstiuā dare uolueris potionē, cōmisces croci, mellis, et dragāti quod suffi-  
ciat. Si autē potionē facies hyemalē, addis, piperis, appij seminis, et semis si-  
napi. utroq; autē tpe cū boni uini sextario plenum cochleare miscetur, fauci-  
busq; animalū diffunditur.

## De difficultate urinæ. Ca. LXI.

**D**e urinæ difficultatibus ordine suo multa dicenda sunt, sed uiatorium  
stud, & physicum, & semper paratum te scire conuenit. Lutū ex  
cuiuscūq; equi lotio factū uino p̄misces, colatūq; p nares infundes, et  
confestim prouocat urinā. Itē allium conteres et in anū inicies et ueretrū,  
mox egerit lotiū. Itē, Puluerem quoq; thuris cū ouo uinoq; p̄mixtū, addito  
succo apij et caulū, si potionē dederis, prouocabit urinā. Itē, Betas ac mal-  
uas ad tertiā decoques, ex qbus aquā calentē ad med ū sextariū cū melle cō-  
misces, et p os digeres, proderit minctioni. Itē, Cimicē quoq; uiuū in aurem  
equi mit



equi mitte, et alterum supra naturam in ipso foramine quo mingit confrica, facillimum certumq; remedium est.

### De stropho. Ca. LXII.

**I** Tinerum casibus subuenire cupientes, de pluribus pauca, sed manifesta libabimus. Nā aīalia sub sessore uel onere dolor uentris frequenter affligit, ut uoluentur et procūbant. Semē itaq; rutæ syluestris uel hortēsis si illa defuerit, diligenter tritū cū uino calido per fauces oportet infundi. Præterea aquā in qua usq; ad tertiā betæ decoctæ sunt, succūq; earū nitro trito solerter admisces, oleiq; addes heminā, tepesactaq; in intestinū per clysterē diffundes, cū prius pronū aīal statueris, ut iniectū ad interiora perueniat. quæ si forte defuerit, mel coctū cū tertiā pte salis triti cogis in pillulas, ita ut collyria ad oui magnitudinē faciās, similiterq; pronō aīali in intestinū uel qnq; uel septē, aut nouem collyria inserere curabis. post soluitur uēter et mitigatur dolor. Item, physicū traditur os limacis neq; manu immunda, neq; terra, neq; dente contactum alligare umbilico dolentis curare continuo.

### De dorso curando. Ca. LXIII.

**P** Lerunq; dorsum aīalibus aut sarcina lædit, aut sella, propter stramētī negligentia uel oneris iniuriā. qđ in itineribus interdū necesse est euenire, sed recēs tumor hac ratioē curatur: mallonē ceparū uel ipsas cepas in feruenti aqua decoques, et calētes quantū coriū ualet sustinere, tumori super impones, et fascia ligabis. una nocte oīs aufertur inflatio. Præterea sal tritum cum aceto miscebis, additoq; uitello oui, loca quæ tumere coeperint perfricabis, recens indignatio destrieta siccabitur.

### De probatissima potione diapente. Ca. LXIIII.

**C** Vi cure est aīaliū salus, potione supius declaratā, quā specierū nūero diapenten græco uocabulo nūcupāt, Gentianæ, aristologiæ, murræ, baccarū lauri, rasuræ eboris, paria pondera diligenter trita atq; pmi xta, domi, siue in itineribus prius cōdita, habere oportet in promptu, ut quoties mœstū aut horridū uideris animal, aut morbi alicuius labetentatū, statim plenū cochleare ex puluere memorato cum sextario uini optimi p fauces diffundas, et p triduū, etiā equo in labore constituto, digeras, ut aduersus uirus internum subueniat. probata curatio. Tussienti autem cum passi hemina dabis, et statim sentiet curam. Si liber, cui iam ponendus est finis, legen-



## ARTIS VETERINARIAE

tium non offendit auditum, sequenti uolumine inchoantes à uerba usq; ad ungulas ex diuersis authoribus enucleatas animalium publicabimus curas, ut ordo, qui à natura datus est, in medendi dispositione seruetur, ne indigesta ac membrorum consequentia repugnās pagina quarentē confundat aut tardet.

### FINIS LIBRI PRIMI.

## IN SECVNDVM ARTIS VETERINARIAE VEGETII LIBRVM, PROLOGVS.



**M**vlomedicinae ars iam dudum uitio cupiditatis, et exi-  
guitate mercedis, nullo studiosius discēte, collapsa est.  
Nūqd uero exemplo Hunnorum siue gentium aliarū  
artis ipsius etiam usus intercidet, dum homines resu-  
gentes expensas, barbarorum cōsuetudinem imitari  
uelle se simulant, & incurata animalia hybernis pas-  
cuis, & negligentiae casibus dedunt? Quae res nulli cō-  
pendium, plurimis attulit damnum. Primo quod Barbarorum animalium  
aliae naturae, & ad omnem iniuriam durius corpus est. Deinde quod sic insti-  
tuuntur à paruulis, ut nec potionē medicinalem requirant, & hybernis pas-  
cuis uigeant, ac sine perniciē frigora pruina sūq; sustineant. Nostra uero iu-  
menta & mollioris generis sunt, & tectis frequentioribus assueta, calidissi-  
mis etiam stabulis imbuta, cum indignationem ex aliqua necessitate contra-  
xerint, continuo in aliquod genus incidunt morbi. Diligens itaq; paterfamī-  
lias, cum mortibus animalium suorum & cum medicinae expensis atq; mer-  
cedibus faciat rationem, intelliget unius uilissimi iumenti pretiū ad multorū,  
quae sine dubio peritura sunt si curata non fuerint, salutem posse sufficere.



# VEGETII RENA

TI ARTIS VETERINARIAE LI.  
BER SECVNDVS.

DE VALITVDINIBVS CAPITIS.

Caput primum.



**I**N VNIVERSO ANIMANTIVM genere caput obtinet principatum, quod cminentius cæteris, dominatum quendam circa loci ipsius conditionem sortitur. In eo est odor, gustus, auditus, ac visus: quod quantum habet potestatis, tantum sustinet ex labore discriminis. Causas itaq; ex quibus ægritudines generentur, & signa, per quæ qualitas eorundem possit agnosci: curas etiam, quarum medela sanitas reuocetur, per ordinem indicare tentabimus. Plærunq; autem in corporibus iumentorum indigestionis vitio sanguis corrumpitur: quod euenit cum ex æstu uel frigore debilitata sunt mēbra, & in capite frigus sanguis uertitur in uirus. Tunc enim repletis uenis cerebri membrana distenditur, & somni salubritatem frequenter excludit. Ex quo necessario dolor capitis, mœstitia, & imbecillitas subit. Quæ ualetudo & prima uidetur, & leuior, si uelox medicina subuenerit.

De Appioso. Caput .II.

**C**Aeterum cum noxius sanguis membranam cerebri & ex una parte pertuderit, & eandē dolore nimio cœperit prægrauare, efficitur animal appiosum: cuius & mens hebetatur, & uisus. Nam cerebri incolumitas & oculos pascit & sensus. In qua passione quia una pars capitis prægrauatur, tanquam ad molam uadit in gyrum.

De Frenetico. Caput .III.

**C**VM uero medium cerebrum corrupti sanguinis uirus infecerit, animal freneticum redditur, ut repente saliat, & uelut effugere uelit, per  
F rictibus



## ARTIS VETERINARIAE

rietibus se tanquam irregibilis impingat, nec possit ratione aliqua contineri.

### De cardiacis. Caput .IIII.

**C**ardiacus is est, cui cor dolet. Cardiacus autem fit, quoties sanguinis illa corruptio stomachi uel thoracis impleuerit uenas, cerebrūq; percussit, cor etiam pestiferi humoris labe constrinxerit. Quae ualitudo inducit mentis alienationē, et corporis sudore monstratur. ex quo difficillime liberatur.

### De rabioso. Caput .v.

**Q**uod si Appiosum, simul passio thoracis inuenerit, facit cōtinuo rabiosum. Ex ardore enim nimio iecinoris et sanguinis, uenae cordis neruiq; praefocantur, ex qua constrictione fit dolor ipsius loci usq; adeo, ut mordendo se comedat. Ex quibus ualitudinibus si animal fuerit liberatum, et post curationem aliqua pars cerebri fuerit imminuta, uel tumor subreuerit, ineptum iumentum, pigrumq; redditur. et in illa parte capitis ubi uitium remansit, difficile se gyrabit, et ex eo latere se parietibus iungit, et tarde incedens, non sentiens plagam, ambulaturae gratiam perdit, et erit submisso capite, et cum stare coeperit cum tarditate se mouet, minus etiam uidebit, nec cibum nec potum recusat. Quem si curare uolueris, cyclo curabis. In omnibus suprascriptis ualitudinibus, primum de temporibus minuendus est sanguis, sed et de matrice aliquando tollendus. Cura autē penē omniū similis est, cuius ordinem sequentia declarabunt.

### Qua obseruatione cyclo curentur anismalia. Caput .VI.

**M**emineris autem omnes ualitudines capitis, praecipue ueteres, periculosos, cyclo oportere curari. Cui haec obseruātia et ordo est adhibendus: Triduo ab hordeo abstinebitur animal, temperabitur etiā mollibus cibis, post diem tertiam de dextra ac sinistra, prout aetas aut uires, uel ualitudo permiserint, de matrice sanguis auferetur. Quo facto, per triduum uiridi cauliculorum ac lactucarum sustentabitur cibo. Primo uno die à cibo eum sustinebis et aqua. nouo autem die offas caulium cum liquamine et oleo optimo temperatas non minus uiginti digeræ, cui nihilominus lactu  
cam dab



cam dabis in cibo ter in die. post potionē bibere semper incipiat. Si uero uenter uehementer solui incœperit, caulū offas dare desistes: sed dabis paleas et fursures, ita ut sequente die penitus nihil manducet, sed solam aquam percipiat ad bibendum, ac postero die inducatur in cellam balnei calidā et sudet. Opus est autem diligentia ut reducatur celeriter de calore, ne intercluso spiritu pereat: tunc extergetur diligenter, uinoq; et oleo largiter perfricatus, accipiet cum nitri puluere folia rasani conspersa, quantum commodum est. Postmodum cum radicibus cucumeris asinini uiridis minutatim concisis oleum optimū misces, et in uase nouo ita decoques ut tertiam perdat. ex quo singulas heminas per capita animalium per triduum dabis, ut potio uētre m resoluat. Sed si ultra modum fluere cœperit, lenticulam et hordeum pari mē sura friges, et de his singulas bilibres per dies singulos cum fursure et paleis dabis. Quinq; itaq; diebus operam refectionis eius impendes, et leuiter exercebis, ut intelligas quantum uires corporis sanitasque profecerit. Post hæc cum pro arbitrio despumabis. Sequēte die caput eius purgabis exorica, uel radice dianaria, quam Artemisiā dicimus: si hæc nō fuerint, ex liquamine optimo cū oleo mixto. cuius caput pedesq; connectis, cum bene purgatum agnoueris. soluito, butyrum ex oleo roseo solutum infundes in nares, ut illo purgationis mitigetur asperitas, ita ut singulæ cotylæ singulis naribus infundantur. Si supradictæ potiones non soluerint uentrem, mellis, hellebori albi pondus unius denarij cum hemina dulcis uini bene tritum in potione recipiat, uel certe scammoniæ pondus duorum denariorum diligenter tritæ cū dulcis uini hemina simili ratione diffundes in fauces. Quod si uenter ultra modum dissolutus discrimen importat, anagallicum succo ptisanæ ad restrictionem ipsius dabis, lenticulamq; et hordeum frixum, singulas bilibres cū paleis et fursure præbebis in cibo. Ad ultimum, partes quæ in causa sunt, sinapizabis diligenter, sinapizatum cauterere ferreo, uel quod utilius creditur cuprino combures, uita curaturus ex more. Potionem quoq; ex antidoto polygresto per dies plurimos dabis, et exercebis leuiter, et ad cibaria ipsius aliquid per partes semper adiunges, donec ad pristinam consuetudinem reuocetur. Insanabiles ualitudines cyclo affirmantur posse curari, id est, insani corroborari, caduci cyclo curati uruntur in capite; morbidi uero, dysenterici, coriaginosi, orthopnoici, strophosi, cyclo curentur in renibus.



## ARTIS VETERINARIAE.

### De cerebro commoto. Caput . VII .

**C**erebrum plerunq; diuersis passionibus commouetur, quod his deprehenditur signis; Ambulabit prauus, & frequenter offendet, & toto se corpore commouet. Cuius ista curatio est; Baccas lauri nūero **xx.** nitri selibrā, rutæ manipulum; quæ omnia diligenter trita, cū aceto non acro, & oleo optimo rosaceo cōmixta, hyeme calefacies, perunctoq; oleo capite eius & cerebro, uel auriculis, cerebellū de lauata pelle cōuoluis. Quæ si forte defuerint, farinam hordeaceam resuāq; miscebis, ex quo cataplasma cōfectum cerebro oportet imponi. Præterea ceram oleo cyprino coniungis, & linteolo inter auriculas ad ceroti instar imponis. Sed & reliquum corpus potionibus resouēdum est. Tres fluuiatiles canculos cōteres diligenter, et cū duabus uncijis succi caulii, addito lactis sextario olei duobus cyathis, p̄miscebis, & colatum per os diffundes ad cornu. Quorum si inopia est, mellis cyathos duos, aquæ calidæ sextariū **i.** coquito, ex quibus pastillos facies, & in aqua frigida dilues, & dabis in potum. Præterea si hyeme curaueris, farinā triticeam: si æstate, hordeaceam, aquæ frigidæ adinuicem amuli permixtā in potione præbebis.

### De dolore capitis. Caput . VIII .

**D**e capitis dolore multi authores multa dixerunt. Cuius hæc sunt signa: Tumor circa oculos apparebit, pabulum recusabit, lingua eius & palatum labiaq; tumbunt, quanto uehementius increuerit morbus, tanto exoritur amplius tumor: ambulātes toto corpore uacillāt, umbrāq; suam uelut odorantes expauescunt. Cuius passionis ex corruptione sanguinis nascitur causa, cum indigestio ciborum naturali meatu intercluso, uel certe derelicto, in eas uenas, quæ circa tempora sunt, defluit, membranāq; cerebri uitiat. Cui sanguinē de temporibus oportet minui, & cōtinuo oleo acetōq; permixto caput largiter perungi. Quod si hyems fuerit, hordeum pridie infundes in aquam & decoques, calidamq; in saccellos immittes, iumentorumq; caput fumentando diutius uaporabis. Alij authores tolli de palato sanguinem iubent. Tunc cimoliam cretam ex aceto infusam, & merdā bubulam recentem cum nitro trito miscent, & in cacabo super carbones decoquant, calidūq; cerebro languentis imponunt, aceto rigantes ne creta astringatur



gatur ad pilos usq; cum prius calida fumentauerunt caput. Dolorē capitis propē ad insaniam ista signa demonstrāt: Quoties graue est, & in præsepio se deponit, lachrymæ frequenter oriuntur, auriculæ stabūt, oculi grauiores erunt, anhelitus creber, aridus pilus, tremores frequentes, tristis aspectus. Quem in primis ab aqua abstinebis ne nimium bibat, de utraq; parte colli sanguinem detrahes, caput sicut scriptum est curabis.

## De Distentionibus. Cap. IX.

**D**istentionis quoq; ualitudo ad capitis præcipue causam refertur. Cuius hec erunt signa: Impediente caligine obscurabitur uisus, tremor & sudor totius corporis insequitur. Quod uitiū contingit ex aqua, si sudans iumentum biberit: uel ex indigestione cibi, si non dormiat, uel substrictus manserit. Huic capitis membrana distenditur. Quæ passio cæterarū ualitudinum & fons probatur & mater. Nisi enim inter initia curaueris caput ut animal dormiat competenter, fiūt appiosi, insani, rabiosi, frenetici, cardiaci. Igitur cū aīal distentionis ægritudo comprehēderit, de ceruice eidē sanguinē tolle pro magnitudine corporis & ætatis. Et si æstas erit, oleo & aceto caput totumq; corpus perunges, & diutissime confricabis, loco refrigerato & opaco inclusum continebis, substernes etiam stercora sicca uel paleas, ut prouocet ipsa mollicies ad cubandum, locum calidum declinabis, nam impedit somnum: fursure uel palcis uel folijs lactucarum reficies. præterea potū præbebis exiguum: cum cōualescere cœperit, modicis ambulationibus exercebis, ubi idoneum uisum fuerit ad cibaria largiora infusum hordeū ad pristinam consuetudinem paulatim per incrementa reuocabitur. Si die septimo non profecerit, sanguinem iterum de temporibus emittes, & caput sine intermissione curabis. potionem dabis qua sanātur appiosi: Nasturcij seminis, appij seminis, seminis lactucæ, anagallici, petroselini, aneti, papaueris syluatici seminis uncias singulas, piperis scrupulos 3. croci drachmā unā. Quæ oīa bene cribrata atq; cōmixta ex aqua temperabis, trochiscos facies, ut habeant non minus quā singulas drachmas. In dieta unū trochischū in aqua dissolutum per os digeres. quod quotidie oportet fieri donec sanitas redeat. Si non appetit cibū, singulos trochiscos solutos cum succo ptisanæ quotidie præbebis. Vinū nūq; dabis. Capitis enim ualetudo sumpto mero deterior efficitur.



## ARTIS VETERINARIAE

### De Appioso. Caput .X.

**S**i quod iumentum appiosum fuerit, in praesepio incumbit, oculos tene-  
sos habebit, micabit auriculis, uisus caliginem patietur, & gyrat in cir-  
culo tanquam ad molas.

### De rabioso. Caput .XI.

**Q**uod si etiam fuerit conuersus in rabiem, sic intelliges: Subbito hinc  
niet tanquam sanus, parem suum appetit morsu, uel hominem, praesepia  
aut ilia sibi mordicans rodit: quae sicut appiosum curabis. Pro-  
sus abstinebis ab hordeo, mollibus cibarijs sustentabis. Praecipue tamen apium ui-  
ridem quantum uoluerit praebabis. Sanguinem de temporibus aut de ceruice  
emittes, loco tenebroso statues, caput eidem huiusmodi acopi cōfectione cura-  
bis: Opopanacis librā 1. resinae, ter bentinae atq; uncias 2. galbani unciam 1. resinae  
frixae uncias 3. mastice tritae uncias 2. olei ueteris librā 1. ex hoc ei cere-  
brum & auriculas confricabis, oleum tamen solum ac liquidum in aures eius  
suffundes. cuius tamen prius quam acopo utaris, saccellationibus caput cere-  
brumq; uaporare te conuenit, & caput appposito cerebello communire. Po-  
tiones quoq; ex trochisco supius memorato quotidie praebabis, collyrio acri  
inungis assidue ut caligo ex oculis possit auferri. Quae cura si non profice-  
rit, caput & tempora sub ipso protocomio semisse inuris cauterio, quod &  
sup uenas temporales facies. Pleriq; tamen facies ne deforment iumentum solo ta-  
als † usto. bulare palati († confecto) sani fieri possent. Feruor enim foci debilitatem ca-  
pitis tollit, & membranam menti pristinae, sanitatiq; restituit.

### De Insania. Caput .XII.

**A**lij authores insanientis iumenti ardentes & sanguineos oculos et  
humore suffusos, stantes auriculas dicunt uel micantes, ut ad instar  
indomitorum nec capi possit, & captum, parietibus se illidens conetur  
effugere. terram pedibus fodiet, et multum flegmatis ex ore profundet. quod  
hac ratione curatur, ut auferatur ei sanguis de angularibus uenis, de palato,  
& post de cruribus. à cibo eadem die abstineatur & potu. Alia aut die aquam  
frigidam dabis ei bibere. Auferantur stercora quae in ano eius sunt, per quatrimum  
continuato clystere, curabitur uenter, ungetur cerebrum, secreto conlocabi-  
tur loco



Cur loco, accipiet in substantiam porros, et herbam molliſſimā, aut molliſſimum ſcœnū. His potionibus percutiendum: pulueris turis drachmā 1. aceti albi ſextariū 1. radicis panacis unciā 1. herbæ ſaxifragæ uncias 3. ex aqua mulſa per os dabis. Lactis caprini ſextariū unū deſundis in fauces. quod ſi deſuerit, ciminū ruſticū pondo duo in puluerem rediges, additoq; olei optimi uno ebulo, ex aqua mulſa diſſundis ad cornu. Sed cæteris potio hæc aptior creditur: apij unciā 1. iuſquiāmi unciā 1. ſeminis apij unciā 1. ſeminis lactucæ uncias 2. papaueris ſylueſtri unciā. quæ oīa in puluerē redacta cōmiſces, et unū cochlearium magnū ex aqua dabis, uel ſi cibū non accipit, ex ſucco ptiſanæ: obſcuro et frigido et laxiore loco ſtatues, ſilentiūq; præbebis ut dormiat. prius tamen oleo ac pice liquida caput perunges, auresq; complebis, tempora etiā munies cerebellare uel ſaſcijs, mirtam quoq; aridā conteres, et aceto oleoq; miſcebis, corpusq; eius totum diutiſſime conſfricabis. Solent conſtringi et obſcui ſtercore ut ſudent et dormiāt. Quibus ſi ſomnus uenerit, aſſeret ſanitatē. Rabioſum uero iumentum eadem omnia, et maiora oſtendit quā inſanum. Nam et alia animalia comedit, et facit ipſa cotaione rabioſa. Plerunq; etiam morſibus inteſtina ſua extrahunt et ineunt fortiter. Quæ ualeatudo ex nimia ſanguinis abundantia et ardore contingit. Curatur aut obſervatione et potione ſuperius declaratis.

## De Chirurgia. Caput .XIII.

**C**hirurgia appellatur quodcunq; ſecatur ferro, uel cauterijs uritur. quæ cum ſit omnibus membris animalium, præcipue tamen capitis neceſſaria eſt medicina. Quodcūq; igitur iumentū in qualibet parte fregerit caput uel nudauerit caſu, ſollicite curandum ne indignatio uulneris in neruos cerebrūq; penetrādo piculū generet, nec in primo medicamētis uti acrioribus cōuenit. ſed magis melle curare, cū ad maturitatē uenerint illa quæ fracta fuerant, oſſa laxantur, tenta ſollenter, et mobili manu uel ſorſicibus eximito. Reliqua fragmenta oſſis, quæ aſperata ſunt ferramentis cædito atq; prædito, ut carnē ſacilius inducāt. Nūq; enim clauditur uulnus ſi non raſeris, donec ſanguis per os ipſius reſpōdeat. In quo maior eſt adhibēda cautela, quæ ſolet in locis oſſuoſis et cōmiſſuralibus fiſtula fieri. quæ cū euenierit, parum periniuria aſſicit uulnus, per quod non ſanies, ſed humor liquidus emanat. nec unquam deducta cicatrice ſolidatur. Quod ſi euenierit, hæc ratione curabis.



## ARTIS VETERINARIAE

Papirum per ipsam fistulam traicies, ita ut capita papiri, quæ extra fistulam eminent, ex utraq; parte alligas lino ne cadat, et diebus v. uel pluribus, donec callositas fistulæ papiri distentione turgescat, et maius uulneris foramen fiat. Tunc ad mensuram uulneris ex fistulari medicamento collyrium faciens, ex empto papyro intra fistulam injicies, ut impleatur ex integro, plane ne excidat munies diligenter. Post dies quatuor uel quinque soluis. Si fistula ceciderit, traumatico curabis, quod uulneri semper immittes, donec spissa sanies et non multa in eo loco reperiatur. Cum autem iam lymphidum uideris collyrium, fac pollinem herbi, et thus masculum tritum æquis ponderibus cum melle decoquito, et plagæ ipsi imposito, per dies plurimos quotidie curato ita, ut de primas ipsas partes uulneris, quatinus iunctæ citius coherescant. Si grauer offendit caput, ut cerebrum uexet intrinsecus, continuo de temporibus sanguinem eidem oportet auferri, et spongiam aqua, si æstas fuerit, oleo roseo, et aceto æqua parte commixto capiti eius imponi, fasciâq; connecti, et cibos uirides præberi. si nec ipsos appetit, quia omnem cibum recusat, fabam moles et conuertes in pollinem, farinam quoque triticeam pariter admisces, et cum mulsâ per cornu ad substantiâ animali tam diu faucibus eius infundes, donec cibos uirides appetat, quos aqua marina uel salsa oportet aspergi.

### De auribus. Caput .XIIII.

**A**urium ut uicinitate proxima, ita periculi non discrepans cura est. Quæ si casu aliquo fuerit à radice contusa, et collectionem fecerit, eam cum maturauerit, scalpello secato, et pus finito fluere. tum linis aceto acerrimo et oleo per triduum, quarta die traumatico curato donec sanetur. Etiam si cartilagnem uexauerit, eiusdem medicinae obseruatione proficiet. Si uero à radice auriculæ, uel commissura capitis tumor magnus cum duricia extabit, ex fœnigræci et lini semine et tritici polline cataplasma imposito, maturatam collectionem scalpello secato, ita ut inferius plaga spectet, quatinus humor per prona decurrat. Vino, oleo, et sale mixto infusos leniscos inducis, et uulnus per quatríduum fouebis post traumatico uteris. sed difficilis cura est, quia fistulæ in talibus locis frequenter oriuntur. quæ si euerint, suprascripta curatione curantur. Si tamen ægritudo uulneris ulterius etiâ post medicamenta procedat, uicina urenda sunt partes, et cauterio in ipsis coll



ipsis collectionibus insigenda sunt puncta uehementius, ut et cutis et causa perumpatur interior. post solerter uista curanda sunt. Non enim aurium est negligenda curatio, ne ex dolore nimio generetur insania. Primum purganda est auris diligenter intrinsecus, ut auferatur quod dolorem mouet, aut ledit. Si nihil inuenitur, spongiam nitro & aqua molliter infundes et dilues, unamq; noctem intra auriculam infusam spongiam manere patieris. Die tertio nitro & aqua calida fouere incipies frequenter et diu, donec dolor recedat. Quod si aqua fuerit ingressa, oleum uetus & acetum æquis ponderibus adiecto nitro in aurem mittito, & succidam lanam superimponito. Si uulnera fuerint lyparem auribus inseres & curasti.

### Depilis qui nascuntur in oculis. Cap. XV.

**Q**uodcumq; iumentum in oculis tritiacem patietur, id est, ut pili aliam palpebram urentes lachrymas moueant, uisumq; conturbent hac ratione curatur. Non longe a pilis ab interiori parte scalpello plagam dabis in cute palpebræ, post forpicibus per longum ad mensuram oculi fasciolam præcides, et impositis fibulis consues palpebram foris uersus, ut oculus sine deformitate recipiat uisum & gratiam naturalem. Tunc uero optimo oleo, necnon etiam muria infusam spongiam superpones, & oculum fasciabis. Post die quinto soluis, tunc intrinsecus oculum collyrio curabis. de foris uero tetrapharmacum impones, non prius fibulas ablaturus quam duxerit cicatricem. Nihilominus & cadentibus fibulis, collyrij cura non deerit, ne caro rursus superflua excrescat. Sed pleriq; adhibent cum deformitate compendium, ut partem que prominet ad mensuram naturæ forpicibus amputet, pusca que frigida sunt propter fluxum sanguinis foueant, oculum collyrio intrinsecus curent, ne indignationis necessitate ledatur.

### De suffusione oculorum. Caput. XVI.

**S**uffusio sicut hominum, ita iumentorum impedit uisum, cuius tria genera ab autoribus indicantur: Stenochoriasis, plotochoriasis, hypochoriasis, græce papula nōiatur. Stenochoriasis dicitur, cum constringitur uisus et uires amittit. Quæ hac ratione curanda est, ut sanguis de temporibus auferatur: radicem quoq; feniculi, et herbam celidonium uel rutam decoques ad tertias, et cotidie ex ipsa aqua quantum manus patitur, oculus foueatur. Inun-

G ges etiam



ges etiam collyrio opobalsamo, quod suffusionibus prodesse consuevit. Aduersus infestantes pilos tertia cura est, ut leni tenuiq; cauterio genæ quæ procreuerint inurantur, quo facto, ducta cicatrice conteritur pellis, et palpebra alterius eleuata à pupilla cursu pilorum arcet iniuriam. Platochoriasis autem est cum se ultra naturalem modum pupilla diffundit, et eripit uisum, nec curari ullatenus potest. Nam sicut oui uitellus casu aliquo disruptus in priorem formam coire non potest, ita semel pupilla diffusa recipere non potest usum uidendi. Quod euenit equorum sudore dum membrana quæ cōtinet lumen, indignatione caloris disrumpitur: uel certe sollicitudo longi itineris ad indignationem iumenta compellit, aut læsum oculum domini curare neglexerit. Quod cum accidit, oculus uidetur incolumis, nullis lachrymis, nullo sanguine, nulla indignatione prodit iniuriam, sed uisus tantum declaratur indicio, quod in pupilla ipsius imaginem tuam tanq̃ in speculo uidere nō potes. Hypochoriasis autem à capitis humore descēdit, et in uno oculo sese primo ostendit, postea etiam ad alterum transit, Intelliguntur autem humore uel lachrymis. Continuo sanguinē ei de supercilio uel de ipsa parte temporum detrahes, fomentabis ex tepida aqua, in qua radices feniculi decoctæ fuerint cum ruta. Preterea inunges collyrio opoponato et opobalsamato. Quod si institeris medicinæ per lachrymarum cursum consuevit sæpius caligo sanari. Temporales quoq; uenæ cauterijs inuruntur, et metum humoris excludunt.

### De paracenthesi in oculis. Caput .XVII.

**Q**uod si uis passionis intulerit cicatricem, diligenter attende quo colore sit membrana, quæ apposita pupillæ impedit uisum: si auroso colore fuerit, insanabilem scias. Si candida nimiū, etiam noueris nō posse curare ipsam. Si uero spissa fuerit colore oleagino muco similis, per paracenthesin ad hominū similitudinem, cum fuerit maturata curatur. Iumentum igitur pridie temperabis à cibo, uel potu maxime prohibebis, in loco molli elides, caputq; eius et ceruicē apte collocabis, ita patentē oculū facies, ut claudere nō possit. deinde ab ipsa fronte paracetheriū inter tunicas oculares subiicito, ne pupillam tangas, aut aliquid lædas interius, sed ipsum albū de superiori parte ubi hypochisis posita est, capitello paracetherij deorsum deprimis



primis ad palpebrā inferiōrē subtiliter. Quod si depositū fuerit, nō prius paracenterium eximas, nisi clausum oculum penicello calido diutissime uaporaueris, solet enim resilire. Quod si ita euenerit, reprimito, donec ita componatur ut resilire non possit. Cum itaq; intellexeris claritatem pupillae sine ullo obstaculo hypochisis, tunc eximes ferrum, et inuenies aīal uidere. curabis sic. Ex oleo roseo et oui albo anacollima facies, lanam infundes, et super oculum curatum impones, ac desuper fasciabis. Caueo ne ipsa die manducet, et moueat oculum agitatione maxillae, sed tamen si uoluerit bibat. Altera die soluis et calida fomentabis diutissime. deinde foenigræci succum in oculo subfundis, et rursum anacollima supradictum similiter imponis, fasciabisq;. Quod cum per triduum, aut quatrimum feceris, oculum soluis, et foenigræci succo fomentabis, ex melle optimo attico unges donec cicatrix se confirmet et oculus.

## De oculo lunatico. Caput. XVIII.

**E**st aliud uitium eiusmodi, ut interdum oculo album inducat, interdū lymphidet: ex qua passione lunaticum oculum ueteres nominauere. Cuius ista curatio est, ut de ipsa parte temporum detrahatur sanguis, interpositis diebus sub oculo. Nihilominus sanguinem oportet minui. Cotidie quoq; calido fomento oculum curabis desoris, Intrinsecus autem inunges collyrio thermantico et acerrimo per plures dies donec recipiat sanitatem. Si nihil ex hac ratione profecerit, uenas superiores in temporibus supra ipsum locum qui sustinet passionem, diligenter perquires et inures, ut humor noxius possit arceri.

## De staphylomate oculi. Caput. XIX.

**Q**uodcumq; iumentum in oculo habuerit staphyloma, incurabile est: talis tamen curatio consueuit adhiberi: De sub oculo sanguinem ei detrahes, et fomentabis calida cum radicibus fœniculi et rutæ decocta, inunges etiam collyrio non ualde acri, si uulnus fecerit et deplauauerit, ex succo foenigræci fomentabis, et inunges collyrio leni, quod facit ad tunicas ruptas, donec se cicatrix cum planitie claudat, tunc uteris acriori collyrio, et per dies plurimos, donec quaecunque pars æquari possit



## ARTIS VETERINARIAE

equari possit ad naturæ similitudinē, cōpleaturq; ut nō deformetur obtulus.

### Ad album de oculo tollendum. Caput. XX.

**S**I casu aliquo aīal oculū impigerit, aut cōfricauerit, uel ex percussura laeserit & albū induxerit, etiā si totus oculus præclusus sit, tamen expi-  
mētis hac ratione probatū est cito posse curari. Hederam colliges terre-  
strem & in pila mundissima diutissime contundes, succum exprimes, ex hoc  
animal inunges; potestate medicaminis quicquid desperata, consumitur albugo.  
Sed si terrestrem hederam nō inueneris siue baccas hederæ siue folia contū-  
des, & succum exprimes, & ex eo succo inunges. Si hoc quoq; difficile ui-  
debitur, aut morosum, paululum aquæ frigidae cū folijs hederæ diutissime cō-  
tundes, succum exprimes, & per siphonem ei in oculum desundis. Quod  
cum per dies plurimos tam mane quā ad uesperam feceris albū omne tol-  
letur. Sed si uinū miseris optimum & recens efficacius curata sanat.

### De suffusione curanda per nares. Cap. XXI.

**A**Liqui authores dixerunt, si dexter oculus suffusionē suscepit, uel  
album incurrerit, dexteram partem naris, si sinister sinistram dili-  
genter inspiciet: in ipsa callositate narium foramina subtilissima in-  
ueniet, quibus tenuis inferenda est fistula, per quam ille qui curare debet  
os plenum uino insufflet, ut merum per foramen illud penetret. Quo facto  
oculus incipiet lachrymare. Velocius autem proficiet, quia per interiores  
uenas meri uirtus ad oculum penetrat.

### De diuersis passionibus oculorū. Cap. XXII.

**I**Vmentum in oculo in osse percussam, si tumorem fecerit durum, callo-  
sum, & ossilagini similem, hac ratione est curandum: Deiecto animali  
contra causam ipsam, cutem aperito, & ossis cisorio gingiuulam, uel  
cartilaginē uel os quod ex se ex crescere coeperit, cædito, ut deplanes ad simi-  
litudinē partis alterius. Si apte deplanaueris, aceto et oleo linteolis uel licinio  
ad dito, locum ipsum completes, & fasciabis. tertia die solues, & similiter cura-  
bis p̄ dies. s. donec feruor desinat. post traumatico uteris. Catastolico quoq;  
medicamento libraturā cutis consumis, quam diu lympidum uulnus curetur et  
adequetur. Quod si ipsum os concarnari non potuerit tam diu cotidie era-  
dicam



dicato donec sanguinet atq; concarnet, ita ut medicamenta congruentia uulneri imponas. Quod si post sanitatem causa eadem crescere cœperit, punctis cauterio subtiliter urito. Oculorū epiphora infra oculū detractus sanguis emendat, si usq; ad sanitatem melle optimo inungatur assidue. Preterea prodest eidē passioni; myrræ pōdus denarij unius, crocodili stercoris semiunciā, salis armoniaci semiunciā, sepiæ ossiū semiunciā, mellis attici cyathos 2: ex quibus omnibus tunsis atq; permixtis oculū perunges. Magnæ lippitudinē adhibetur tale remedium: Murre trogloditis unciā 1. thuris masculi, croci siculi, limpidis cipriæ, æris usti, añ uncias 2. teres simul, consparges & cernes, aquæ cœlestis, & falerni uini, mellis attici adicies quantū sufficit, in uase uitreo condes, & cum necesse fuerit uteris. Si casu ciliū ruperit, fistulam dabis & mannā thuris cum ouo impones. Discutit cicatricem oculorū eiusmodi compositio: Spicæ nardi unciā semis, salis armoniaci uncias 3. catiniæ unciā semis, croci unciā 1. piperis semiunciā in puluerē conuerteres & uteris. Albi uitia deterget ista curatio: Sepiæ marinæ ossis rasi 3 decem, croci 3 duos, salis armoniaci scrupulos 2. myrrhæ, crocodili stercoris scrupulos duos. Item, album siue glaucomata emendat: uini amenij ueteris sextarij tres, gariofili sextarius, mellis unciæ tres, quibus omnibus decoctis uteris. Album tollit si ex humore uel percussura euenerit: Sandaricæ unciæ 2. ossis sepiæ combusti unciæ 4. piperis albi semiuncia, salis armoniaci unciæ 2. cum melle permixtis. Cicatricibus oculorum medetur ieiuna salina, si cū sale mandatur in ore, & expuatur in oculum. Sal quoq; tritū cū osse sepiæ, & sinapis agrestis semine. Collyrium nardinum; opopanacis scrupulos 2. uiolæ uncias 2. spicæ nardi, cassiæ, marrubij añ semiunciā, croci siculi unciā semis, olei semiunciam & scrupulos 4. piperis albi uncias sex, gummi scrupulos 5. Item alia confectio collyrij: Eruginem eris & salē optimum æquis ponderibus & aceti quantum sufficit musces. Necessaria compositio: rute scrupulos 4. thuris masculi, stercoris columbini, murium, olei, croci, mellis, catiniæ, olei rosati añ scrupulos 4. diligenter trita miscebis & uteris. Si uero oculus ictu uulneris insanabilis redditur, & (ut Mulomedici dicunt) canchremata fecerint, ne periculum mortis incurrat, erui pollinem cum oleo rosco & ouo simul immittito. Cū purgatum uulnus fuerit, cum melle attico inungito. Sunt & alia multa collyria, quæ quia eandem uim, easdemq; species continēt, enumerare superfluum duximus.



## ARTIS VETERINARIAE

### De strumis iumentorum. Caput XXIII.

**P**lerumque strumae, uel parotides, aut scrophulae iumentorum guttur infestant, et faucium tumorem producant. Nam et subrecto sunt capite, et tanquam ab stranguria praefocantur. Hos primum fomētis calidis, et cataplasmate ex polline hordeaceo et resinae uncijis tribus mero ualido coctis, curari expedit: et cum collectio fuerit maturata, scalpello secari opus est, et quicquid collectum fuerit emittere, et aceto, et sale, et oleo infusos lemniscos subijcere. ceteris quoque diebus traumatico, et medicamentis aptis solleter curare si uulnus pateat, dum sanetur. Nam in his locis ex praeclosure cito solet fistula fieri: quae si euenerit, ut supra demonstratum est, papyro et collyrio poterit persanari.

### Deglandulis. Caput XXIII.

**G**landulae quoque animalibus, et praecipue pullis, usque ad periculum interdum molestae sunt, et in morbum transeunt aliquando. quae inter maxillas inferioresque fauces nascuntur, et ad similitudinem pillularum maiores, aliae uero minores connexae ex carne obdurescunt, et tumorem sine doloribus faciunt. Quae inter initia perunctae oleo, picula perfricari solent, uehementiusque manibus corrumpi, et ita uelut uanescendo sanari. Quod si excreuerint amplius, deiecto animali, ita ut per medium secentur scalpello subtiliter cum radicibus eximuntur, ne aliqua uena tangatur. Quo facto, aceto et oleo cum sale, medicamentisque superius declaratis sananda sunt uulnera. Plerique urenda dixerunt. Sed si paruae sint prodest, ceterum maiores execandae sunt ferro.

### Depullaribus. Caput XXV.

**D**um caput pullorum calefecerit prima dentitio, inter gingiuas atque maxillas tumor, collectioque generatur, quae pullaria uocatur. Cuius passionis tanta tensura est, ut manducare uix possint. Sed cataplasmatibus studiosissime maturanda sunt, deinde scalpello aperienda, post sale et aceto et oleo curanda. Plerique etiam, cum ferro exemptae fuerint glandulae, propter sanguinis fluxum loca uri debere praecipiunt, post sale et oleo octo diebus uruntur, nec non ex nitro et aqua calida diluunt. Si nitri inopia est, lotio calido aut lixiuio utuntur, Deinde uinum et oleum et farinam de eruo imponunt per triiduum, consequenter de uino ac oleo, et farina hordeacea, et melle percurant. Ad dentes, quaecumque plaga fuerit aut strumae uel parotidis, glandulae, quae tolluntur



luntur licio medicamento, uulnera percurari ita, ut de mali granati sicci puluis aspersus, celeriter adferat sanitatem.

De fistula maxillæ, Vel de conficiendo collyrio  
fistulari. Caput .XXVI.

**S**I ex aliqua huiusmodi curatione iumentū fistulam in ore fecerit, hac ratione curabitur: papyrum iniicies in fistulam, ut pars eius in ore extet, quam lino diligenter ligabis ne possit elabi: pars uero foris exeat, quæ nihilominus constringenda est lino ne cadat, triduo permaneat, quarta die papyrum eximes, Collyriumq; ad longitudinem & cauaturam uulneris ad arctum fistulæ subijcies, & ne forte labatur, fasciabis locum, ita ut ad māducandū possit maxillas agitare: tertio die solues. Si fistula ceciderit, diebus septem unguento traumatico curabis. deinde collyrium ex melle & erui polline decoctum subijcies ad plenitudinem foraminis diebus plurimis. Ad ultimum, anapleroticum ipsi uulneri medicamen imponis, donec omnis plaga, ducta cicatrice, solidetur. Fistulare aut collyriū hac ratione conficies: anisi uncia .i. ferule uncia .i. æruginis æris uncia .i. battitur & calcetis uncia .i. cimini semis uncia .i. teres cū aceto acerrimo, et secundū qualitatem uulnerū, cū usus exegerit, collyria formabis.

De expositione fistulari. Caput .XXVII.

**F**istule nascuntur, quoties neruus, aut cartilago, aut os negligentia uel impitia curantis, ex plagæ alicuius tabido humore uiciatur. Tūc enim quæ commeauerit ad instar cuniculi carnem indurat & incallat, & fit fistula, quæ nulla ratione sanari potest, nec aliquando coire, nec solidari, nisi penitus eximatur. Huius à diuersis autoribus tradita est diuersa curatio. Alij enim scalpello resecari & apiri iubēt, et stringotomio decarnari, medicamentisq; acerrimis cōsumi, et sic postmodū uulnus ad cicatricē coire. Quod cū laboris ac discriminis habeat plurimū, minus tamē prodest. Alij uero cauterio omnē fistulam inurendā, uicinasq; partes eius punctis feruentibus præurēendas esse duxerūt, quatinus per ignē callositate submota, astalticis medicamentis uulnera percurētur. Sed melius est fistulā, sicut supius declaratū est, papyri iniectione curare. quia neq; neruus, neq; uena, neq; cōmissura uexatur. Nā scalpello uel cauterio sæpe fit causa deterior, et piculū creāt. Collyriū uero omnem



## ARTIS VETERINARIAE

omnē callositatē fistulae de alto à radice eius eximit. Quod si os fuerit uexatum quod oporteat radi patens uulnus, per medicamenti curam nō potest impediri. Si uero in alto tabes aliqua uel neruus aut cartilago remanserit, ex eodē collyrio puluerem facies, & frequenter inijcies. Omnia enim uulnera elympidat atq; persanat.

### De tumore faucium uel capitis. Cap. XXVIII.

**I**nterdum ad similitudinem synanches animalibus fauces & caput interiorius intumescunt, adeo ut bibere aut manducare non possint. Cuius totum & os & lingua, aqua calida fomentatur, & taurino felle perlinitur. Potio autem datur huiusmodi ad cornu: olei ueteris libras 2. uini sextariū 1. cōmīscēs quoq; nouē caricās cū nouē capitibus porrorum, decoques, & diligentissime conteres, & in aqua ipsa nitrum alexandrinū triū quantum sufficit mīscēs, & ex his omnibus potionem mane & ad uesperum heminas singulas dabis, ut tumoris ipsius relaxetur ac mitigetur asperitas. Manducet autem herbam uiridem, aut qđ melius est pascatur. Quae si defuerint, farinam de hordeo facies, cui nitrū admiscebis, & sic apponis. Fœnū quoq; molliissimum eliges; quod nihilominus nitro & aqua cōsparges, sanguinem non detrahas nisi forte de palato, despumes, cum cœperit conualescere, nitrum tunsū & cribratum, pulueres de radicibus cucumeris asinini syluatici cōmīscēs & uini sextariū, coclearia pulueris ipsius iunge, ut huius potionis uiresoluto uentre purgetur. Alij authores tumorem capitis ac linguae uel faucium, etiā si obdurauerit, ita festinantes propter periculum curare nituntur: lapides molares plures igne succendunt, cum candere cœperint, caput equi cooperiunt, & uas plenum lotio sub ore & naribus supponunt, & per uices singulos candentes lapides in lotium immittunt, ut ille uapor ac fumus à calore lapidum concitatus, os equi & nares impleat, et fuste transuersum, ut apertum os habeat debet accipere. Quod cum diutissime feceris, aquam marinam calefacito, uel certe salem in aqua dulci mīscēs, fouendoq; dissoluis, addito aceto acerrimo, caput eius & os & ginguas diutissime confricabis. Postea fīmū bubulinū cum acri aceto mīscēs, & tepē facies, ex quo caput totum frontemq; & labia perunges. tunc farinam hordeaceam cum aqua tepida suffecienter pro cibo dabis & potu.

Si ex ple



## Si ex pletura sanguinis fauces tument. Cap. XXIX.

**Q**uod si ex sanguine tumor ille indignationis euenerit, ita intelliges, si uenis tēsis obturabitur & halitus, et oculi sanguinei apparebūt, cui de al's auditus. temporibus si non tument, aut certe de palato si ibi indignatio nō erit, sanguinem oportet auferri. cretam cimoliam duabus partibus & tertiam partē cretæ nigræ, ex uino austero tēperabis, & dū calet illinis caput.

## De intomatibus. i. de Tuberibus. Cap. XXX.

**S**ciendum est autem tubera in corporibus iumentis frequenter excrecere, quæ greci intomata uocāt. horū uariæ q̄litates & diuersa sunt nomina. Stechatoma est tuber qđ in se adipem uel pinguedinē cōtinet. Melicæris est tuber in quo caro inspissata, quo modo in uerrucis inuenitur. Aneutrisma est tuber in quo sanguis cōspiratus uberis uenæ similis inuenitur. Actero ma est tuber in quo farinosa cōgeries reperitur. Ganglion est tuber quod sit ex duplicatione nerui, similis tubero cum dolore immobili. Horum omnium una est curatio. Iumentum colligatum deponitur, & contra locum causæ sagitta aut scalpello in longum dextra ac sinistra pro mensura tumoris aperitur, ita ut media fasciola cutis, quæ supra tuberū est, intacta permaneat. Post egestis uel euersis omnibus quæ tumorem mouerant, medicamentis cōpetentibus, ea quæ supra declarata sunt, producit ad cicatricem.

## De lingua incisa. Caput. XXXI.

**S**i iumento lingua fuerit incisa, statim cum fibulis consuito, deinde uino lauato, post gallinam tundito & puluerem cernito, ex eo imponis donec sanetur: cui dabis scenum molliissimum concisum, & pro hordeo fursures. Alij postq̄ fibulas acceperint linguaq̄ uino fuerit elota, mel imponendum esse duxerunt, ut plagam purget & curet. Ad ultimum ex malo granato puluerem iniecerunt.

## De gingiuis &amp; dentibus. Cap. XXXII.

**S**i iumento loculamenta dentium. i. gingiue uel dentes doluerint, hijs agnoscitur signis: hordeum solidum glutiet, macescit, saluarum plurimum effundit, gingiue intumescunt. Cretam cimoliam cum aceto acer

H rimo ma



## ARTIS VETERINARIAE

rimo macerato, & calentem extrinsecus maxillis inducito, ne minus quinque diebus: gingivas autem interius cum pulvere corticis mali granati, & melle tertia die diutissime confricato donec egesta sanie conualescat. Quod euenit, cum humor acrior ex capite, in maxillarum defluxerit uenas.

### De osse fracto. Caput . XXXIII.

**Q**uod si animal iuxta collum uel molares, uel alio oris loco os frigerit, ut morsum claudere non possit, et apertis dentibus horreat pro-  
pendentibus labris, continuo calida fomentabis, & labrum & quae sunt disrupta componis, fasciola tenuissima aceto & oleo madefacta diligen-  
ter unam partem, deinde alteram cōpingis ad locū, & similiter fasciato, ne iterū  
al. t. crumenā dissipetur: Cui & t. corbem cōstrictam oportet imponi, ne deprauet dentes  
& labia. Cum solueris ad curandum, manu quae ante composueris contineto,  
furfurem & farinam hordei mixta in cophino ad manducandum dabis, ita  
ut quamdiu manducat, manus tua à loco quem continet non recedat. Cum  
iam manducare noluerit, offero ei aquam ut bibat. Cum biberit curato simi-  
liter, ut supra scriptum est. cui et succum ptisanæ conuenit dari, si minus for-  
tasse manducauerit. Quem tali obseruatione per dies quadraginta curatum  
restitues sanitati.

### De cartilagine narium si sanguis fluat. Ca. XXXIII.

**I**mento narium cartilago si corrupta sit, & sanguis reprimi non possit.  
Spongiam asram & thuris masculi pollinem commixtum impone ad lo-  
cum qui laesus est, et si uulnus factum fuerit in cartilagine, hac ratione  
curato. Interdum animal despumatum remissus semel de palato sanguis nō  
potest reprimi, propter quam necessitatem, sicut supra scriptum est, in loco  
in quo sagitta ruptum est palatum, spongiam imponis, caputque eius sur-  
sum constringe, & aqua frigida renes cerebrumq; testiculosq; persundis.  
Quae res si tardius subuenit acatiam nigram & thuris pollinem aequis pon-  
deribus ex aceto acerrimo temperabis, totumq; caput illinies, donec sanguis  
ipsa constrictione claudatur.

### De palato, si uena se nō clauserit. Ca. XXXV.

**M**ature piculū creat cū incisa uena claudi nō potest in palato, sed cō-  
tinuo sanguis pfluuiū inhibetur si aut candēti cauterio fuerit meae-  
tus ille cō-



tus ille cōbustus, & suspēsum altius caput. Cū per nares sanguis defluit, nec potest aliter retineri, coriandrū uiridē sufficienter tundes, succumq; eius expressū, substricto equo, naribus infundes, frigore naturali uenas p̄tinus claudis: chartā etiā et lanā cōbures, ipsumq; puluerē p̄ fistulā insufflabis naribus.

De genere & qualitate mucorum qui per nares fluunt. Caput . XXXVI .

**M**ucorum etiam qualitates, qui per nares effluūt, conuenit nosse, ex quibus genus passionis ostenditur, & causa cognita facilius curari potest. Mucus lymphidus cotidianus est, & nisi minus fuerit, non debet esse suspectus. Crassus autem & candidus à cerebro defluit, & admonet ad medelam capitis festinandum. Rubens, tenuis, frigidus, ueteris perfrictionis prodit iniuriam. Propter quod thermanticis potionibus calefieri animal oportet. Cœruleus, i. fuscus leuis ab interioribus uenit, q̄ indicat febrē. et ideo conueniēs leptiperisis, i. piretran adhibenda curatio est. Crassus autem, spumofus, & pallidus, à pulmonibus nascitur, qui suspiriosos ostendit: quibus difficile, nisi festinatum fuerit, subuenitur. Fabaceus uero à glandulis serpit, quæ celeriter aut eximēdæ sunt, aut ferro curandæ, ne cōuertātur in morbū.

De cuferino. i. cum post cursum sanguis de naribus fluit. Caput . XXXVII .

**S**æpe sine ictu uulneris animalibus per nares sanguis fluit. quod uitiiū cuferion uocant, quod præcipue contingit, si equus ultra uires agatur ad cursum: omni corpore oleo & aceto perungendum est animal, ac loco tepido statuendum, cooperiendum etiam diligenter, dandaq; opera ut moliter cubet, nec ad deambulādum cogatur, sed cibo diligentius reparetur. tunc erucæ unciam i. cum lacte cōteres & per cornu naribus infundes. Quod si eruca defuerit, aristologiæ unciam i, croci semiunciā cū uino dulci conterito, & deijcito per nares. Similiter coriandri uiridis succum exprimes & naribus infundes.

De polypo. Caput . XXXVIII .

**S**i polypus oritur in naribus, præcluso spiramine strāgulabitur, stertet. Humidi profluēt muci, picula passiōis plurima. hæc medicina subuenit. Si prope polypus fuerit, acutissimo excabitur ferramēto. Curādū his



## ARTIS VETERINARIAE

rebus quibus circuncisa sanatur. Si uero altius fuerit, cauteriū plumbeū quadratū facies, ex quo calefacto polypū frequēter inures, & sic polypū sanas.

### De siderato. Caput .XXXIX.

**I**umentum si fuerit sideratū, his agnoscitur signis: Labia eius & maxillæ nec non etiam nares eius deprauantur in parte, ita ut uix cibaria dentibus inlidat. Quæ etiam humoribus plena reperies, & cum uoluerit bibere, os usq; ad nares demerget in aquam; quia infirma sunt labia, quibus haustus attrahitur: aceto & sale lingua eius & labia diutissime perfricantur, donec sanguis emanat. Tertia die causticum crudū in illa parte labij imponis, quæ sentit iniuriam, cū cautela, ut prius alliges linguā, ne medicamēti uiolentia noceat. Cum medicamento labia perusta uideris, aqua lauabis, deinde aceto & oleo fouebis, sicut alia uulnera, & hac ratione curabitur. Si uero maxillā sideratam habuerit & tortam, hæc est cura: De temporibus partis ipsius sanguinem detrahis, sinum bubulum acerrimo aceto permiscebis, & diutissime decoques, & parti temporum ex qua sanguinem extraxeris, calidū inducis sæpius, ut exiccetur & curet, hac usus potione: Trixaginem, hyssopum syluaticum, origanum, serpillum, aristologiam, mannam croci pro æquis ponderibus cōtundito atq; cribrato, ex quo puluere plenum cochleare cū aqua mulsa oleo & uino per narem sinistram ad unam heminā quotidie oportet infundi.

### De obseruatione flebotomi. Caput .XL.

**C**onuenit de ceruicis curatione dicturo, obseruationem indicare flebotomi; quia circa ea loca frequēter operatur. Detraكتور sanguinem animal a cibo abstinebis & potu, equali loco constitues, tunc locū supra ceruicem alius teneat et adstringat ad normā, ut uena facilius appareat, Deinde supra laqueū de sinistra manus pollice uenā deprimas, ne ludat, tunc sagitta tangas. Duæ autem uenæ a capite summo descendunt, & conueniūt se sub maxillis usq; ad gulam, inde a geminis uenis inferius quatuor digitis, feramentum deprimis, ne in gulam mittas, & bifurcum tangas, & iumentū occidis. Statim sagittam duobus digitis tenebis, nec plus ferri imprimas, quàm extra digitos eminebat. Nihilominus etiam mediano digito manū tuā moderatō suspende, ut sit leuior, ne uehementius imprimas quàm oportet. quia nō plus debet quàm mucro descendere. Si parum apte profluat sanguis, iumentū

scennus



foenum dabis, aut aliquid quod manducet. Agitatione maxillarum plus sanguinis uena profluet.

### De ceruicibus. Caput .XLI.

**S**I iumentum ceruicem eiecerit, aut laxauerit, aut certe uertibulas eiecerit, uel extorserit, hac ratione curabitur: Deponito iumentū atq; constringito, & ceruicem eius extendito supra fossam, donec omnia uertibula laxentur. Post oleum uetus & axungiam ueterem tunsam colatāq; permisce, & cum calefacto eodem unguento ceruicem diligenter infundis, in locū reponis, & fasciā tenuem & amplam ex oleo tepido & uino madefactā alligabis ad corpus. Lanās quoq; succidas ex oleo & uino infusas supra conuerter, post regula soleagni s nō minus quatuor digitis, ita ut tantum spaciū sit inter regulas alligatas & cōnexas, & lino constringes. Et si aestas fuerit quater in die suffundis; si hyems, bis. Cum modum fecerit, regulas solues. hoc die quinquagesimo & primo, post unctionibus uteris, donec ad sanitatē perducas. Si tardius confirmabit uires, regulatim & solenniter uista curabis.

### De malandria. i. de uulneribus ceruicis. Ca. XLII.

**S**I iumento malandria de ceruice auferre uolueris, ita facies; Candentia prius cauteria preparabis, deinde ferramento decarnabis, sic, ne nervos tangas, & uenulas quasunque uideris emittere sanguinem, aduris. ut possit cruoris fluxus inhiberi. Caue autem ne cauterijs plus aduras, et indignatione neruorū periculū facias. Post axungia ueteri ceruicem perfricabis, & fascia munies. Sequenti quoque die cataplasma imponere incipies, ablataq; († ferunta) lotio calido fouebis, deinde aceto & oleo dilues, & medicamentis aptis curabis. Si iam uideris cicatricem pilos renouare, puluerem ex canino capite combusto, & adipem suillum recentem permisce, & inducis; ex quo medicamento & sanitas consequitur, & pilorum redit ornatus.

### De distillatione ceruicis. Caput .XLIII.

**S**I ceruix distillationē patiatur, tumidior uidebitur quā oportet, scrorem habebit canceraticum cum humore nigro & liquido. Cuius foramina scrutaberis diligenter, ne ulterius inter nervos aut armorsum distillationem fecerit. Quod si accidit, pauca hinc difficulter euadunt.



## ARTIS VETERINARIAE

nam his signis discriminē ostenditur: stridet de pectore, & per nares humore liquidū proijcit. hac ratione curabis. Foramina de super marrubio et sale pariter contuso implebis, atq; calcabis, subter autē cataplasmate apposito laxabis. Et si loci cōditio patietur, dieresim dabis ut foras per plagas humor emanat. tertio quoq; die calida urina lauabis. deinde traumatico & pannis lineis lymphida & purata iā uulnera sanare incipies, Cuius cōpositio talis est: erui pollinis sextarium, irisillyricæ uncias 2. thuris masculi uncias 2. miscebis, & facies cephalicum medicamentum, quo uteris ad consumptionem medela.

### De dissolutione scapularum. Caput. XLIII.

**Q**uod si iumēto scapulae fuerint dissolutae, diligēter inspicias, ne quas inter neruos & cōmissuras pendignes faciat, quod si inueneris quacūq; parte plagas accipere poterit, cataplasmatibus mollire, & scalpello uel cauterio aperire curabis, ut sanies illa atq; collectio defluat. Foraminibus autē traumaticū & linteola sicca dabis. Si quod inter neruos foramē factū fuerit cautissime curato, ne ulterius aut ferrū aut cauteriū procedat, neq; putorem neq; putredinem lauis, sed magis siccis omnibus curare festina. Nā omnis humor distillationi praeſtat augmentū, Quum incisa uel uſta duxerint cicatricem, pro confirmatione in ultimo causticum imponitur.

### De armis laesis. Caput. XLV.

**S**i armus laesus erit, in medio crure utraq; soluētur uenae, et puluerē thuris cum eo qui profluit sanguine copiosissime immisto armi lineantur. Quod si plus profluat q̄ necesse sit, stercus ipsius iumēti fluētibus imponitur uenis & fascijs alligatur. Postero quoq; die quasi aposcreſis fit, & ex eisdē locis sanguis detrahatur, atq; similis in omnibus cura procedit, Ab hordeo abſtinebitur, foeno sustentabitur exiguo per triduum. deinde porri tres cyathos olei hemina miscebis, & per cornu faucibus infundes. Post sextum diem lente ingredi cogatur, & cum ambulauerit, mittatur in piscinam uel flumen aut mare ut natet, cum sparcia & pannis uincto pede, postea firmioribus cibis ad saginam pristinam reuocādus. Si leuiter dolebit, uino & oleo tepēfacto perfricetur in sole: si ualidius dolebit uentum in armū mittito, atq; pertundito à summa iuba infra digitos octo, ne cartilaginem tangas. Et cū inflaueris, serula uel uirga molli armum cedito, sale & oleo perfricato. ipso die postre-



die postero stracta uteris; cuius hæc erit compositio: simile sextarios duos, si defuerint pollinis triticei sextarios duos, cum aceto acri & cum tribus ouis miscebis: sed ouorū solū albū mittes: adijcies etiā pulueris thuris unciā semis. Quæ omnia manu subigis, & in armos inducis, & per dies multos armum aqua calida cū flore fœni fouebis diligenter, ut mollescat, stractam quotidie imposito, de uino puro armum lauato, Additurus unguentum: baccas lauri selibrā, olei sextariū, uini boni sextariū, nitri uncias 3. sed nitrū et baccas lauri in puluerē rediges, & cribrabis. Ex quo in sole, cū calida armus fomentatus fuerit, inungatur ex tepido, & diutissime confricetur. Post syncrisma ad curandos armos inducitur, & cum melius habuerit natatum mittito. Quod si eiecerit iuxta consuetudinem ad rotam armum reponito, & supra scriptis medicamentis curato. Si non senserit, ultimum est ut uratur. Armī doloris hæc sunt signa: pedem priorem tantum quasi rigidum a foris extrahit (sed conuenit inspicere diligenter utrum ex percussura uel casu coeperit eā) & si ex iectura fuerit, prius locis suis reponenda sunt membra, & sic reliqua facienda. Quod si ex humore uel sanguine armī grauabuntur, sanguinem emittis à pectore uel unctionibus uteris.

### Degenuemotouelbasi. Caput .XLVI.

**G**enu uel basim si semouerit ad tormētum rotæ uel macine, locis suis eiecta restitues, lanam succidam ex oleo & aceto infusam imponis, et alligabis ex more, tertio die solues fomentabisq; , post resinam induces & piculam, ad ultimum malagma uteris aut caustico.

### De fractura articuli, cruris, uel coxæ. Cap. XLVII.

**I**mpulsu axium uel rotarū in circo uel in alijs locis uarietate casuum animalibus crura franguntur, aut coxæ uel articuli, in qua necessitate si extracutē fractura ossis erupit, hoc est, si t exbercen fecerit, difficilē noueris et prope insanabilē curā. Similis desperatio est, si coxam fregerit, aut tacroceria, aut supra gambam, insanabilis est casus, quia non recipit ligaturam. Si uero fractura sit sine uulnere in his locis, quæ constringi possunt, hac ratione curabis: Primo fracturam recompones, & fascies, mundis scissilibus infusis ex uino & oleo conligabis, Insuper lanarū munimenta coniūges et regulas circumduces, Iumentū aut in cauterio uel in scalis uel insuspensio loco, ut

als. tatrocola.



## ARTIS VETERINARIÆ

als. ne fracta loco, ut fractura uelut leuiter commeet, cui quotidie mane & ad uesperane  
ra flebiliter. suffundes, tertio die solues, & expleta curatione ligabis. Quinto quoq; vii.  
aut ix. die eadem facies, donec corpus inducat. Post hæc adijcies muscum de  
uitice, aut salicis radicem, & oua cruda quinque, uerum non regulis, ut prius,  
sed circumductis ferulis alligabis. die tertio solues & fomentabis, de resina &  
axungia perunges: ubi cura profecerit, malagma uel causticum inducis, non  
ante tamen permittis stare iumentum quàm dies quadraginta prætereant.  
hoc autem tempus est quo diuulsa uel fracta solidantur.

### De flegmone, marmore, siue mallonibus. Cap. XLVIII.

**P**lerunq; in genibus, uel articulis aut phlegmon oritur, aut marmora,  
aut mallones. Quæ uitia ex malo humore generantur, & passionem  
cum deformitate tumoris ostendunt, Sed ista distantia est, quod phle-  
gmon tuber est molle, marmor duriciam ostendit ex nomine, mallo inflatus tu-  
ber est sine dolore, quibus recentibus potest facilius subueniri. Primo lanam  
succidam ex oleo & aceto induces, contra aquam frigidam & currentem  
animal constitues, Post sine ferro hac ratione curabis: Sinapis & salis alex-  
andrini 4. aceti cyathos 2. axungie ueteris selibram, simul conteres & in-  
duces, post diem tertium soluis. Si aperturam fecerit, spongiam cum aceto &  
lasere imponis, uulnera stiptico curabis. Preterea locum, quem curare uolu-  
eris, inducto philotro decaluas, Radicem filicis & eruium & ficus aphros  
contundes in pila & induces in panno, per triduum ligatum patieris mane-  
re. Alij radicem filicis & eruium cum axungia ueteri & aceto acerrimo pu-  
tant oportere misceri. Item cineris quoq; de foco uncias 3. calcis uiuæ un-  
cias 6. uino subigito ad crassitudinem oximellis, & anteq̃ obdurescant, tu-  
bercula obline. Quod si assidue in recenti feceris, passionis molestia siccabi-  
tur: Si uetustiora sint, punctis subtiliter inurantur, ne ui & igne uiciantur.  
Talis quoq; cõpositio spargere phlegmon asseritur. Rhododanes uncias 3.  
bituminis, nitri aut uncias 3. axungie ueteris colatæ uncias 3. pleriq; dixe-  
runt cauteria cuprino candenti duobus punctis debere prærumpi, & phle-  
gmon effundi, licineo quoq; intorto cū axungia, & aceto, & oleo loca, de qui-  
bus muscus eiectus fuerit, satiare: per foramina etiam ustionis lemnis cū trahi  
debere, ut quicquid humoris est, egeratur. Post hæc cataplasma et fœnugræ-  
co, &



eo & uino confectum inducis, cū uista ceciderint & tumor resederit, lemniscum eximis, traumatico curabis, ad ultimum causticum inducis. Alij sagitta pertuso corio phlegmon effundunt, & lanā madidā cū aceto et lasare plagis inserūt, sic spongiā cum pusca acri & lasare supra uulnus imponūt: tertia die solluunt, lanam eximunt, & tetrapharmaco curant quinq; diebus uel septem. Si uero marmor habuerit, ex quo ualidius claudicet, & uix flectat articulos, inurēdus est leuiter. Cui post feruntam malagma, quæ cupressina appellatur, oportet imponi. Ex qua curatione sanitas redditur, & deformitas permanet. Si autem mallon in genibus uel articulis excreuerit, continuo curam adhiberi oportet, ne neglecta passione deformitatem tumor augeat, uel obduratione diuturna conuertatur in marmor. Aperies in pedibus siue genibus dextra ac sinistra uel ferro uel cauterio cuprino, sicut superius declaratū est, lemniscum traicies cum aceto, et sale, & oleo, ut supra, cataplasma imponis, donec feruor desinat et saniem faciat. Post purgatis uitijs lemniscos eximis, et traumaticū imponis, et ternis diebus interpositis solues, et medicamentum renouabis, donec sanetur.

### De aquatilibus & ozœnis. Cap. XLIX.

**S**I aquatilia in articulis uel in gambis fuerint, frigido ferro oīno nō sunt tangenda, ne abundantia humoris iumento discrimen importet. Sed utē dum est scarificatione subtili, et detractōne sanguinis, post quæ lauis ualidissimis, tam cum aceto quā cum optimo sale tunso, et oleo, uel axungia, per dies quinq; conliganda sunt loca. Si tardius hæc cura profecerit, utendū est feruentissimo caustico ut faciat ustiones. Alia quoq; ratione sanātur, si sletam qua trictores utuntur, et salem pro dimidia parte commisceas, lanamq; succidam ex aceto alliges, post diem tertium soluturus. Si aperturam fecerit farinam hordeaceam ex melle coctam cum lini semine & fœnigræco inducis, ad ultimum malagma crudum impones. Præterea atramētum sutoriū, gallulas minutas, & alumen æquis ponderibus tunsum cum axungia miscabis, addito puluere mali granati, nutro, & aceto: quæ in commune decocta, uitium si adiungatur emendat. ficus sicca cum sinapi cōtusa mixto aceto imponuntur. Post diem tertium soluto medicamento, si tardius profecerit, eadem cura renouatur. Cum melius habere cœperit, alliccem impone articulis. Alij opoponacem cum farina hordeacea coctum in modum cataplasma-

I      tis impo



## ARTIS VETERINARIAE

tis imponunt. Nonnulli fabam fractam in aqua decoquunt, & mixto melle deterunt, & in panno inducentes curant. Ad ultimum malagma cupressinum imponunt. Plures calcem uiuam & cineres ex melle & uino commiscet, et ozænis frequenter imponunt. Ad ultimum caustico utuntur. Quæ genera curarum et posterioribus pedibus adhibenda ueterum censet auctoritas, usus inuenit, addito sale et aceto cilicij ozænas defricare, donec cruor aut tumor emanet. Quæ observatio etiam si non persanauerit, sequentes tamen adiuvat curas.

### De pedibus reumaticis siue uentosis. Cap. L.

**I**nterdum reumatici iumentorum, interdum uentosi sunt pedes: quæ uitia nunquam tangenda sunt ferro, sed exiccanda per malagmas uel causticum, et aliquando urenda leuiter per uenas, ut cauterij meatus, qui humorem suscipiunt angustentur, et constringantur, ut pro tempore asserant medicinam. Quia in totum, etiam si intercise & adustæ sunt uenæ, non poterit talis causa sanari.

### De impetiginibus. Caput. LI.

**I**mpetignes quoque in articulis uel genibus inter neruos commissuralibus locis aliquando nascuntur, & fit uulnus simile ragadio, & non facile sanatur, nisi stalticis uel stipticis rebus, non sine alligatura, uel interdum adustione curetur. Malagmas quoque conuenientes oportet imponi.

### De uligine. i. dulcedine. Caput. LII.

**V**lignes etiam in pedibus, cruribus, unguibusque uel sub armis aliquando generantur, quas quidam dulcedines uocant, habent similitudinem scabiei. Quæ cum se diffuderint, pedes exulcerant ad similitudinem lepræ, & urgente prurigne animalia sibi partes illas corrodunt uel alternis pedibus confricando uulnerant. Quod uitium à crudo uel putrido humore consuevit generari, & idem curatur detractione sanguinis, unctionibus, & purgationibus uentris, si radix cucumeris syluatici cum nitri puluere misceatur infusa per fauces, humores pessimos purgat.

### De podagra iumentorum. Caput. LIII.

**P**odagra uero nonnunquam solet occupare iumenta, cum hominum uitium transit in pecudes: cuius passionis hæc sunt signa: nec stare potest nec ambulare, sed si cogatur, claudicat, & sæpe se proijciet, sicut indigesta ex  
hordeo



hordeo animalia faciunt, quæ propter dolorem non coquunt cibum, & ideo fit horridum, & corpus eius calebit, uenæ etiam extabunt, natura submissa erit, in pedibus sterco hærebit propter nimium eorum calorem, sicut subtritis solet euenire: cui proderit si non sinatur accūl ere, sed minutim deābulare & loco sicco, donec sudet, multorum manibus cōfricari. Iū est, ut uehementius sudet, sanguinem ei detrahes à capite à superioribus uenis, sed non multum. sequenti die de posterioribus locis detrahes supra talos. tertio de gambis uel de sub iosis dolorum locis. Memineris semper parum oportere detrahere. Aquam calidam dabis in potu, in qua adijcies puluerem nitri, & triticam farinam, pollinem quoque thuris acetabulum plenum in uino maceratum infundis, & triduo per nares singulas cotylas: betas etiam excoques & aquam earum ad tres cyathos suffundes, & exercebis eum singulis diebus, uentrem quoque eidem expurgabis ut auferatur humor pessimus, qui descendit in uenas. Hoc genus purgationis adhibebis: thymi acetabulum plenum in uino ueteri dulci macerabis, et singulas cotylas per nares eadem infundis, foenum uiride adponis. Quod si defuerit, ficcum nitro aspersum dabis. Si nihil profecerit, castretur, & uitio carebit nam podagra raro uexat eunuchos.

### De orthocolis siue stillosis. Caput .LIIII.

**O** Orthocola etiam iumēta uel stillosa dicuntur, quæ contractionē neruorum patiuntur in pedibus, & de capitibus ungularum calcant, & sunt rigidi articuli, pleuas ungulas in terram ponere non possunt. Quod uitium nascitur ex enormitate uenerum & labore cōfragosarum uiarum. sed hac ratione curantur: sanguinem ei de subcirro uel de coronis detrahes, ungulas bene compones, pollinem ex hordeo & resina cum axungia decoques, & ter in die perunges: tepidam quoque in qua uerbena decocta fuerit, consuebis, et tota eius crura acopo perfricabis. Post dies quique cataplasmas eis ex pollice hordei & lini semine & foenigræco aquis partibus ex uino decoctis cataplasmas imponis in omnibus cruribus ante acopo perunctis ab auriculis usque ad pedes, quæ loca lanis succidis munies & fasciabis, & ter in die paulatim incrementum facies. Si hoc non profecerit malagma hæc articulis eius imponis: armeniaci, galbani, opoponacis, medullæ ceruicæ lib. 2. resinae terrentis uncias 2. apocimatis librā, resinae fixæ librā 5. oleum uetus quod sufficiat, lento igne decoques et colabis, impones in alutam per dies plurimos omnibus pedibus, donec sani sunt. Sed necessar



## ARTIS VETERINARIAE

dies inducas. Item subtritis pedibus prodest, picis liquide selibrā, aceti heminam, salis librā, helere folijs quantū sufficit pariter contundis, & laboranti quotidie pedes perunges. Mollissimæ ungulæ hoc uno medicamento, quo potentius nihil est, assolēt indurari. lacertā uiuū uiridē in ollam nouam mittis, adijcies olei ueteris librā i. aluminis iudaici selibrā, ceræ librā, absynthij tunsi selibrā, & decoques cum lacerto: Cum fuerit resolutū, calentia uniuersa colabis, abiectisq; ossibus & purgamentis, liquatum medicamen in ollam remittes, & cum ungues indurare uolueris, ungulam subradis, & factum unguentum in cannam uiridem mittes, adhibitis carbonibus, prope feruens, per canam instillas ungulis: prouisurus ne coronam tangas aut ranulas, si his exceptis, in solo & in circuitu solidaturus ungulam confricabis. Memineris autem ungulas excrescēdo renouari, & ideo interpositis diebus uel singulis mensibus talis cura non deerit, per quam naturæ emēdatur infirmitas.

### De dorso confirmando. Caput . LIX.

**A** Nimaliam dorsa ut laboris plurimum sentiunt, ita diligentius sunt curāda Exceptis enim his, qui deputati sunt circo, reliquum mulorū, equorū, asinorūq; genus sub sellis aut sagmis solo tergo prestat officium. Vnde laudabilior industria est, quæ incolumitatem tuetur, quàm quæ cupit læsa curari. Nam diligentia defendit à uitio, si centones uel saga primū sufficientia, deinde mollia imponantur, & lota, atque ad tempus diligenter excussa, ne aliquid sordidum aut asperitatis inherereat quod sub pondere inulceret pellem: tunc sagmarum uel sellarum mensura conueniens, & apta qualitas debet adhiberi. Si enim ista minora fuerint uel maiora, angustiora uel ultra modum lata uel quæ non congruunt, grauius nocent. Hinc enim collisiones, suppurationes, apostemataq; nascuntur, cum nimis locis in æqualibus premitur pondere, uel discentes tracturam mercurius aut spina deteritur. Ipsorū quoq; pondere, etiam si in stratis nulla sit culpa, enormitas nocet, & ideo temperanda est mensura ne inferat uulnus.

### De dorso curando iam læso. Caput . LX.

**Q**Uod si dorsum sedentis iniuria tumere iam cœperit in recenti statim mallonem ceparū i. calamos siccos unde fæces dependent, in aquam feruentissimam mittis, & aliquandiu maceratum, calidum super cu



super tumorem impones, fascia constringes uel cordiscum super impones, una quoque nocte manere patieris absque suppuratione palpabitur tumor. Quod si clauum fecerit, farinam hordeaceam cum folijs caulium contundis pariter et tepidam impones. Cinerem quoque cum oleo miscebis, et inducis quam diu clauus cadat: cum ceciderit lyppara utere cum minutissimis pannis, uel mel cum linteolis; cum ulcus purgauerit, licio percurabis.

### Si pulmunculus nascitur in dorso animalis. Cap. LXI.

**S**i pulmunculus natus fuerit in dorso, difficile est eum medicamentorum appositione siccari: sed si paruulus fuerit, cauterere, et praecipue cuprino aperiendus est, ut sanies quam colligerat, egeratur: tunc curandus est sicut moris est uista curari. sed commodius est pulmunculum decusatim ferro secare et eximere, ita ut pellem ad modum praecidas, ne cum cicatricem duxerit, inueniatur epidarmus: oleum, acetum, et sal continuum addis in plagam, et ne nimius sanguis erumpat, stercus ipsius uulneri superponis et colligabis, die tertio folia caulium tinsa cum oleo, et aceto imponuntur per dies quinque. Cum iam ducere cicatricem coeperit, licio curabitur.

### Si uulnus fecerit. Caput. LXII.

**S**i uero fecerit uulnus, indulgebis otium, ut diligentius curetur, et recepta sanitas confirmetur indutijs, nec imponendus est labor qui rescindat adhuc teneras cicatrices. Sanatur autem ulcus si gallas syriacas combustas cum melle superimponas. Pulueres quoque corticum pini et flos calcis uiuae aequo pondere miscebis, et uulneribus inspergis. Pillulas quoque cypressi tinsas, et cribradas, et cortices quercus tritos et in puluerem reductos mittis. Praeterea ossa sepiarum et testas etiam ostriarum in puluerem rediges, et aerei quoque uasis fuliginem pariter miscebis, quae bene tinsa si frequenter asperseris, siccatum uulnus ducet celerius cicatricem.

### Ut pili renascantur. Caput. LXIII.

**Q**uod si pili tardius crescant, uiuam testudinem supra sarmenta combures, et cineres eius in nouum cacabum mittes, additis uncijs 3. alumini crudi, medullae ceruinae quod sufficit, et uino infuso decoques et diebus plurimis



## ARTIS VETERINARIAE LIB. II.

als. † uino

rimis imponis reuocare pilos creditur. Puluis de fabis cōbustis, uel de lupinis crudis uel de folijs fici cōbustis † seuo cōmixtus superponitur assidue. Quod si nulla præcedēte causa decidūt pili, Spica nardi, uuas passas pariter tundes & ex aceto decoques, calidumq; medicamentū glabro corpori impones.

### De denigrandus pilis albis. Caput . LXIIII.

**S**i album pilum nigrescere cupias, atramēti sutoricij scrupulos 7. odoraphinis succum scrupulos 4. cepi cparini quod sufficit pariter temperabis & uteris.

### Vt pili nigri albescant. Caput . LXV.

**S**i diuerso albos pilos facere uolueris, cucumeris syluestris radicum libram unam, nitri scrupulos duodecim, in pulueres cogis, heminam mellis adijcies, quibus permixtis uteris.

## FINIS LIBRI SECVNDI.

## IN TERTIVM ARTIS VETERINARIAE VEGETII LIBRVM, PROLOGVS.



**M**vlomedicinæ me commentarios ordinante, ciuium, atque amicorum frequens querela, accepti operis cōtinuationem suspendit, desistentium ægitudines, mortēq; clamorissimas boum, cum magnopere peterent publicandum, si quid pro salute tam commodorū animalium scriptum reperiretur in libris. Cedens itaq; familiarium honestissimæ uolūtati, ex diuersis authoribus enucleata collegi, pedestriq; sermone in libellū contuli. Cuius erit præcipua felicitas si eum nec scholasticus fastidiat, & bubulcus intelligat. Maximo autē incitamento mihi fuit ipsorū boum utilitas & gratia, sine quibus nec terra excoli, nec humanum genus sustentari ullatenus poterunt. Cuncta igitur legumina siue frumenta bobus merito aratrisq; debentur: uinearum ipsarum usus



rum usus periret nisi eorū adminiculis subuehendis carpēta sudarēt. Quid de diuersorum onerum cōparatione referamus, dum inter mobilia & quicquid grauius est, absq; uehiculis pene reddatur immobile? Reliqua quoq; animalia, ipsēq; cohortales aues & eorum capiunt labore substantiam. Vnde enim equis hordeū, unde cibum canibus, unde porcis pabulū dominorū solertia ministraret, ni pararētur boū labore frumēta? Et ne longū faciā bobus debēt alimēta quicquid ali potest. Apud alios genus mulorū, apud alios camelorū, apud paucos elephātorū licet exiguus usus est, nulla potest natio esse sine bobus. Postremo ut ad prouidentissimorū uirorum scripta redeamus quorū firmatur auctoritas iusticiā iumentorum cæde uiolenta derelictis terris ad siderum remeasse consortem. Quid potest laudabilius reperiri quā ut nomen æquissimum, boum fugaretur interitu? quod dum homicidia fierent permanebat in terris. Duplicem igitur sollicitudinem oportet impendi, ut sanitas incorrupta maneat, et ægritudo quæ ex casu uel negligentia siue labore contracta est, competentis medicinae curetur ratione.

# VEGETII RENA

TI ARTIS VETERINARIAE LI-

BER SECVNDVS.

DE OBSERVANDA BOVM SANI-

TATE. Caput primum.



**V**T LONGÆVI ET SANI SINT boues, bubulcum cōuenit prouidere uel dominū, quatinus frigoribus calidissimo cubili muniantur, & si fieri potest, semper foco uicini sint boues. Quodam enim beneficio naturali eiusmodi animalibus semper ignis commodum est, siue q; inutilis & pestifer humor exudat, siue conceptū ex pastu uel opere frigus expellitur, siue in flammarum halitu interna curantur. Præsepium oportet extructum esse  
K diligenter



## ARTIS VETERINARIAE

diligēter, ne quid pabuli inter pedes animalium pereat. Bouile autē loco sicco statuendū est, assidueq; mundandū est, ita quod quoti die pabulū ad edendū inutile subternatur, ut boues siccus & mollius cubent. Parum quoq; fastidium est cum boues reuocantur ex opere, ut colla eorū ex uino tepido perfundantur, & diutissime perfricentur. Cum uero de uia uel pastu redeunt luculentia adhibita, priusquā deducantur ad bouile, aqua diluendi pedes, ne inherentes corpori sordes ulcera generēt, uel ungulas faciant molliores, uel certe molestiam manducantibus, uel inquietudinē afferant dormituris. Sed hyeme omni solertia frigus est prohibendum, uelut aestiuis mēsis pura aura querēda. Per diē igitur sub umbra, per noctē sub diuo boues stare conuenit. Nō enim pauciores si aestuauerint, quā si alserint colligūt morbos. Preterea unum ouum crudum cum hemina salis et sextariū uini per singula capita septimo diffundi per commodum est. Iuuat etiam si allium tunsum hircino misceas sepo, herbam quoq; uerbenam additam deteras, rutam herbam, etiam pollinem iniungas, & cum uino per os digeras. Cauendū præcipue est ne aut cursu nimio, aut longo itinere fatigentur, uel ullis grauioribus certe oneribus affligantur: nimium enim lassitudinem sequitur ægrotudo, & omne animal est debile si rumpitur. Aquam quidem istius generis animal non requirit nitidissimam, nec usq; adeo læserit si sordidam biberit. Sed tamen bubulci diligentius est procurare ut mundam semper & optimam bibant. Maxime autem studendū est ut competentibus redundantibusq; saturi semper habeantur et pingues. Omnis enim ægrotudo exordium suumit ex macie. Exhaustū animal celerius labor frangit, æstus uexat, frigus penetrat. Non solum enim aestiuis mensibus pascuum sufficit ubi frondes diuersi generis addantur, & minuat uarietas ipsa fastidium. Hyeme non tantum paleis, sed foeno quoq; et hordeo, & sepius eruo saginādi sunt boues. Nullus autem uberiores ciborum repudiabit expensas, qui considerare uoluerit bouum per inopiam pereuntium quā cariora sunt precia. Aduersum bouum morbos non minor adhibenda est diligentia quā equorum.

### De morbis bouum, & primo de malleo. Cap. II.

**N**Am equinū genus morbus q appellatur malleus, diuerso genere passionū emigrans per plures cōtagione cōsumit, boues quoq; idē morbus



bus interficit, sed à diuersis diuerso nomīe uocatur, quē plerūq; uulgus t̄ ap-  
 pellant. Hic morbus bouē si quando tentauerit, istis agnoscitur signis; erit pi-  
 lo horridus et tristis, stupentibus oculis, ceruice deiecta, saliuis assidue per os  
 fluentibus, incessus pigrior, spina rigidior, fastidium maximum, pauca r̄u-  
 minatio; cui si intermita subuenire tentaueris, discrimen euadet: si per negli-  
 gentiam adhibeatur tardior cura, uetustioris morbi non potest superari per-  
 nicies roborata. Inter exordia igitur tediātī boui aduersus oēs morbos potio  
 ista succurrerit: tres semis uncias squillæ minutatim concisas, preterea ra-  
 dices teneræ popinum effossas & diligenter lotas cōtondes in pila, & tria ex  
 hijs pondera addito sextario salis in uini septem sextarios mites, & per se-  
 ptem dies per os bobus singulos sextarios digeres. Quod si toto anno aduer-  
 sus oēs ægitudines desperatas boues stagnare uolueris, incipiente uere. i. ab  
 idibus februarij quindecim diebus continuis, hanc potionem dabis omni-  
 bus diebus, quæ usq; adeo salutaris est, ut approbatū sit integro anno boues  
 sic curatos nullius morbi cōtagione tentari. Talis etiā compositio & morbis  
 resistit, & uires animalū firmat; folij caprini, folij mirti syluestris, folij ci-  
 pressi aī uncias tres diligentissime deteres, infundes in congiū aquæ, & una  
 nocte sub diuo manere patieris, & inde unoquoq; boue tepesactō per triduū  
 singulos sextarios dabis: quæ potio ad stagnāda aīalia quater in anno facien-  
 da est ultimis tēporibus ueris, æstatis, autumnī, et hyemis. Morbos ægitudi-  
 nesq; depellit. tres uncias baccarū lauri, gentianæ, aristologie lōgæ, myrrhæ,  
 betonicæ diligentissime deterere et misce cū mero, ex quo trinas heminas triduo  
 iugiter iumētō p os dabis. Spicæ quoq; allij tritæ, cū uino quoq; per nares in-  
 fuse purgāt capita iumētōrū. oua cruda cū melle iumētōrū faucibus inferun-  
 tur, atq; ita fastidiū ac nausia discutitur. Expedit tamen salē pabulis misceri,  
 Marrubiū quoq; tritū mane cū oleo uinoq; diffundere, thuris puluerē cū me-  
 ro siue per nares inieceris, siue p os dederis prodest. Nec minores medicinæ  
 bobus horū copia subministrātur. Nam porros, rutā, apium, & herbā saui-  
 næ si quis large deterat, et misceat uino, ternasq; heminas præbeat ad potan-  
 dum ægrotantibus subuenit. Plurimiq; caulē uitis albæ cōcisam atq; serpillū  
 & squillæ partē in aqua macerāt, ternasq; heminas per triduū digerū, quæ  
 potio uentrem purgat, uires quoq; confirmat. Ad interna autem curanda  
 præcipue amurca creditur salutaris, si tantundē aquæ misceat, & animal



## ARTIS VETERINARIAE.

bibere consuescat. Sed quia licet sitiatur, potum fastidiat ignotum. Primo cibi asperguntur, deinde aqua exigua potio medicatur, ad ultimum pro mensura miscetur, & usque ad saturitatem sitientibus datur. Quocumque autem tempore, sed maxime aestate, si boues concitentur ad cursum, aut alius eorum ad perniciem soluitur, aut febriculæ commouentur. Natura enim pigrum, et labori potius quam uelocitati accommodum, uehementer laeditur si ad opus cogatur insuetum. Periculosum quoque est, si ad praesepia sues aut gallinae peruenerint. Nam bos cum gallinae fimum inter pabula sumpserit, statim nimio uentris dolore torquetur, inflatusque moritur; cui hac ratione succurri conuenit: Apii seminis uncias 3. cimini sextarium semis, et duas lib. mellis commisceas, et tepidum per os infundes, ac tam diu ambulare compellis, & confricas manibus plurimorum, donec uentrem potio moueat. Gisi quoque cum uino deterere, & per os dare creditur saluare remedium. Lixiuum quoque ex arbore ulmi, uel cuiuscunque generis ligni cinerem, dumodo bene coctum, cum oleo miscebis, & liquidum ac tepidum diffundere per fauces, aduersus stercus plurimum prodest. Si autem porcinum stercus bos deuorauerit, statim pestilentiam contagionis solius mallei sustinet morbi. Qui cum semel in gregem uel armentorum uel domitorum incesserit iumentorum, statim omnia animalia quae leuem suspicionem habuerunt, de possessione tollenda sunt, & distribuenda illis locis, ubi nullum pecus pascitur, ut nec sibi inuicem, nec alijs noceant. nam pascendo herbas inficiunt, bibendo fontes, stabulo praesepia: et quamuis sani boues, odore morbidorum afflante depereunt. Usque eo etiam mortua cadavera ultra fines uillae proijcienda sunt, & altissime obruenda sunt sub terris, ne forte ipsorum corporum interna sanorum contingantur & pereant. Vno quidem uocabulo pestilentia appellatur, sed habet plurimas species, quas enumerare non licet (uel riget): facilius ipsa principia à diligentibus intelligi possint. Est itaque humidus humor, quoties per os et nares humor effluit bobus, & fastidium aegritudoque consequitur. Est siccus quoties nullus humor apparet, sed animal quoti die macescit & fit deterius, nec iuxta consuetudinem appetit cibos. Est articularis quoties interdum de prioribus, interdum de posterioribus pedibus claudicant boues, cum habeant ungulas sanas. Est & subrenal is quotiens à posterioribus debilitas appareat, & quia lumbi dolere creduntur. Est sarciminosus quotiens per totum corpus bobus tubercula exeunt, aperiunt se, & quasi sanantur, & iterum in alijs locis exeunt. Est & sub-

tercutane



tercutaneus, quoties humor pessimus in diuersis partibus corporis bobus erumpit & decurrit. Est elephantiosis, quoties uelut scabies minutæ cicatrices excunt extra coriū, et ad similitudinē lēticulæ. Est mania quæ reſectis bobus eripit ſenſum, ut nec audiāt more ſolito, nec uideāt: ex qua paſſione celerime moriūtur, quāuis hilares pinguesq; uideātur. Hi oēs morbi cōtagiōe ſunt pleni, & ſi unū animal apprehēderint, celeriter ad oīa trāſeunt, & ſic interdū aut integris armētis, aut oībus domitis aſſerūt interitus. Vnde oī ſtudio quæ ſemel tentata fuerūt ſegregāda ſunt animalia, et ad ea loca mittēda, ubi nullū animal paſcatur, ne cōtagiōe ſua oībus periculū generet, et negligētiā domini (ſicut ſolet à ſtultis) diuinæ imputetur offenſæ. Euincēdi tamē ſunt, & exquisitis remedijs expellendi quāuis acerbīſſimi morbi. Panacem ſupplaffarijs comparas. Eryngion autem herba dicitur, quæ in littore naſcitur prope undā maris, florē habet quaſi aureū uel galbineū, ſolia eius ſunt quaſi ſolia cardui ſylueſtris, inter arenas littorum largiſſime ſpargitur, has effodis, & in umbra ſiccata ſeruabis, aduerſus morbū tam equorū quām bouum plurimū proſunt. Ex quibus potio cōponitur iſta: Radicis panacis, item q; radicis herbæ eryngij ternas uncias, ſeminis quoq; ſœni uncias 3. pariter deteres diligēter, addisq; farinæ triticeæ ſextariū, ita ut prius frumētū frāgas et molas: quæ oīa de calida ſeruēte cōſpergis, et cū melle uel ſapa noceas offas ſingulis diebus digeres. Præterea ſanguinem marinæ teſtudinis colliges, & cum uino per os dabis. Quam quia inuenire difficile eſt, uulgariū teſtudinū prodeſſe eſtimant. Quod utrū bene opinātur, uſus uiderit. Nā auctores de terreſtri teſtudine tractauerunt. Puluerē et caſſiæ fiſtulæ, nec non etiam thuris pro æqua parte admiſces, ex eo unā ſemis uncia cum ſextario uini ueteris in die per nares bouis infundis. Quod medicamentū per tridū facies. Morbi quoq; quos ſuperius noīauimus amari ſunt, & nō niſi amaris potionibus ſuperantur. Nā cōtraria cōtrarijs potionibus curātur ratione medicine. Ideoq; puluerē herbæ abſynthij et crudorū lupinorū, herbæ quoq; centaureæ uel peucedani æquis pōderibus diligēter miſces et in ſextario uini ueteris trina coclearia ſingulis diebus, additis uncijs 3. olei, per os dabis. Præſens quoq; remediū experimentauerunt: radiculā herbæ cōſiliginis (quā alij pulmonariā uocāt, alij tantūdem radiculā) ſiniſtra manu ante ortū ſolis collige (quia ſic maiorē uim habere creditur) tunc ad acum uel acutū cuprinum



## ARTIS VETERINARIAE.

ps auriculæ quæ lata est, quasi in circulo signatur, adprematq; ut rupta cute leuiter sanguis exeat. Quod cum ex utraq; parte feceris, medium orbiculū perforas ad acum, & in eodem foramine inseres: quod ubi exierit, omnis pestilentie uirus per ipsum defluit uulnus, donec ille solus locus, qui designatus est, putrescat & decidat, atq; ita animal liberetur. Vsci folia cū uino trita defunduntur in nares, atq; ita singulis bobus, siue uniuerfis gregibus cum morbum incurrerint subuenitur. Suffimenta quoq; plurimū iuuant, sulphur, bitumen, allium, origanum, semen coriandri, carbonibus insperge, & cooperta boum supra uas, in quo suffimenta incēderis, diutissime continebis, ut fumus os eorum capiat, ac nares impleat, atq; ita ad cerebrum & interna salutari remedio penetret. Sed & totū suffimentare percomodū est, ut ab eodē morbo pricipes expellatur, et cætera pestilentie cōtagio nō coinqnet. Generalia igitur remedia aduersus morbos generales contagiososq; retulimus, nunc aduersus ualitudines, q̄ singlis aīalibus accidūt, nec in alia trāseūt, remedia subiūgem⁹

### De cruditate.

### Caput .III.

**C**Ruditas plurimum nocet, cuius hæc sunt signa; crebri ructus, cibi fastidiū, sonitus uentris, intensiōes neruorū, oculi hebetes: propter quæ nec bos ruminat, neq; linguā detergit ut solet. Prodest itaq; ut duos cōgios ubi bibi possit digerere per fauces Post quos statim brassicas triginta caules modicas decoques, & ex aceto dabis, suspēsūq; aīal ab alio cibo penitus abstinebis. Alij cruditate laborantes, clausos in bouili detinēt, nec cibos præbent. Præterea lentisci et oleastri cacuminū pondera 4. deterūt, et cū lib. mellis atq; aquæ congio miscēt, quæ una nocte sub diuo mittūt, atq; ita faucibus digerūt. Deinde interposita hora, macerata infusaq; crui 4 lib. obijciūt, ab alio quoq; cibo uel potione prohibētur. Nā si neglecta fuerit cruditas, uentris inflatio intestinorūq; subsequitur, exprimit gemitus, cibosq; capere nō sinīt, nec in loco consistere, decūbere & uolutare cogit, caudamq; frequēter cōmouet. De exprimēto medicina est caudā iuxta clunes resticula uel lino uehementer astringi, uiniq; sextariū cū hemina olei tepidū dare p fauces, atq; ita p mille quingēto s passus bouē currentē trahere: si dolor permāserit, ungulas eius secare, et unctā manu p anū finū extrahere, & rursus agere currentē. Si tardius proficit, tres partes lauri diu cōteruntur, et cū duplici aquæ calidæ dantur. Si ista nō ualent, mirte foliorū syluestris duæ lib. iundūtur in pila, &



Et ex calida aqua miscentur, ac per uas ligneū faucibus infunduntur. Atque ita sub cauda quatuor digitis ab ano percussa uena sanguis emutatur. Qui cum satis effluxerit papyro ligata cauda restringitur. Post concitatus bos agitur usque dum anhelet. Ante detractionem tamen sanguinis adhibentur ista remedia: tribus heminis uini, quatuor unciae contriti olei permiscetur, postque potionem cogitur currere; duae quoque unciae salis cum decem uncijis ceparum alteruntur: mel quoque decoctum admiscetur, ex quo facta collyria longiora non parum ualida immittunt in anum, ut uentrem resoluant: atque ita bos currere cogitur. Ventris quoque et intestinorum dolor sedatur, si anseres natantes, et maxime anates animal aspexerit. Nam anas mulos, etiam equinum genus conspectu sui celeriter sanat. Sed interdum in illa medicina conuenit sequiturque omnium uitium, quorum signum est si ex uentum et mutosumque uentrem ediderit, singulare remedium est cupressinae quindecim, uerbinae quindecim galle diligentissime tritae quantum utraque ponderatur tanti ponderis uetustissimus caseus, quibus pariter detritis admiscetur uini austeri sextarij 4. et in potu dantur, ita ut lentisco mixtaque oleastri cacumina praebeantur. Si uenter coeperit fluere, et uideris egere corpus et uires capite plerumque inutile reddit, quia ex cibarijs ad mede-  
lam bouis nil peruenit, quod sic uideris per uentrem projicit quam quod madu-  
cauerit. Quae cum acciderint prima die a cibo et potu abstinendum est, ita quod nec  
secunda die bibere permittatur, cacumina tamen oleastri et cannae sylvestris,  
itemque baccae lentisci et myrti dandae sunt, nec post triduum etiam potestas bibendi  
nisi per parum concedenda est. Sunt qui ex folijs lauriteneris librā 1. abrotani  
num hortense pari portione detritum cum aquae calide 2. sextarijs, atque ita fauci-  
bus infundunt, pabulaque superius praebent. Aliqui uero 2. lib. ex uinaceis ad focum  
torrent et coterunt, et cum sextario uini austeris ad bibendum dant, et cum merata sae-  
pius cacumina obijciunt. Quod si neque proluues uentris erit neque intestinorum dolor  
recusat tamen cibos et praegravato capite erit: lachrymae quoque oculis et pitui-  
ta naribus currit, usque ad ossa frons media uratur, auresque ferro discindantur,  
sed uisus igne factus ut sanescant ueteri urina bouis ipsius confricanda sunt.  
Aures uero scisse picula oleoque curantur. Periculosum fastidium bobus ranulae  
faciunt, quae aperienda sunt et allio cum sale pariter trito ipsa uulnera confricanda,  
ut omnis humor exeat prouocatus. Melius creditur si ad acutam cannam execes  
ranulam, post uino os lauatur. Interposito unius horae spatii uirides herbae  
uel frons



## ARTIS VETERINARIAE

uel frondes dantur. Tam diu aut sustentantur mollibus cibis, donec facta vulnera cicatrices ducant. Si neq; ranula fuerit, & non appetent cibum, allium tritum cum oleo naribus infundes.

### De Febre.

### Caput .IIII.

**B**os si febrile coeperit (quod ex uenarum inquietudine, & calore totius corporis uel oris intelliges) una die à cibo est penitus abstinendus, ita ut postero ieiunio eidem sub cauda exiguum sanguinem detrahas, atq; interposita hora trigesima paruos aculeos decoques, et ex oleo ac liquamine per os digeres, eamq; escā per dies quinq; ieiunio dabis. Præterea cacumina lentiū, uel oliuarum, uel tenerimum quenq; frondem, ac pampinos, si eodem tempore sunt, præbebis in cibo. Labia quoq; eius deterges ad spongiam, & aquam frigidam ter in die offeres ad bibendū, ita ut infra tectum bos febriens teneatur, nec antequam sanatus est dimittatur in pastu. Febrientis autem ista sunt signa; lachrymæ profluunt, grauatur caput, oculi semiclausi sunt, labra salinis madida, longior & cum quodam impedimento tractus spiritus, frequenter et gemitus. Tussis bouum non minus diligenter sananda est quàm equorū: si recens fuerit, sextarius farinæ hordeaceæ cum uno ouo crudo & hemina passi per os datur ieiunio: gramen quoq; concisum tunsūq; admixta farina fabæ frixæ & pollinis lentis, sextario aquæ calidæ miscetur, agitataq; diligenter per os diffunditur. Veterem tussim sanāt duæ libræ hyssopi maceratæ ex aquæ sextarijs tribus, quod infusum teritur, & cum duabus partibus farinæ miscetur, & per os datur, super quod aqua hyssopi, in aqua decoctum infusum decoctumq; etiam propinatur ad cornu. Porri etiā succus expressus cū oleo & ipsi febri cum hordeacea farina remedium præstant. Radices quoq; eius diligenter lotæ, & cum farre triticeo contusæ, ieiunioq; datæ, discutiunt uetustissimam tussim. Idem præstat eruum si in pabulis cū ptisana hordei molitum, & cum aqua tepida uel mulsa in fauces saliuanti ore dimissum. Suppuratio, quam apostema dicūt, melius ferro aperitur, post cū expressum pus aut sanies fuerit, sinus ipse, qui eā continebat, urina bubulina calida lauatur, ac linamentis ac stuppis siue linteolis pice liquida et oleo infusis curatur. Quod si colligari ea pars, ubi est ulcus, non potest, lana candente sepum caprinum aut bubulinum stillatur. Aliquāti, cū uitiosam partem inunxerint, tunc urina ueteri humana lauant, atq; ita æquis ponderibus pice liquida cum ueteri

axungia



axungia incoquunt & liniunt. Sanguis cum ex aliqua necessitate ad pedes uenerit boum, claudicationē affert. Quod cum accidit, inspicio ungulā, inuenies eam ultra solitū calere, & uitiatā partem premi uehementer bos non patitur. Sed si sanguis adhuc super ungulas in cruribus est, ad tridū triti salis perfricatione discutitur. Quod si tantū in ungues descēderit, cultello leniter inter duas ungues aperies, & mundabis deintus, et postea stuppam sale atq; aceto infusam applicabis ad solū, sparta opere calceatur, maxime quæ datur operantibus, & in aquam non mittat pedem, sed ubi siccum est ambulat. Qui sanguis nisi emissus fuerit saniem creabit. Quo suppuratio etiam curabitur. Nam primo ferro circuncisus expurgatur ad uiuum. Deinde panis aceto & oleo & sale madefactis impletur, mox axungia ueteri & sepo hircino pari pondere ferro candenti stillantibus curatur, & perducitur ad sanitatem. Si sanguis in interiori parte ungulæ est, nec aperturam facit, & tantū claudicat animal, extrema ipsius ungulæ ad uiuum resecantur, & ita remittitur, ac stuppa uel linteolis cum sale et oleo & aceto infusis pes inuolutus sparta munitur. Mediam uero ungulā ab inferiori parte non expedit aperiri, nisi eo loco in quo suppuratio facta est. Si claudicat ex dolore neruorū, oleo & sale genua poplitesq; & crura confricanda sunt calido aceto, & lini semen aut milium detritū infusumq; aqua mulsa imponendum est, & spongia quoq; feruenti aqua infusa & expressa, conspersaque postmodum melle, genibus circundatur ac fasciis alligatur. Quod si humor est cum tumore, fermentū uel farina hordeacea ex passo aut aqua mulsa incocta imponitur, & cum maturauerit suppuratio, scinditur ferro, emissaq; sanie (ut supra docuimus) percuratur. Potest etiā radix lilij uel squilla cum sale, uel herba sanguinalis (quam palaganon Greci appellant) uel marrubium ferro aperta sanare. Omnis autem corporis dolor, si sine uulnere est, recens fomentis mellinis discutitur. Vetus autem uritur, Et supra uulnus uel butyrū uel caprina instillatur axungia. Scabie sanatis trita oleo defricata: Eodemq; remedio rabiosi canis sanatur morbus uel lupini uulnus illatum. Vetus quoq; salsamentum utranq; perhibetur plagam curare. Ad scabiem quoq; presentior medicina ista est: si cumulat bubulam sulphurq; conteritur, admixtaq; myrrha cum oleo atq; aceto decoquitur, & cum tepescere coeperit, alumen scissum tritum inspergitur: quod medicamentum candentis olei illinitum prodest.



## ARTIS VETERINARIAE

Ulceribus gallarū tritarum puluis inspergitur. Succus quoq; marrubij im-  
 positus cum fuligine sanat. In ista pestis est bubulum pecori (quā \*maginiū  
 rustici uocant) cum pellis ita dorso hæret, ut apprehensa manibus deduci nō  
 possit à costis: quæ res non aliter accidit quàm si bos ex languore aliquo ad  
 maciem deductus est, aut sudans in corpore faciente refriguit, aut si lapsus  
 sub onere uehementer est infusus in pluuia: quæ quandoq; pernitiōsa sunt:  
 custodire debemus, ut cum ab opere redierint boues adhuc estuantes anhelan-  
 tesq; uino aspergantur, & ossula panis uino infusa faucibus eorum infera-  
 tur. Quod si prædictum uitium inhæserit, expedit decoquere laurū, et cum  
 calida & oleo & uino spinam dorsumq; animalis confricare contra pilum,  
 ac per omnes partes apprehendere pellē, & uelut à costis separare. Quod  
 aut in loco calidissimo faciendum est, aut sub diuo sole feruente. Aliquantifec-  
 ces uini & axungie cōmifcent, eoq; medicamento tepido post fomentū præ-  
 dictum utuntur. Et cum grauis pernicies, ut cum pulmones exulcerantur,  
 unde tussis & macies, ad ultimū uero phtisis inuadit, quæ mortem afferant,  
 radix consiliginis, succus porri, omniū hemina per mensuram olei miscetur,  
 & bibendi sunt cum uini sextario per dies plurimos. Nonnunquā & tumor  
 palati ciborū fastidium facit, crebrumq; suspirium. Prodest palatum ferro  
 aperire ut profluat sanguis, cui eruum sine corio maceratum ad manducan-  
 dum dabis, uiridemq; frondem uel quodlibet aliud molle pabulum dum sane-  
 tur. Si in operibus contuderit collum, præstantissimū remedium est, sanguis  
 ab aure emissus. At si id totū in tempore quæ uocatur † amati amaticum sale-  
 tantum & imposito. Si ceruix mota & deiecta est, considerabimus in quā  
 declinet, et ex diuersa parte sanguinē deirahimus, ex ea uena quæ in aure ui-  
 detur amplissima, quæ sarcocata prius uerberanda est, & cum intumuerit  
 ferro aperiatur, effusoq; sanguine postero die ex eo loco emittitur cruor, et bi-  
 duo uacatio operis datur. Tertio uero die leuis iniungitur labor, & paula-  
 tim ad operis consuetudinem reuocatur. Quod si ceruix in neutrā partem  
 deiecta est, mediaq; intumuit, ex utraq; auricula sanguis emittitur. Qui si  
 inter triduum q; bos uitium cœperit emissus non est, intumescit collū, neruiq;  
 tenduntur, & uana duricies iugum non patitur. Tali uitio comperimus  
 aptum esse medicamentū, ex pice liquida et bubula medulla, hircino sepo, et  
 axungia ueteri, oleo quoq; ueteri æquis ponderibus impositum cōcoquitur,

quo



quo utendū est cū bos ab opere disiungitur. et in piscina in quolibet tumore  
 ceruix lauatur, cōfricaturq; diligēter prædicto medicamento, deterfaq; dilu-  
 tur. Si ex toto propter tumore ceruicis iugum recusat, paucis diebus requies  
 ab opere danda est, et ceruix cū aqua frigida lauāda, et spuma argēti linien-  
 da est. Celsus quidē iumentī ceruici herbā quæ uocatur ama (ut supra dixi)  
 cōtundi et imponi iubet. Quæ ceruicē infestāt minor est cura. Nā facile sanā-  
 tur per ardētē lucernā oleo instillato. Melius tamē est custodire ne nascatur  
 uenæ. Etiā colla caluescunt, quæ nō aliter glabra fiunt nisi cū sudore aut plu-  
 uia ceruix madefacta est in opere. Quod si acciderit, puluere lateritio trito  
 priusquā deiungatur, bouis colla cōspergi oportet. Et cū exiccati fuerint, ex  
 inde oleo iterū infundi. Si talū uel ungulā uomer læserit, picem durā et axun-  
 giam cū sulphure et lana succida inuoluito, et candēte ferro supra uulnus im-  
 ponito, et ungito: quod remediū optimū facit, si clauū calcauerit, aut acuta  
 testa uel lapide ungula pertūdatur: quæ tamē si altius uulnerata est, latius ferro  
 circūciditur, ita inuritur ut supra præcepi. Deinde ex parte calceata p-  
 triduū aceto suffuso curatur. Qd si uomer intrauerit, lactuca marina, quam  
 Græci cyniolā uocāt, admixto sale imponitur. Subtriti etiā pedes eluūtur ca-  
 lefacta bubulina urina. Deinde fauilla sarmentorū seruēte calcare cōpellitur,  
 et pice liqda cū oleo uel axungia cornua eius ungūtur. Minus tamē claud-  
 cant si ab opere disunctis frigida pedes lauentur, et suffragines coronæq; de  
 scissura ipsius ungulæ, ueteri axungia defricētur. Frequēter etiā uel ab aspe-  
 ritate itineris, uel in proscindēdo duritiā soli, aut obuijs radicibus obuolut-  
 tus cōuellit armos: Quod cū acciderit, ex prioribus cruribus sanguis emitti-  
 tur, si dextrā ex sinistro. Et si uehemētius utranq; uitiauerit, etiā in ante-  
 rioribus cruribus uenæ soluūtur. Perfractis uero cornibus, linteola, sale, atq;  
 aceto & oleo imbuta ponuntur, superligatisq; per triduū eadem infundun-  
 tur. Quarta die tantum axungia cum pice arida & cortice pini pari pon-  
 dere imponitur, & ad ultimum cum iam cicatricem produciunt, subito in-  
 fricatur. Solent autem neglecta ulcera uermes creare, quæ si mane ex aqua  
 frigida perfundantur, rigore eius cōtracti, decidūt; Vel si hæc ratio nihil pro-  
 fecerit, marrubium aut porrum conteritur, admixto sale in. ponitur, uel calcis  
 uiuæ puluis inspergitur, aut cucurbitæ uiridis succus cū aceto mittitur. Ideoq;  
 uniuersis ulceribus picem liquidam, oleum uetus & axungiam oportet adhi-



## ARTIS VETERINARIAE

beri, & extra uulnera etiam eodem medicamento circumliniri, ne infestentur à muscis, uel uermes creent cū uulneribus inciderint. Serpentis quoq; ictus mortiferus est bobus, sed & minorum animalium noxium uirus. Nā uipera & celicia cum in pascuis bos improuide supercumbit, stimulo morsus imprimunt. Araneus quoq;, quem Græci migalam appellant, parui quidem corporis, non paruum solet inferre perniciem. Verum uiperæ uenenu depellit, supra tumorem, qui inflatur ex ictu, scarificatio ferro facta, ita ut herba quā personatiam uocant, imponatur trita cum sale. Creditur radix si contusa conatur, uel siler montanum reperiatur, & trifolium simoniamū, quod fragosis locis efficacissimū nascitur, odoris grauis, bitumini similis, propter qd à Græcis asphalton appellatur, nostri autem propter figuram acutum trifolium uocant, nam longis & hirsutis folijs uiret, caulemq; robustiorem facit quā pratense: huius herbe succus cum uino faucibus infundatur, atq; ipsa folia cū sale trita imponantur in plagam. Quod si uiridem minime reperiunt, semina eius collecta & trita dantur ad potandum cum uino. Radices quoq; eius cū succo caulis trite, addita hordeacea farina & sale, cū aqua mulsa scarificationi superponuntur. Est etiam presens remedium si fraxini cacumina tenera contras cum sextarijs uini quatuor uel olei, expressumq; succum faucibus infundas. Itemq; cacumina eiusdem arboris cum sale trita lesis naribus superponas. Celiciæ enim morsus tumorem, suppuratumq; generat. Idemq; facit muris aranei. Sed celiciæ morsus sanatur, si acu area locum lēsum compungas, et creta cimolca ex aceto oblinis: Muris uero pernicies, si animal ipsum oleo mersum neces, & plagam dentiū ex eodē confrices. Quod si nō fuerit, contritum ciminum cū picula & axungia, ut similitudinē malagmæ habeat, impositū plage, perniciem submouet. Quod si antequā tumor discutiatur suppurationis fuerit generata, optimū est ignea lamina uel canterio collectionē apire, quicquid uitiosum est inurere, atq; ita cū liquida pice & oleo inlinere. Quidā uinum murem arancū creta figulari circundant, & colla boum suspendunt, morsusq; ipsius bestię submouent. Oculorum uitia plurima in illis sanantur. Nam siue intumuerunt aqua mulsa triticea farina cōspargitur & imponitur, siue album in oculo est salis fossilis Hispani uel armeniaci, uel cū melle pexmixti uitia extenuant. Idem præstat trite sepiæ testa, & per fistulam oculo ter in die insufflata. Prodest etiam radix, quā Græci silpion uocant, nostri

autem



autem laserpitium, huiusmodi quantum uolueris ponderis cū decima parte salis armeniaci & cū fistula oculo insufflas. Quæ radix trunsa et cū oleo lentis-  
tisci mixta uitiū expurgat. Si genæ humorē profundūt, lachrymisq; uisus cō-  
funditur (quam epiphorā uocant) polenta ex hordeo mulse aque cōpersa  
super genas superciliaq; imposita reprimat humorē. Pastinaca quoq; agre-  
stis, quā armoneaceā uocant, cū melle trita oculorū sedat dolorē. Memineris  
uero quoties mel aliōsue succos remedio adhibes, ut prius pice liquida cum  
oleo circūlinias oculos, ne à muscis apibúsue uel uespis in-  
stetur, quas dul-  
cedo mellis inuitat. Plurimūq; hirudo, id est, sanguisuga, cū fors iuxta fau-  
ces hæret, sanguinē trahit, eam à iumento digitis oportet auferri: sed si in-  
terius sit, ut manu detrahi nō possit, cannā uel fistulā perforatā inserito fauci-  
bus, ac per eam calidū oleū infundes. Nam eo cōtactu bestiolæ inportunitas  
recedit. Odor quoq; cimini super carbones impositi ubi sanguisugam afflaue-  
rit, euellet à uulnere. Quod si stomachū uel intestinū tenuerit, calido aceto p  
cornu infuso necatur. Machina quoq; describēda est fabrica, qua cōclusa  
cuiusuis generis iumenta bouesq; curātur, ut et tutus ad pecudē medendū ac-  
cessus sit, nec luctando quadrupes aut mēbra cōuxet, ac sic remedia despuet.  
Roboreas asses cōstringis, solū, quod in longitudine nouē pedes debet habe-  
re, in altitudinē pars posterior duos simipedē: Pars uero quæ ad priora ani-  
malū pertinet quatuor pedes: textūtur ita ut uelū in caudā ductū non possit  
exire. Sed à parte posteriori paululū latiorē, à priore strictiorē machinā cō-  
pingi oportet. Cui trāsuersum trigillū ad modū iugi confirmandū est, ad qđ  
equorū capita uel bouum cornua religātur. Nam reliquū corpus ad temones  
socios uel funibus alligetur, ut iuuamentū præstetur ad medentis arbitrium.  
Quæ machina ad omnium maiorū animalū medelā solet esse cōmunis.

Ab initio huius tertij libri usq; huc, nō habentur in uetustiore codice, et  
totū censetur una rubrica (ut ait) quatuor capitum: & propterea subsequens  
reputabitur caput secundum.

### Si uermes animal fecerit. Caput .II.

**S**I uulnus in dorso, aut quacūq; parte corporis cœperit habere uermes,  
& timetur ne putredo uulneris transeat in cancrum, nepitā & cedrinā

L 3

siue cimi



## ARTIS VETERINARIAE

siue ciminū ul' cicutā cōteres ex aceto, & imponis. Calcē quoq; uiuā ex aceto acerrimo temperatā necare uermes experimenta docuerunt. Si uermiculus dorso putredinem fecerit, utilissimum est cauterizare subtiliter, postea uiscū cū melle & uino cōterere & imponere. Pannos quoq; minutos cū oleo & aceto uulnera purgare manifestum est. Quo factō si necessitas fuerit, ustio rursus adhibetur. Ad ultimum cornu caprinum combustum & contritū uaret, ulceribus superinspergitur, ut recuperetur & sanitas ei detur.

### De cura lumborum. Caput .III.

**L**umborum quoque cura uicina est. Nam animalia aut cum nimio potere, aut cum transcendere fossam conātur, si posteriores resederint pedes, aut nimio frigoris dolore renū cōtrahūtur. Ideoq; aqua calida cū flore foeni diutissime confouendi sunt lumbi. Inunctionibus etiā calidissimis perfricādi, et ad ultimū afro nitro diluti, inducto caustico corroborandi. Qd si dolor uehementior fuerit, de inguibus soluendae sunt uenae, & oleum cum axungia sanguini qui profluit immixta, renibus inlinuntur. Et si necessitas fuerit, cataplasmis utendum est. Potio quoque renibus subuenit, si pillulas cypressi incidis duodecim supra carbones, nitri quoq; uncias tres assi, et utraq; in puluerem redigas, cum uncijs tribus mellis, & uini ueteris sextarijs tribus, & olei boni tribus uncijs, quod per quatriiduum æqua parte faucibus digeras. Vitio lumborum medetur hemina seminis brassicae cum sextario polentae attusa ex aqua frigida subacta atque imposita dolentibus locis. Si sembrum quoque cum polentae sextario & aqua subactum medetur. Efficacius tamen est si cypressi folia ad modum heminae diligentissime contundas et polentae sextarium admisceas, acriq; aceto subactis dolenti imponas. Praeterea resinae durae uncias sex decoquas ut lique scat, cui feruēti superaspergis hordeaceam farinā quā diu inspissetur ad similitudinem pulmenti, & diu subactis, & calidum ita ut manus pati possit, super illinis renibus. Quod si frequenter renouaueris, & dolori subuenit & tumori. Si uero tanta indignatio fuerit, ut eiusmodi non sentiat curas, aut cauterio cuprino locis opportunitis urendo deprimes puncta ne deformetur animal. Taut si uilius est, aut necessitati aptum, quos decori gratia lares, sicut moris est, uteris.

**R** Quibus signis renū dolor indicetur. Ca. II II.

Enum autem dolor his agnoscitur signis: Posteriores ungulas trahit, lumbos



hit, lumbi uacillabunt, cauda deiecta erit, & foetulenter mingit, ilia dura atque contracta. Interdum tales sunt renes, ut sanguinem mingant, et si nimium effuderit incurabilis est passio. Si parum cruoris abundauerit, scito posse curari. Cui post detractum sanguinem uel de matrice, uel de femoribus, hanc potionem dabis, uidelicet porri sectiui succum ex aqua.

De internis musculis. Caput .V.

**S**aepe musculi, qui in renibus sunt, uexantur ex casu, & exteriores facilius curantur, si iustae medelae afferunt tarditatem. Optimum est quoties ceciderit iumentum loco non moueri, & aqua frigida perfundi, & postmodum unguentis uti. Quae passio ista consuevit ferre indicia: renes obdurescunt, contrahuntur testes, coxaeque trahit, & colligere se non poterit. Quae ualitudo nascitur ex itineris longi fatigatione, aut ab infractu cliuosarum uiarum. Incitatio quoque cursus, & saltus extensio hanc adferunt causam. Sanguinem igitur ex uisceribus oportet emitti, pro ut qualitas corporis patietur. Utendum est potionibus etiam ad ualitudinem necessarijs, molli dormitione animal collocandum.

Si talus exeat animali. Caput .VI.

**E**x perfrictione nonnunquam animalibus exit foras talus, qui hac ratione curatur: Scalpello scarificabis, praecipue loca quae uidentur eminentiora, similiisque uesiculis, scarificatio digitis exprimitur et decarnatur, puluere salis perfricatur, donec cum sanguine actus humor exiccetur. Post calida & sale fouebis, & deprimendo intus remittis, & continuo reuertetur ad locum unde exierat. Altera intus digitis missis inlita lypparia uel meliloto, donec sanetur. Quod uitium si ferro tangere dubitas, hoc medicamento curabis quotidie: Castorei uncias tres, salis triti pondera duo, salis armeniacy lib. una, sinapis pontici uncias 6. omnia trunsa et cribrata pariter decoques, impones talo, & alligabis quotidie, aut lixiuio calido fouebis, et medela continua usque ad sanitatem. Potionibus aut thermanticis calefiet agrotum. Alij in hac passione cum axungia ad manus talos fulciri & reponi oportere dixerunt, postea spongia apponi caudam supra alligando. Si tamen diebus aliquot fuerit cura neglecta, prius foueri ad sex ex lixiuio, uel sale & urina calenti, & sic reliqua curationibus impleri.

De dolore



## ARTIS VETERINARIAE.

### De dolore renum, Caput .VII.

**D**olor renum animalibus sæpe contingit, his proditur signis: nec incedere poterit, nec cubare, ilia eius inflantur et obdurescunt. quorum ista curatio est. Sanguis de utrisq; femoribus emittitur, postea lotiū uetus & putridū in uase supponitur, & lapides molares feruētes mittūtur, animal sagis diligentissime usq; ad ungulas operiatur, ut uapore lotij uenæ testium sudent, post aqua calida confuentur, nitrum & alumen scissum pariter conteres diligenter, & admixto oleo testes perunges fricando. Si molares huiusmodi rei proditur † ma lentis heminā unā decoquis, admixto uino mortario teres, cypressi folia 3 4. mollissime pariter trita commiscis, tantundē etiā suille adipis adiunges, uinumq; uetus desuper sparges, panno inlinitū testibus apponas, donec sanitas procuretur. Si tardius dabitur sanitas, testes subterstilatis cauterijs urito, uel leuiter scarificato.

### De tumore testium. Caput .VIII.

**H**ordeum cōburito, pulueresq; ex eo trito suille adipi misceto, ex quo medicamento mane et uespere testes illinito. Physicum aut creditur, testes animalium ablutos canino felle sanari. Alij authores aqua calida testes cum dolent fouendos esse duxerunt, suffumigandos etiam uiridibus folijs, cypressiq; arboris specialiter mederi testibus creditur. Sed si defuerit testes ardentes nihilominus in aqua calida mitti, & inde suffumigari, post creatas cimolias cū stercore bubulino ex aceto acerrimo calentes induci, & quotidie reuocari, quousq; sanitas subsequatur.

### Si natura reuocari non possit. Caput .IX.

**S**i natura iumento excedit, & reuocari non possit, in aqua frigidissima constituendum est, & ibi fouendum, & sublitam manum in anum eius iniicies, & contra uesicam fricabis, post diligenter cooperies ne perfriget. Potiones dabis, stercus suillum quotidie ex uino, aut in aqua dulci, donec liberetur.

### Si iumentum sanguinem minxerit. Ca. X.

**S**i iumentum sanguinem minxerit, uel adsellatum fuerit, hac ratione curabitur: De superiori uena sanguis auferatur, aphodilli quoq; herba radix teritur



dix teritur, & cum uini albi dulcis duabus cotylis per os infunditur, quæ glutinosa uideatur. Prodest etiam farinam triticeam cum adipe suilla et puluere corticis mali granati decoquere, & non crassas portiones, sed liquidas per os fundere, et non solum à cursibus, sed etiam ab ambulatione abstinendum est, ut glutinetur uena quæ interrupta est. Contingit enim cursu uel saltu, ut intrinsecæ uenæ rumpantur, quapropter rebus stipticis, & his quæ cōsolidationem faciunt curentur. Super renes hoc anacollima oportet imponi; bulbos nascendeas uiuas contusas, allia quinque, anagallici libram, quæ omnia pariter bene trita commiscis, et renibus eius imponis. Qd̄ prodest etiam illis, quibus euulsi uel emoti sunt renes. His autem quibus per nares effluit sanguis, pusca frigidissima caput eius fouebis, modicum salis adijcies, post anacollima in capite & in temporibus oblinis, & in medicamento constrictis uenis fluxum sanguinis reprimis.

## De dysenteria.

## Caput .XI

**S**I dysenteria iumentum apprehenderit, reuersatur eius extalis, quæ ueturetur circunsecanda est cautissime, ne intestinū, quod præpositū est extali, frangatur. Procidit intestinū à cōtactu, uitæ periculū facit si tangatur: quod semel nō redit, & sic remanebit, & paululū exit extalis supra.

## Si otiosum animal sanguinem mingat. Cap. XII.

**A**Nimalibus otiosis & pigris contingit expletura sanguinem mingere, cum hoc quod abundat, erumpendi per urinā inuenit uiam: attenuati & exhausti animalis interdū est in terra sanguinea. Quod accidit, aut ex nimio ascensu, aut labore ponderis, aut nimietate cursus sodalis. Qui ex delitijs aut abundantia contraxerit passionem, de matrice auferunt sanguinem: attenuatis uenas laxare cōtrarium. Vtrisque tamen salutaris est potio, si lac caprinū cum à matricibus obolis, & uitiolaris herbe succo pastillos facias, ex quibus unum per os frequenter infundas. Certissima quoque ad ipsorum salutem potio prædicatur, si draganti unciam semis, mespili 3. steracis 3. tres, nucleos pini, hos purgatos ducentos decē infundis in uino optimo, ac diutissime, post ad magnitudinem nucis auellane cum apibus attritos et uini sextario resolutos dabis ad cornū, & faucibus digeres per dies continuos septem, quod etiā omnibus prodest cum fabæ magnitudine cum ouo dedisse.

M

Si animal



## ARTIS VETERINARIAE

### Si animal sanguinem uomat. Caput .XIII.

**S**i uero sanguinem uomat, oportet genesta succum cum uino atq; porri succo lixiuo oleoq; permixto faucibus infundere. Aliquando animalia sanguinē uomūt, qbus hac potiōe succurritur: absynthiū pōticū et spicā nardi equis pōderibus in cacabo nouo cū aqua decoques, et dabis in potu.

### Si percussa uena claudi non possit. Cap. XIII.

**S**i sanguis interdum nimis per uenam cum percussa fuerit ut claudi nō possit erūpat, remediū est, stercus ipsius animalis supponere fluentibus uenis; Aut si perseuerauerit, urere cauterio subtiliter ne nerui ledātur. floccum etiam competenti oleo tinctum uenae admovento: etiam assem lineum in uena qua sanguis profluit, pōnis, et ligas, præsens est remedium.

### De indignatione uesicæ. Caput .XV.

**V**esicæ indignatio generatur ex plurimis causis. Quapropter urinae difficultatē, immo præsens discrimē inportat. De qua ualitudine diligēter tractari cōuenit, ut passioni competens medela succurrat: quæ his agnoscitur signis, mingere nō poterit, omnia crura flectētur, dimittitur uenter ad terram. Et si difficulter mingit dysuria appellatur. Sed quando guttas per ueretrū mittit cū labore, strāguria dicitur. Quū in totū non potest mingere dysuria appellatur, et uicinus est morti. Propter quod extēSIONES et tubercula nascūtur in dorso, et præfocatio circa fauces ex dolore uentris. Cui hac ratione succurris: de pectore uenas pungis, et sanguinē quantum uidebitur detrahis, et sic accipitur lauamentū. Præterea manū tepidam cū oleo in anū mittis, et si qua stercora iueneris intus, quia impedimentū præstant, attrahis. Post cū libra olei, salis triti plenū acetabulū misces, et calefactum inijcies in anū, iumēto in locis pronis posito, ut facilius ad interiora descendat, dulcedo enim sequitur ac solutio uētris, et dolor mitigatur. Quæ remedia si tarde subuenerint, manus et brachia perungito, et cū magno sensu atq; cautela manus inijcito, et in partē dextrā et in partē sinistrā, et sic manū plenā leuiter præmito, ut incipias in hac procedere, et sic liberabitur. Valde spina est cōtrariū. Ex his causis passio ita descēdit, si iumentū in ope aut cursu magna pte duci cogatur, et urinae facili spaciū denegatur, et a uesicæ meatu usq; ad



usq; ad ueretrū nascitur tumor, & cū dolore egestionis foramē angustatur. E diuerso, si iumentū exerceri solitū, diebus plurimis steterit, indigestione nascuntur spurciæ, & humores efferūtur usq; ad uesicā, cōpunctiones etiā et morsus urinali fistulæ præstant, ex quo stranguria plerūq; cōtingit. Ex perfrictione & indignatione dysuria solet uenire, cum nimio rigore meatus intumuerit. Et ideo calefactionibus diuersis à frigore soluenda est iniuria celeriter. Interdum & indigestione hordei, & cum aquam frigidā auidissime biberint, dolores ueneris animalia patiūtur, & propter uicinitatē commota uesica stranguriam sustinent. Aliquando & stercus pullinū, & alia noxia in cibo sump̃ta, cum inflationem fecerint, impediunt minctionem. Bestiolæ etiam quæ appellātur ualpestres, araniæ similes, cum deuoratae fuerint animal præfocant. Aqua quoq; cœno uel limo turbida si bibatur, meatus impedit minctionis. Vermes quoq; uel lumbrici in intestinis cum ex ulcere uenerūt, uescas ledunt, & dupliciter animalibus discrimen important. Quod his deprehenditur signis: animal quod tardius mingit latera sibi scalp̃it uel terrā mordet, scias eum uermibus uel lūbricis extorqueri. Cui hac ratione succurris: brassicæ folia subtilissime cōtundis & cōmiscis boni uini cotylas quatuor, et per sinistrā narem infundis: laser quoq; syriacū & nitri puluerem cum uino decoquis et per os digeris, In ambulationibus et leni cursu exercebis in loco molli uel herbido, uel ad aquam leuiter abeuntē ad urinam inuitabis. Si ubi aliquod aliud animal minxerit, teneatur, facilius prouocatur. Quæ præmittuntur ut ueniat ad curas: aqua enim calida diutissime lumbi fouebuntur & renes, tunc ha uenam agrestem ex uino dulcissimo duabus cotylis decoquis, & per sinistram narem infundis colatos humores; ficus præterea optimas decoques in aquæ cotylis quatuor, mixtoq; nitri puluere similiter diffundes. Alliu quoq; cum uino decoctū, & per sinistrā narem infusum producit urinas. Memineris statim cum in passionē ceciderit, hordeū eis subtrahendū penitus & potus, herbas uirides uel farragines ad sustentandum dandas. Sarmatarū autem æquitas ueteres plurimū ualuerunt, usus inuenit, ut animalia à collo usq; ad pedes inuoluantur de sagis, suppositisq; carbonibus uiuis, addito castoreo, suffumigentur, ut totum uentrem testiculosq; eorum caltoarei fumus euaporet, & confestim detractis carbonibus cooperti decambulant, & mingunt. Allumen salsam, & sale fricato admixtoque oleo,

M a & melle



## ARTIS VETERINARIAE

& melle collyrium longum & tenue facito, & in ueretri ipsius foramine in-  
 serito, continuo prouocabitur. In ano panacis quantum digiti minoris extre-  
 mitas est, dabis. Alij cepas acerrimas & leuiter contusas tres aut quinq; po-  
 nunt in anũ, & sic de ambulare faciunt. Ad urinas inuentus est qui affirmat  
 & ungulam equi ipsius radi & teri cum uini sextario, & per nares infundi  
 ad celerem mictionem. Si non tali ratione prodesset, betas & maluas deco-  
 ques, & aquam earum calentem cum melle ad unũ sextariũ naribus infun-  
 des. Si tempus uirides denegat cibos, foenum mellicrato aspersum praebebis;  
 uel succum ptisanæ hordeaceæ cum mellicrato similiter dabis. Aliquantum ros-  
 marinos decoquunt, & ex ea calida fouent. Alij cimices tritos in nares ani-  
 malis mittunt, & aliam super naturam quam inungunt cõfricant. certissimum  
 dicitur. Porros decoques, & succum eorum exprimes ad sextarium i. et cũ  
 uini ueteris et hemina olei acetabulũ permisces, & per narem dextrã dabis,  
 deambulãdo ducis. Vulgare et uerũ est remediũ, lutũ de uia ex lotio cuiuscũq;  
 equi factum, uinoq; permixtum & colatum naribus infundas. Apij radices  
 aut mellicrato decoctas praebebis, pulueremq; thuris ouumq; crudũ cum ui-  
 no dulci permixta & calefacta supra renes & ilia inungens consoueabis. Ex  
 melle quoq; decocto & sale collyria longa & tenuia foramini immittun-  
 tur quo emanat urina. Musca uiua & loco ipsi immittitur, uel mica thu-  
 ris apponitur, & de bitumine collo inseritur, ut prouocetur urina.

### De fluxu uentris. Caput .XVI.

**Q**uibus modis strictus uenter solui debet saepe prædictum est, Nunc  
 exponendum est quemadmodũ, si solutus, postea restringitur. Et  
 enim hoc animalibus periculosum nimis est, nisi uelox medicina sub-  
 uenerit, cuius necessitas de experimẽto principali tenendũ est. † Clistere un-  
 ciam ex uino austero dabis, caryotas tundis & gallas syriacas, & exinde da-  
 tur potio salutaris. Talis quoq; subuenit cõpositio: ceræ uncias 2. lardi librã  
 unã, piperis uncia semis, picula semiuncia diligētissime tundes, cassiæ un-  
 cia semis trita pariter conspergis, offas facies, solito more intinges in cera cũ  
 remissa est. Sic quoq; digeres stercoris ouis libram, & in aceti et mulse sex-  
 tario per cornu dabis, herba rubea restringes, si dederis in uino spongiam.  
 Offam intinges in pice liquida, post cõbures, farinãq; eius cum uino austero  
 defundes,



defundes, farine triticee heminas quatuor pariter cōmises & digeres. Nitrum quoq; si potest fieri, uirgineum diligentissime tritum & in puluerem redactum, cum aceti semiuncia diligentissime tritum dabis heminam. Puluis ex pumice datus cum uino in potu, mox medetur.

## De uerrucis. Caput .XVII.

**A**lijs quoq; partibus corporis nascuntur aliquando uerrucæ, & uitiū difformitatis important, hac ratione curandæ: lino subtili constringentur ipse uerrucæ, in causticum crudum imponitur & sponte decidunt. ferro etiā præciduntur, & de cauterio leuiter adusta sanantur.

## De uitijs coxarum. Caput .XVIII.

**M**isera fit coxa, cui de uenis femoris sanguis emittitur, & in uase diligenter excipitur, admiscetur etiam puluis sulphuris, nitri, baccarū lauri, simul tritis, & contra pilos diutissime perfricatur, & per triduum sic permanere permittitur. Aqua etiā, in qua uerbena coctæ sunt tepida (datur in die) fomentabis: pedes quos sanos habet glante ferreo, uel si de fuerit, sparteæ calceabis, cui lemniscos subijcis, et addita fasciola diligentissime colligabis, & suppositiciam facies parti illi quæ misera est, ut planas ungulas possit ponere, in crisma etiam perunges in sole non minus quàm hora, contra incisuras quatuor foraminibus cautere pertunde, & pannos uel lemniscos ex aceto sub cute per foramina traice per triduum, post traumatico illinitos pānos diebus nouem per eadem foramina traicies, uel calida uerbena tia utaris, et sic lemniscos subijcias. Undecim quoq; lemniscos inducis et incretas locū ut cutis ad pulpas adhaereat. Cū cicatrices se clauserint, causticū imponunt. Hac ratione emota uel læsa coxa sanabitur. Vel si coxa se læserit, uel à Mulomedicis dicitur filius læsisse, certior & facilior curatio inuenta docetur, & probata. Nā dudū claudū aīal in sole ponūt, uino & oleo calefacto calefaciūt ipsum, hoc est, iuncturas coxæ diutissime confricant, donec sudet. Tunc animal capistro trahunt, & sensim currūt, alius lorū uel funes tenet, lassus sequitur, & subito dum animal currit, recta ad se coxas ipse cum impetu trahit, si sonuerit, scias loco suo redisse, paululumq; cessabis, post sensim deambulando tentabis. Si ad locum suum redierit, retractos pedes ponit, & minus claudicat. Vltorius animal non conuexabis, sed per triduum fomen-



## ARTIS VETERINARIAE.

tabis ca'ida uerbenatia, post causticum induces. Quod si prima die iunctura componi non potest, secunda die simili ratione coxas saepius trahis, donec reuertatur ad locum. Quicquid autem uexatum uel remotum fuerit uel ictu rotæ, aut quocumq; alio casu, in prioribus uel posterioribus partibus, uel articulis, uel genibus, hoc anacollima constringit & consolidat. Bulbos rufos triginta, cochleas uiuas triginta, anagallici libram 1. plantaginis uiridis manū plenam diligentissime contundis & misces, additis tribus ouis, cū stuppa imponis, & colligas. laxata constringet, & tumefacta sedabit.

### De laccis gambarum. Caput .XIX.

**S**I iumento laccæ enatæ fuerint in gambis, his agnoscitur signis: Dextra ac sinistra ad similitudinē uesicæ inflabitur cutis. Curādū est aut hac rōne qua flegma in genibus diximus oportere curari. Est & alia medicina. Lentes quæ supra aquā natāt colligis atq; cū tundis, additaq; ueteri axungia colligabis. Vitū exicare prohibetur. Si gamba uel armus aliquo loco ex ictu aliquo tumere cœperit, cretā cimoliā & lubricā ex aceto acerrimo miscebis & oblinis.

### De gambofo. Caput .XX.

**S**I gambosum factum fuerit aīal, & recens passio est, de tibia sanguinem emittito, lanā succidā circūligato. Caue ne fomentis aut cauterio tangas, utrūq; enim in tali curatione contrariū est. Malagma cruda uteris, tertio die semper soluis & curas. Cū uideris aīal profecisse, causticū inducis. Si quod iumentū coxā fregerit, aut supragambā, scias nō posse curari. q̃a partes istæ ligaturas tenere non possunt.

### De his quæ læduntur à rotis. Caput .XXI.

**S**I iumentum aut rotæ, aut axis ictu fuerit elisum, in recenti lanam succidam ex aceto & oleo colligabis per triduū, post ficus duplices & nitrum pariter tritū imposito, die tertio soluito ac renouato. Si nihil profecerit, malagma tetrapharmaci imposito per triduū. Si & ipsa tardauerit, imposito malagnā quæ dicitur meliacinus, usq; dum sanetur.

### De Syrmatico. i quod coxā subito trahit. Ca. XXII.

**S**Yrmaticū iumentū his agnoscitur signis: Prodiēs de equili, uel de loco ubi steterit, coxā trahit, & trāuersum ungulā inflexis coronis terra superim



superimponēs ostendit, & syrmaticū (et ragidorū paleis quæ trabuntur) dicitur. Sed quāuis alienata horū, uel emota coxa uideatur, si super (tempaueris <sup>als. si super ip-</sup> pedes cessis) compellatur, continuo emendabitur gressus, & sine claudicatione <sup>sum cess.</sup> rectus incedet. Ex hac aut ratione coniungit, si commissurā uertibuli ex corruptione corporis, uel perfrictione natus humor intrauerit, tunc se defundit ad neruos, & eos reddit immobiles, & uelut alienatos. quæ hac ratione curatur: Sanguis ei de subgamba detrahitur copiosus, in quo admisceas sal, sulphur, marinas cochleas, mannā thuris, feculam, nitrū, baccas lauri, æquis pōderibus, cōtusa oīa atq; cribrata, uino quoq; ueteri et oleo miscebis cū sanguine ipsius: q̄ unctione præpata, post inflationē illinis. coxas calida in qua uerbenæ decoctæ sunt, interposito triduo, diutissime cōsuebis, post unctionē renouabis. Si ex hac re plenā nō recepit sanitatē, uulnus uris cauterio in ipso uertibulo. Similiter scyaticis fieri consuevit. Quacūq; aut de oxoenis, ceterisq; uitijis articularū, uel de ungulis priorū pedū nunc dicta sunt, scias etiā in posterioribus debere seruari.

De morbo alienato, ex quo infecta animalia moriūt. C. 23

**A**lienatum morbum auctores uocauerunt, quoties hæc signa procedunt: Patentes oculos animal habet, nec sentit hoīs aduentū, q̄bus et labra, & ipsa orificia intumescunt quasi ab aliqua bestiola cōtacta. Quē morbū alij auctores orabum nūcupauerūt. Est aut nequissima passio. Primo q̄ pestifero transitu contagionē spargit in plurimos. Deinde q̄ impios decipit specie sanitatis. Nā resecta et bene curata animalia ex hac passioe subito inflata moriūtur. Alienatus aut uocatur, q̄ aīalibus eripit sensus, Malleus, qd̄ pestilētiæ internociūū contagiū facit. Plerūq; autē uiscera interius uermibus cōsumit. Quorum morsu pertuso aqualiculo aīalia suffocata subito moriūtur. Sed si uelocior medicina succurrat hac ratione saluātur: de ceruice sanguinē detrahis, potionē cōponis huiusmodi: Gallici lib. unā, hysopi librā 1. abrotani librā semis, aristologie rotūdæ lib. semis, mānæ succari uncias 3. trixagnis uncias 3. Quæ omīa cōtundito et cernito, ex aqua mulsā copiose decoques, et aīal diebus pluris potionabis egrotū, sed q̄a plerūq; huius ægritudinis pestilētia trāsīt in pximos, totū gregē si inciderit, ut aut singulas heminas singulis digeras potionare te cōuenit. frequētissimis etiā suffumigationibus, stagnare piter & curare, sicut in malleo superius constat expositum.

Quibus



## ARTIS VETERINARIAE

Quibus usque adeo mutanda sunt pascua, ut si fieri potest, in alias trāsmittere  
 alio labore da sint regiones. Nam qua transeunt in t̄lanis & in ipso anhelitu inficiunt  
 uniuersa. Velocius autem curabuntur, si separata fuerint atq; translata.

### De roborosis. Caput .XXIIII.

**R**oborosa passio dicitur, quæ animal rigidum facit ad similitudinem li-  
 gni, cuius hæc sunt signa: Totum corpus astrictum, extensæ sunt na-  
 res, & aures frigide, immobilis ceruix, os constrictum, caput exten-  
 sum, colligati armi uel crura, pedes etiam constricti ut nulla cōmissura flecta-  
 tur, cuius caput si erigere uolueris, non poteris, oculi præcluduntur, spina præ-  
 rigida, & ideo difficile erigit caudam, ut eam flectere & mouere non possit,  
 dura ilia, astricti sunt renes, cubare penitus non potest. Cōtingit autem hæc  
 passio ex nimia perfrictione uel spasmō neruorum, uel tremore, unde conteta-  
 nici dicti sunt. Plerunq; in hanc ualetudinem incidunt, qui cum ab igne ca-  
 strati fuerint negliguntur, & inambulantes frigore læduntur. Quorum ner-  
 ui recenti dolore & frigore compelluntur, & spasmus patiuntur, & obdu-  
 rescunt in robur. Ediuerso etiam altius quàm expedit in pedibus usta iumē-  
 ta, uel quocunq; alio loco contactis neruis patiuntur spasmus, & robur in-  
 currunt. Ex nimia quoq; pruina, uel si in nimio frigore sudabunt, uel è ca-  
 lidis stabulis producātur in frigus, fieri adsolent roborosi. Sed si à posteriore  
 parte fuerint comprehensi, ut morbus desinat in lumbos, opisthoni fiunt, ca-  
 lefactionibus tamen, unguentisq; curantur. Si quod uero robur à priori par-  
 te comprehenderit, ita ut os aperire non possit, desperanda sunt. quia constri-  
 ctis dentibus, fame perire coguntur. Quæ autem ex toto corpore æqualiter pe-  
 riclitantur, ita ut ex aliqua parte os ualeant aperire, tam diu unctionibus ca-  
 lidissimis perfricanda sunt, donec sudent, coopertaq; sagis copiosissime, loco  
 calido statuuntur, ignisq; iuxta ea fieri consuevit sine fumo ut amplius sudet.  
 Surculos quoq; laureos ualidiores in os eorum inter malas mittito, ut roden-  
 do eos exagitent maxillas & calefiant. Fabas quoq; solidas cum baccis lau-  
 ri mixtas ieiuno dabis. Aquam quoq; calidam offeres ad potandum. Ventrē  
 ipsis cum mulsa calida, admixto castoreo, clystere purgabis; oleum quoq; op-  
 timum cū succo ptisanæ mixtum per narem sinistram defundis. hordeū emol-  
 litum cum surfuribus admixtum dabis ad substantiam, donec sanetur. Ali-  
 quantū



quanti dixerunt oportere eos aere candenti, in arena fluuiali uel martima colligatos obrui, ita ut caput eorum extet & nares, & tam diu deteneri donec sudet. Sed ex suprascripta cura saepe plures constat esse sanatos. Quod si ex hac re non profecerint, ures eius ceruicem dextera sinistraq; decussatim, saccellationem ex fursuribus supra totum tergum calidum imponis per triduum, & hac unctione quotidie uteris in sole si caluerit, uel in calidissimo loco; Ceræ libram, affronitri libram, resinæ terbetinæ selibrā, galbani libram, castorei selibrā, opopanacis libram, piperis unciam, medullæ ceruinæ uncias duas, olei ueteris uncias duas, & semis, uini ueteris optimi quantum opus fuerit admisces & uteris. Præsens tamen experimento remedium est, si picem liquidam cum oleo & uino ueteri decoquis, calētiq; medicamine iumentum perungis. Ex qua unctione & auriculas cum oleo tepesfacto oportet infundi, ut sanitas matura proueniat. Sed ut uenæ eorū calefiant intrinsecus, & conceptum frigus exudet, necessaria potio est, quæ roborosos, tetanicos, & epistotonos salubriter curat, clabi † seminis uncias 2. cimini alexandrini uncias duas, agallici, castorei, abrotani uncias singulas, trixaginis uncias duas, mannæ croci unciam unam, succari unciam, hyssopi unciam unā, piperis albi semiunciam, quæ omnia diligenter tussa atq; cribrata redigantur in puluerem, ex quo bina cochlearia lassus & periculose se habentibus cum succo ptisanæ tepidæ propinātur: forcioribus uero cum uini ueteris calida hemina defundūtur in os, nunquā tamē sine oleo propter leniendā potionis austeritatem, & cannalem faucium mitigandum. Alij auctores eiusmodi passionem hac dicunt ratione curandam: De temporibus sanguinem detrahes, excipiesq; diligenter, iniecto nitri puluere, sale, atq; castoreo, animalia perfricari, & loco calido statui oportere, atq; hanc offerri potionem: lac caprinum, rutam, baccas lauri, piper album, oleum, et fabas solutas: hordeūq; etiam datur ut agitet edēdo maxillas, die tertio de cauda sanguinem tollunt, & renes calidis unctionibus fouent. Interdum etiam in balnea intronittunt animalia, ut diligentius conualescant. Dant etiam quotidie potiones. fustes quoq; uel de salice, uel de robore in os mittunt, ne maxillarū usus indormiat. Si melius habere coeperit, post duodecim dies coopertū exercebis ut sudet. Si ista non ualuerint, uteris superius declaratis. Plurimiq; asseuerant, ficulneas frondes roborosis oportere præberi, quæ naturaliter calent. Potionem

† al's dancē

N quoq;



## ARTIS VETERINARIAE

quoq; per os dandā: opopanacis uncias 2. storacis uncias 3. gētianæ uncias 3. mān. e succari uncias 3. myrrhæ scrupulū 1. piperis lōgi scrupulos 2. cum uino ueteri tepido, atq; ad cornu d gerere. Hac etiā unctiōne ad curandū robur uel expellēdum frigus utuntur: Cerae librā, resinæ ter bentinæ uncias 8. opopanacis uncias duas, medullæ ceruinæ uncias duas, storacis uncias quatuor, baccarum lauri selibram, olei pini prout opus fuerit: quæ omnia in unum adiecta in aqua decoquunt, & persfricantes inungunt.

### De hydropicis. Caput .XXV.

**H**Ydrops nō leuius animalia quā homines frequēter infestat. In talibus namq; uitijis cū digestio ciborū plena non prouenit, humor noxius perniciē corporis, tumorēq; cōsueuit inferre. Quā ualitudinē hac signa demonstrāt: Turget uenter & crura, testiculi, scapulæ, latera et tergus inflātur usq; eo, ut nec ī capite eius apareāt uenæ. Cui cū sublinguā tetigeris subtuſſiet. Hunc ambulationibus breuib; opertū grauioribus sagis donec sudet exercebis in sole, et aduersum pilos per totū corpus post modū cōfricabis. Cibū daturus radices cū folijs suis, quia & purgationē faciunt & uitio medentur: scēnūq; cōspersum aqua nitroq; præbebis, die ac nocte maceratos lupinos in aqua, rursumq; siccatos, præbebis in cibo. Radicē quoq; cucumeris syluatici uel folia, quæ uentrē moueant, eidē dabis ut purges. Quæ curatio si tardauerit sanitatem, euocandus est humor. Quatuor itaq; digitis ab umbilico ad ueretrū uersus sagitta pungis, & periconiū ipsum pungas, sed caue ne intestina tangas, et animalia perimas, subijcis fistulā centimālē et patieris humorē currere quantū aestimaueris necessariū, quē in uase excipies. Cum fistulam abstuleris duo uel tria grana salis in plagā inseris, ne claudatur. Insuper & pastillos imponis. Alia uel tertia die apoforesim quasi facturus, denuo fistulā appones, humorē eijcies, donec partes totas exiccet. tunc uulnus curādū solēniter, potiōesq; catharticas pos dabis frequēter. Inter diu usq; dū sudet exercebis. Quāto fortius esse cœpit, tāto diligētius est curādū, et semper abstinendū à potu, ut tepidū et modicū ad sustēnationē bibat tantū.

### De sarcoſtis. Caput .XXVI.

**S**ARCOſtis quoq; talis est passio: Iumentū cū biberit inflatur & sufflat. hac eum ratione curabis: cineris uel lixiuij sextariū unū, seminis plātaginis unncias 5. cōteres & cum uino dabis & oleo celeriter, usq; quo resideat in



# VEGETII LIBER III.

10

flatio. Alij auctores asserunt ab umbilico duobus digitis cōtra pectus plagā fieri debere, & fistulā poni, & educi humorē uel aquā noxiā usq; ad sextarios tres, uel amplius si maior est tumor. Sed cautius est per partes sepe tollere, ne repētina exiccatio periculū faciat. Potionibus utēdum esse dicunt, quæ urinas moueāt, frequēter etiā cōfricandū esse ut sudet, pr. fœno gramen accipiet & pro hordeo cicercis infundi. Prodesse etiam dicunt si inter pigmentarios frequentissime deambulet animal: quia diuersi odores latentē pulmonibus prosunt. Potionem etiam huiusmodi dant: Petroselinum & mala granata cōtundunt, et cum uino ueteri per os digerunt. Apium quoq; quantū appetere uolueris offēres ad edendū. Asparagi syluestris radicis uncias 2. cū uini ueteris sextario decoquis, ut ad tertiā redeāt, et ad heminā p os digeres.

+ a's apponere.

## De tympaniticis. Caput XXVII.

**T**ympaniticus quoq; hydropico similis est, sed alijs agnoscitur signis: uenter quidē eius crescit ut hydropici, & ceruix fit rigidior, sed nec testiculi nec crura intumescūt. Cōuenit itaq; tympanitico calidū cinerem cū liquamine optimo in panno, uel lintolo umbilico uel uentri subponere, & fascijs colligare, sed à pluribus aīal tenendū est ne luctādo moueat ligaturas. Radicē panacis sit. gallicū pariter cōteres, et cū oleo uinoq; tepesfacto p cornu faucibus digeres. Preterea tymū syluestre & etargiū in uino decoques, et singulas heminas per triduū dabis. Tympaniticū hæc signa demonstrāt: ciborū bibēdiq; fastidiū, exiguus somnus aut nullus, si p nares mucos coeperint emitte deſperandū est, si mūdās nares habuerint hac ratioe curabis: cremorē ptisanæ et defruti binos cyathos p triduū dabis tepidos. Preterea hyssopi uncias 4. alei uiridis manū plenā, palmas numero uiginti, fœnigreci cyathos sex, aquam cisterninam & uinum odoratum uetus pariter misces, diligentissime decoques, & in potionem per triduum dabis.

## De lienosis. Caput XXVIII.

**L**ienosi ut manifestū est periculum, ita manifesta sunt signa. Nam oculi inuertuntur & suffusi sunt sanguine, tardius ambulant, collum habent extēsum et fit deterius et rigidius. Quæ passio principū indicat roborosi, quorū latra intumescūt, siue ceruicis media spina ad similitudinē aluei fit cōcaua, astringūtur aliquādo maxillæ, quod uitiū cōsuevit inferri

N 2 ex m

a. pol.



## ARTIS VETERINARIAE

ex nimia perfrictione, cū animalis dorsum aut frigore, aut pluuia, aut grā  
dine ceditur, aut nubibus. Cuius ista curatio est: De cauda parum sangui-  
nis demis. Nam si amplius tuleris infrigescet, & rigori additur rigor, admi-  
sces in eum merum, & oleum, & calefacies, & statim hac dorsum & cerui-  
cem perunges, saccellum quoq; ex fursure calidum impones, ut totam spinā  
tenere possit & lūbos, altera die extergebis diligenter & unctiōe eadē per-  
fricabis, supra quam similiter cum fursure calentem saccellum imponis, hoc  
usus unguento: medulle ceruinæ libram unam, mannæ thuris uncias qua-  
tuor, depli uncias tres, castorei uncias tres, opopanacis uncias tres, resinæ  
frixæ uncias 3. apoximæ uncias 3. resinæ terbentinæ uncias 2. ceræ librā  
semis, olei laurini uncias 8. (sæpi caprini libram) olei glaucini sextariū 1. ex  
(olei cyprini) his sicca quæ fuerint tundis & cribras, cætera super carbones soluis, quibus  
cretā admisces, & leuiter decoquis in uase nouo, uncturus cū necessitas po-  
stulauerit, reponis ac seruas. Hac quoq; potione intrinsecus curabis: absyn-  
tij unciam 1. aristologiæ uncias 3. betonicæ uncias 2. petrosilini unciam 1. et se-  
mis, trixaginis unciam 1. thuris masculi uncias 3. castorei uncias 2. mannæ suc-  
cari uncias 2. contundis piter et cernis, et ex aqua mulsa et oleo diffunde p-  
fauces, absq; dubitatiōe curabis. Alij auctores asserūt sanguinē de brachio-  
lis auferendū, et aīal abstinendū ab hordeo, oleū, nitrū, marrubiū, sanguinē  
de brachiolis æquis ponderibus tritū cum absynthio pontico & uino auste-  
ro per os dandū, & cum biberit deābulet, & spongijs calidis foveatur, &  
pressa manu diutius perfricetur. Si uentris permanserit tumor, pectus cau-  
terijs inurendum est. Post quinq; dies ternos digitos subijcis hac atq; illac  
inurendum est iterum, obseruabis autem ne uenas forte comburas.

### De implecticis. Caput .XXIX.

**I**Mplecticus autem quia similem sustinet passionem, perfricandus est un-  
ctiōe superius memorata, & si necessitas postulauerit inurendus.

### De phragmatico. Caput .XXX.

**S**I phragmaticum erit iumentū, his agnoscitur signis: febricitabit, ocu-  
los introrsum reducet, aures tensas habebit & rigidas, terram pedi-  
bus tundet, quod hac ratione curabis: Sanguinem detrahas de matrice,  
adiunctoq; oleo & uino tepes facies, totumq; iumentum contra pilos diligen-  
tissime confricabis, loco tepido statues, & curasti.



## De eo qui aquam timet. Caput .XXXI.

**A**liquando iumenta aquas timent, quæ dicuntur, hydrophoba. Signa huius hæc sunt: uenas omnes habebit extensas, sudabit suffusus oculis, tremorem frendorem que patietur, illidet se parietibus; ex qua passione conuertere consuevit in rabiem. Cui hac ratione succurris: Sanguinem ei de femoribus detrahes, à cibarijs abstinebis, in loco sic clauso ut lumen uidere non possit constitues, magno silentio aquam in situla uel alueo ita apponis ut non audiat sonitum, manipulum rutæ deterito, et baccas lauri xv. olei rosati librā, aceti unciam i. commisceto, caput et nares diligentissime perunges, et sanabitur.

## De Spasmo. Caput .XXXII.

**S**pasmus certum est animalia sustinere. quæ necessitas his declaratur indicijs: Subito concident, et articuli eorum extensi sunt, et toto corpore palpitant, aliquando etiam de ore spumam emittunt. Quibus escam dabis pasca nitroque conspersam, cucumeris quoque syluatici puluerem, et nitrum tritum per septem dies in potione dabis ut purget. Sanguinis quoque marinæ testudinis dimidiam cotylam, aceti tantundem, laseris aliquantulum pariter misces, et suffundis in nares. Vtile dicitur terga eorum oleo et aceto et nitro frequentissime confricari.

## De Epilepsia. Caput .XXXIII.

**Q**uadam ratione lunari animalia sicut homines frequenter corripiuntur, et intermoriuntur. Quorum ista sunt signa: lacerantia contremiscunt, saliuæ per os defluunt, desperata pro morituris (frequenter) consurgunt, et pabula appetunt. Cartilaginem naribus eorum digito tentabis, quanto frigidiores inueneris, tanto plus casurum scias. Si minus frigida fuerit, rarius cadet. Cuius ista curatio est: De ceruice eius copiosum sanguinem tolles, post quintum diem de temporibus, loco calido tenebrosoque constitues, totum corpus thermantibus confricabis unguentis, cerebrum quoque eius et auriculas pice liquida cum oleo laurino admixto largius perunges, et mittes intrinsecus, caput etiam aluto et cerebellari communies, potionem aut cathartica dabis eiusmodi: Radicis uncias 2. panacis radicis unciam i. diagridij unciam i. cum cucumeris syluestris unciam. quæ omnia bene trita commisces, cum mellis sextario i. decoques,



## ARTIS VETERINARIAE

**E**x quo cochleare plenum in aquæ calidæ sextariū, et olei drachmas 3. mittis  
et per os defundis. Caput quoq; eius sæpius curabis. Radicē dianariā, id est  
herbæ artemisiæ, in puluerē rediges, et p fistulā naribus insufflabis. Radicem  
quoq; laseris tinsam si naribus defuderis, eadē ratione proderit. Si aut passio  
perdurauerit, caput eius ures, ut apioso fieri consuevit.

### De eo quiaquam reuomit. Caput .XXXIII.

**A**nimalia sæpe aquam reuoment quam biberant. Quæ passio è nimia  
perfrictione descendit, cū stomachus paralytim ex frigore sustinuit.  
Sed hac ratione curantur. Sanguis de ceruice detrahatur, portiones  
thermanticæ propinantur, unctionibus calidissimis armi pectusq; confrican-  
tur, purgatur p nares caput, et si necessitas postulauerit, etiam sinapizantur.

### De Sideratitio. Caput .XXXV.

**S**ideratitia iumenta dicuntur, cum uenas uacuas percusserit frigus, aut  
æstus, aut impleuerit cruditas, aut ieiuna bulimū fcerit. Redditur enim  
stupidum animal, et titubans ambulat. Quod mollibus cibarijs, leni-  
busq; potionibus curari oportebit, ita, laseris uncia 1. et heminā mulse, suc-  
cumq; ptisanæ miscebis. Et si ex frigore causa est, cum uino et oleo tepido da-  
bis. Si ex æstu, cum rosato præbebis. Si ex cruditate, abstinebis à cibo. Si de  
bulimo, ciceres offeres largiores.

### De percusso à sole. Caput .XXXVI.

**S**ol quoq; canicularis ardentior, animalia pcutit in cerebro, quibus de  
temporibus sanguis emittitur, et similiratione curantur. His aut osten-  
ditur signis, quia deiectum caput portare coguntur.

### De Cruditate. Caput .XXXVII.

**C**ruditas iumentis generat ægritudinem, quæ hac ratione dinoscitur:  
modo in unā partē, modo in aliā ambulātes inclinant. Quorū ista est  
medicina: Sanguis eis de ceruice detrahatur, à potu et cibarijs abstine-  
tur. Si æstus est, refrigeratorias accipiant portiones, nō parū natura cōpellitur.

### De Bulimo. Caput .XXXVIII.

**B**ulimum animalia sustinent frequenter ex fame, frequenter ex lassitu-  
dine



dine. Cuius ista sunt signa: Anterius fugiunt, incertus effusus, tremebit. Quæ hac ratione curanda sunt. In primo omnium defricetur ex uino oleoque tepesfacto, cum t mūdīs mollem partem uino infundis, et cū eodē confricabis. Si ilion fecerit, per cornu digeres et reparabitur. Quod si permanserit bulimus, si mulæ heminas cū sextario uini infundes, et per cornu digeres. Quod iter t a gerit inciderit bulimus, ubi necessaria de sunt, terram faucibus infundes, aut offas facies, et per os digeres.

## De Anhelitu. Caput .XXXIX.

**Q**uod si ex anhelitu inflationes cōtigerint, cuius causæ rationes reddi non possunt, pascam calidam cum spongia cerebro eius apponis et pectori, in aures eius oleū laurinū mittes, frigidissimo loco eū cōstitues, nares quoque titillabis ut frequētius sternutet. quo factō, statim exhilaratur.

## De æstu. Caput .XL.

**S**i æstuauerit animal et defectionem patietur, brassicæ folia cum apio cōfundes, et cū uini sextario permiscebis, et per narē sinistram infundis. Si uero fortius æstuauerit, petrosilini, daucij, (silis) gallici, abrotani, spicæ nardi, sinoantis, æquis ponderibus tunduntur, et cū aqua mulsa data, æstū releuant. Quod si his ita membra defecerint ut cōcidant, quibusdā placet abstineri eos à potu, et sitiētes in aqua frigida una hora stare, et cōtinuo reparari. Alij dixerūt hordeaceā farinā cū uino p cornu faucibus infundi. Plæriq; ex pti sunt triticeā farinā cū aqua frigida datā continuo profuisse. Vel certe tria oua cruda cū pulegio et pasca, oleoque permixto, faucibus infundunt.

## De Paralytico. Caput .XLI.

**P**aralytici ad similitudinem hominum iumenta patiuntur, quæ his ostenditur signis: Ambulabit (pronus) in latere ad similitudinem cancri, ceruicē incuruabit ut solent habere quibus fractæ sunt, rectos pedes nō ponēt (sic ægri parietibus se illidū) cibū et potū nō recusant. Hordeū aut ipsius udu semper apparet. Hac ratioe curabitur: Sanguis ei de temporibus pte cōtraria nō qua contractus est tollitur, unctionibus theriomaticis pfricatur, ceruicesq; eius constringuntur usq; eo, ut cretellis ex lignis impositis constricta ceruice prauitas dirigatur. Loco autem calido stabulatur sicut roborosus.

Cui ipsa



## ARTIS VETERINARIAE

qui ipsae potiones dantur. Si parum in totum ista medelaru adiumenta profecerint, cervices eorum uruntur, non qua contractus est, sed ex parte contraria de cauteris accipit palmas ab armo usque ad cervicem, auriculae et in tempore uritur ad mensuram semissis. In alia autem parte temporis quasi stellam parvam cauterio facies, et in parte renum usque ad mediam spinam uirgulas dabis solemmniter, et curasti.

### De intrinsecus rupto. Caput. XLII.

**I**umenta nimio saltu, uel cursu aut ruina, cum aliquid ruperint, uulsant, quorum ista sunt signa: Stranguriam patientur, excreabunt etiam purulentum, et quoties uolutata fuerint non reuoluuntur, nec se excutiunt. Si recens ruptura fuerit, sanguinem magis excreabit quam pus. Quae curantur glutinosis et leuibus cibis. Talem etiam accipiunt frequentissime potionem: Thuris masculinae unciam .i. opij unciam .i. heliotropij unciam, quod intybum agrestem uocamus, rutae unciam .i. quae omnia diligenter trita cum uino austero quatuor mensuras adijcias, et per dies singulos dabis ad cornu, donec quae intus rupta sunt glutinentur.

### De Infania. Caput. XLIII.

**S**ed animal nonnunquam inuadit infania, ut praeseptum frangat, seseque morsu laceret, impetus etiam in homines faciat, auribus micat, oculis attentis et splendidis, et ex ore egerit spumam, quem caute ne medentem ledat, diligenterque costringito. Sanguinem ei de ceruice et de cruribus trahito, rursumque in tenebris contineto, donec appetat cibum. Cum coeperit ad patientiam reuocari, succum cicutae uno acetabulo, et aquae unam heminam admisces, et per os defundis. Post rutam conterito, et supra cerebrum ponito, caputque lanata pelle constringito et curato, et cum profecerit calide stabuletur. Talis quoque potio equis subuenit rabiosis: baccas lauri nouem, et alei purgati grana uiginti et unum, diligenter conteres, et cum uino ueteri candido pnam sinistram inijcias.

### De Pletura ex hordeo. Cap. XLIIII.

**S**i animalia dum sudant hordeum comederint, uel ipsum hordeum nouum fuerit, quia uehementius calet, uel copiosius quam oportet ociosa pascuntur, absque dubio indigestio et pletura comitabitur. Quae passio his agnoscitur



Scitur signis: Sudabit, ligati erunt arui, ambulabit incertum: Sanguinem ei de ceruice detrahes, aceto oleoq; permixtis totum corpus diligentissime cōfricabis, leuibz ambulationibus exercendam est, & ab hordeo penitus abstinendum. Cui eiusmodi subuenit potio: brassicæ follia cōtundis, succamq; exprimis, & myrrhæ puluerem, & parum liquaminis, & uinum uetus optimum misces, quod per triduum per os defundes, ita digestio & sanitas consequetur. Aliquantis præcantatione tentant asferre remedia, quæ uanitas ab amiculis solis diligenda est: cum animalia sicut homines non inanibus uerbis, sed certa medendi arte curentur.

De passione pulmonis. Caput . XLV.

**P**ulmone ut integri præstant substantiam uitæ, ita uitiati periculum asferunt mortis, quorum dolor manifestis declaratur indicijs: stertet, tuſſiet grauitèr, et excreabit purulentū. Si ægritudo longior fuerit, de prioribus claudicat pedibus, grauem fœtorem naribus expellit, difficile se collocat, sed febriens præsepio incumbit, corruptum assellabit. Aliquando in corpore ipsius similia furunculis tubercula nascuntur. Quorum ægritudo difficilis est, sed hac potione curanda: thuris masculi uncias tres, hyssopi uncias 2. folij unciā 1. manne croci unciā 1. murræ uncias 2. diligenter tundis et cribras, ex quo puluere unū cochlear cum tribus ouis & aqua temperabis et diffundis per os. Si cibum non appetit, pro aqua lac caprinum miscebis, & addito mellis cochleario propinabis. Succum quoq; ptisanæ cum oleo rosato, & puluerem superius comprehensum cū ouis per os dabis ad cornu. Offas quoq; ex duobus sextarijs farinæ triticæ, & uno sextario erui polliinis facies, quibus admiscebis ex suprascripto puluere quinq; cochlearia. Sed septenas offulas diebus singulis digeras, quas quotidie ad substantiam dabis, donec cibos tentet appetere. Cui omnem escam propter fastidium uiridem oportet offerri, et contrario, lenticulam cum tritico uel hordeo torrefacto, cum palea dabis, ut quicquid ex diuersitate ciborū uoluerit eligat. Lac tamē recens cotidie ei conuenit dare. Deambulet plurimum, ubi coeperit conualescere ad exercitium reuocandū est. lac si defuerit, aquā in qua eruum prius lotum die ac nocte permāserit dabis in potu. In causa pulmonum de ceruice uel de palato his sanguis aufertur, quibus (nec) fastidium euenit, sed fortiora sunt corpora. Cineres quoq; ulmi loti & infusi aqua cum uino ueteri optimo

○ odorato



## ARTIS VETERINARIAE

odorato heminis singulas misces et dabis. Quod si uehementius uexatū aegritudine, trāsiuit in morbū; Radicis lētisci drachmā, thuris uncias 2. murræ drachmā, succari semiunciā, cōtere diligēter, et cū uino suffunde. Sūt et ista remedia: Vua alba in os equi frequēter exprimatur, semen radice datur in uino, amygdale frixæ cū aqua offeruntur. Sed est alia efficacior potio: Cardamomi uncias 2. cassiæ unciā, storacis unciā 1. quæ omnia si ualidior et sine febre erit cum uino, si febricus cum succo ptisanæ per os dabis.

### De orthopnoico. i. plagio rigido. Cap. .XLVI.

**O** Rtholisticum iumentū his agnoscitur signis: etiam si trahatur ambulare detrectat, anhelat grauitē, frequēter suspirat, rūchos ducit, ilia suspendit, dū manducat tussit. Ex quo uitio difficile liberabitur, licet in longū protrahat uitā. Pulmo enim eorū contrahēdo se cōburit, unde et macies cū morte insequi consueuit. In recenti tamen hanc curā festināter adhibebis: Sanguinē de pectore detrahes, et mero oleoq; pmixtū atq; calefactū punges. Lixiuū quoq; cineris diligēti ssime cretū, cum oleo optimo temperabis, et per nares diebus quinq; cōtinuis eidē digeres. Potionē quoq; dabis postmodū: Sinapis alexandrini frixi, et sulphuris uiui, et murræ cardamomi species, æquis ponderibus contundis et cernis, et cū melle (optimo) decoquis. Ex quo medicamēto ad magnitudinem nucis cū uino nigro calido dilues, et quotidie per os potionabis. Alij uero myrrhæ uncias 2. sulphuris unciā 1. nitri semiunciā, picis liqdæ pusillū deterūt, additoq; melle et uino uetere odorato, candido, p nares sæpius infundūt. Curabis autē ne algeat, tempabis exercitatiōibus ut sudet: et nō solū in potiōe, sed etiā in fœno nitrū cū mellis crato aspersum semp accipiat.

### De Epistotono. Caput .XLVII.

**E** Pistotoni quoq; similis passio declaratur. Orthotonicus qui totus est rigidus, Epistotonus cui in posterioribus partibus morbus insederit. Cuius ista sunt signa: Aures (rigidas) habebit, collū extēsum, oculos minores, tensa pellis in facie, labia grauiā, ut oscitare et apire uix possit, cibū potūq; fastidiet, cauda rigida, gressus incertus, mēbra distēsa, difficile progreditur, et frequēter in posteriōre ptē cōcidit, unde Epistotonus noiatur. Qd genus passionis hyeme curare difficile est, estate aut si diligentior fueris obtinebis.

Que



Quæ passio p̄ æstatē his nascitur causis, si iumentū ardētissio fuerit sole percussū, uel si in itinere priore claudicās pede, coactū fuerit ambulare uel currere, & uehemētius sudauerit, et ex sudore uel armū læserit, uel supra ipsum iacuerit ut armus indormiat. Hyeme aut cū de itinere uel de exercitatione uenerit, et cū sudore steterit sub diuo in frigore, aut in loco (recenti) uel humecto aut marmorato, aut tessellato, uel si frigore maxillæ obdormierint, tūc ista ægritudo cōtrahitur. Cui hac ratione tentabis succurrere: Adipis porcine ueteris lib. 2. resinæ ter bentinæ selib. piperis triti drachmā, ceræ librā, olei ueteris sextarios 2. piter decoques, et calidiſsime totū aīal perūges. Multi cruum decoquūt, calentēq; aquā capiti ipsius languētis imponūt. Alij in stercore ipsorū calido obruūt ægotātes, ut lāguorexudet. Plēriq; colligatis iumētis cōmodū credūt renes sole feruenti bene cooperiri. Hæc quoq; potio traditur salutaris: Piperis triti grana xx. cedri pōdus denarij, nitri uncia 1. mixturæ laseris tyrrhenici globulū ad magnitudinē fabæ, trita atq; permixta, addita liquaminis floris hemina, & uini ueteris summi sextariū bis in die per os digeres. Expiū dicitur, sanguinē bubulinū calidū et fumantē, sed moderate p̄ cornu faucibus infundis. Quod si forte defuerit, thuris cribrati & salis triti ternas uncias cū uino optimo prodesse dixerūt. Calidis medicamentis aīal expedit dum sanetur perungi. Adipis quoq; porcine recentis coctæ quantū existimaueris cum oleo optimo & uino summo & melle commisces, & ad carbonēs semper decoques, ac per nares infundes. Malagma quoq; de calidis speciebus in carbonibus cum oleo cyprino uel communi, sed ueteri, abluitur, & perungitur. Post curam operitur sagis, & in sole calido exercetur à sessore, & repedens dum sudet. Post sabanis ualidioribus abstergetur, & denuo unctum operitur, pice quoq; liquida admixto oleo perungendum, nō tamen nimia pix sit, ne corium lædat. Nōnulli iā ualidioribus de ceruice sanguinē detrahūt. Plēriq; in balneū ducunt, calidiſsimis potionibus curāt, id est, lasare & cymino, aniso, oleo, baccis lauri, ex quibus quotidie aliquid cū uino ministrant. Vnctionibus quoq; istis utuntur: Ceræ lib. resinæ uncias 4. opopandacis unc. 2. medullæ ceruinæ uncias 3. olei storacini uncias 3. olei laurini unc. 4. quæ oīa decoquūt, et in sole aut in loco calido perungūt. Alia quoq; unguēti compositio talis est: Baccarū lauri sextariū 1. cymini sextarios 2. sulphuris uiui unc. 3. resinæ unc. 1. galbani unc. 3. olei sextar. 2. q̄ oīa decoques et uteris.



# ARTIS VETERINARIAE

## Delethargico. Caput .XLVIII.

als(eruū melli  
tum)

**L**ethargici quoque iumenta ista sunt signa: Iacebit semper et dormiet, neque cibum appetit neque potum, cum excitatum fuerit continuo aggravatur, et se projicit, et macescit, et quancumque ei dederis potionem tanquam dormiens uix suscipit: quem hac ratione curabis: Substernito in stabulo ubi stat, ut bibat ibi, cui caput fomentabis ex calida pulegio decocta, postmodum perunges oleo cum adarte trito, ita ut caput eius et aures infundas, ea ususur potionem: camomillam illyricam, (idem nos trace) et herbam artemisiam in aqua decoquis, ex qua quotidie ei binas cotylas propinabis. Cui et pedes priores frequenter fomentabis calida. Solet enim haec passio adstrictius ad rectum pedem contingere. Est quidem periculosa passio atque curatio: cuius ista sunt signa: Oculi eius lachrymabunt quasi lippiant, in praescipio dormitans incumbit, a posterioribus ambulans nutat, et totum gravatur. Cui sanguinem detrahes de pede priori dextro, et de femore sinistro, ex quo eum perunges. Herbam artemisiam contundes, et cribratam dabis cum lixiuij sextario, et olei cyathis duobus, per triduum. quarta die intermitte. Quod si cibaria non appetit, (bolū ex melle) et aqua tepida comedat, et aquam bibat. Si minus profecerit, lini semen cum aqua in olla decoques, et heminas singulas per dies singulos dabis ad cornu, addito melle quantum sufficiat. Quae potio etiam febricitantibus prodest. Lethargicum animal frequenti exercitatione prohibendum constat a somno. Assidua quoque iniungenda est deambulatio si anteriores pedes eius miseris in fomentum. Nam furfures sale et aceto permisceas, et calentes ungulis imponis. farinam quoque triticeam cum tritis salibus et pusca sextario uno, faucibus infundes, herbam artemisiam tunsam cum oleo et modico lixiuij dabis ad cornu, abstinebis ab hordeo, fabae solidae sextarium porrigis ut uigilet, donec duriores edomet cibos. De ceruice sanguinem ei detrahes. Depletum hac ratione curabis: A frontis uncias tres, gallae syriaticae uncias duas, spicae nardi uncias 2. radices capparis uncias duas, tinsa et cribrata permisceas, et terna cochlearia in sextario aquae tepidae dabis in potu. Nunquam frigidam nec nimium calidam, sed tepidam ad bibendum semper accipiat. Assidue flagello excitandum aut uoce, ut uitium timore deponat.

De morbo



De morbo Regio. Caput .XLIX.

**S**I quod iumentum morbum regium habuerit, his agnoscitur signis: utriq; oculi uirides sunt, & ceruicem inclinatam habebit, dextra parte & pede dextro (etiā sinistro) uidebitur claudicare. Cuius curatio est ista: loco tenebroso, ubi lumen uidere non possit, clauditur, et operitur sagis ita, ne oculi eius aperiātur in die, oleo et uino tepido ungetur atq; fricabitur, lapides molares nō minus pondera quinq; in ignē imponuntur, animalis caput copulatur ad pedes, cum bene cāduerint, sub eius naribus apponuntur, perfusi oleo suffumigatur os, nares, & oculi, ut morbi uirus exudet. Quod per septem dies cōtinue est faciendum. Tali etiam ratione succurrimus: sanguine caprino et lacte ouillo, anagallico, costo, oleoq; pariter admixto portio conficitur, quæ per dies duodecim datur.

De bili, idest, coleribus. Caput .L.

**S**ed interdum biles, quæ colerae appellantur uulgo, solent iumenta uexare. Quæ passio his declaratur indicijis: cōmouetur ac uolutatur ut strophosus. Sanguinē de ceruice emittis: Daturus eiusmodi continuo potionem: herbae trixaginis nigrae uncia semis, mannae succari uncia unam, nitri uncias duas, altei uncias 2. uini optimi sextarium unum, conteres, ex aqua mulsa heminam unam per sinistram narem infundes.

De bili arida. Caput .LI.

**Q**uod si aridam bilem habuerit, myrtum agrestem cum uino contritam per narem dextram deffundis, pro hordeo far triticeū dabis. Potionem ipsam temperabis ex aqua.

De coli passione. Caput .LII.

**C**oli passio grauissimos cruciatus iumentis cōsuevit inferre, ita ut cardiaci aut strophosi esse credātur, sed his agnoscitur signis: Cū stat repente cōcidit ut arreptū putes, si satis suspensum fuerit dolor subsequitur, & iacet nōnunquā: cum frigidā aquā acceperit tremat, sudat, anhelat. Cui hac ratione succurritur. Anisi pontici uncia 1. petrosilini uncia 1. feniculi seminis unciam, piperis nigri uncias 2. marrubij uncia 1. abrotani unciam 1. anethi uncias 3. libistici 2. 4. centaurea minoris et maioris uncias 2. (cametris semiunciam) eupatoris 2. 4. gingiberis uncia semis, pulegij semiunciam



## ARTIS VETERINARIAE

ciā, rutæ unciā, apij unciā semis, pariter cōtūdes et cernes. tūc mellis optimi pōdera duo cocta et despumata cū oībus misces, ex quo medicamento ad magnitudinē nucis auellanae cū aquæ tepidæ sextario dilues, et per os infundes, *als (piperis)* certissima medicina est. Qd si dolor pseuerauerit, feniculi seminis cochlearia v. bene trita cū uino syncero sed cibario sextariū dabis. Præterea (panis) aliquantulū et pellicula de uentre pulli siccata in furno et trita cū uino dabis.

### De uomica. Caput .LIII.

**V**omica plerūq; animalibus nascūtur intrinsecus. Cuius passionis signa sunt ista: cū accubuerit difficile surgit, os ei grauitèr olebit, incūbet in eo loco à quo uexabitur, tuſſiet, et purulētū excreabit interdū. thuris uncias 2. aristologiæ uncias 2. in uno cū uino tepesfacto per nares digeres. Item sulphuris uiui uncias 2. aristologiæ unciā semis similiter dabis, cibo autē maxime sustētandū est ut habeat corporis nutrimentū, et cū rupit uomicam cauterijs circa pectus aduris, ut facilius prouocatus humor emanet.

### De coriagine. Caput LIIII.

**P**assio quā græci ecedermiā uocant, latini coriaginē appellant. Cuius ista sunt signa: macescit, et sine febre nō erit, coriū illius adhærebit costis, spina fit durior, in dorso eius nōnunq; furunculi exire cōsueuerūt, magis etiā quā adsueuerat appetit cibos. Cuius ista curatio est; thymū et sales cum uino rubro cōteris, et tubera, si qua in eo sunt, cōfricas. Parabis etiā aliā unctionē: picē, cerā, resinā cabialē, et thuris pollinē ex oleo ueteri temperabis ac decoques, totū animal cōfricando diutissime perūges. Sed parum est unctione corio mederi, nisi potionibus et intrinseca curentur; piperis albi triginta grana, myrrhæ semiunciā, uini odorati ueteris cotylā, olei uiridis cyathū unū admiscebis et per os digeres. Itē fasciculos rutæ uiridis atq; purgatæ opopanacis et cotylā uini et olei uiridis cyathum admisces et dabis in potu. Quod uitium ex perfrictionis iniuria, aut ex coactione alicuius necessitatis descendit. Aliquantis suis nō uetula sed nouellæ sanguinē uino permixto ad cornu faucibus digerunt, ignorantes si plus sanguinis fuerit cōtinuo animal interire. Cautius est hac magis potione curare: cepas germanas et semen rutæ pariter admisces, et deteris, ex quo uncias tres, cum uini cotyla per dies singulos dabis, ususurationibus quæ conueniunt roborosis.

De stomacho



## De stomachico. Caput LV.

**S**yntaxin animalia patiuntur & homines: quæ ualitudo his declaratur  
 Indicijs: cotidie tenuantur, et macie ossa eminet, multum manducantia esu-  
 riunt semper, quicquid inuenerit tentant fame cogente corrodere, durum stercus  
 emittunt, trahunt longam ac miserabilem uitam, ut nec surgere ualeant. Sed iacencia  
 fatigata, multumque manducantia fame moriuntur. Omnis enim esca quam sump-  
 serint ad stercus, & omnis potus conuertitur in urinam, nullus ex his succus,  
 nullum alimentum peruenit ad medullas. Propterea quod stomachus eorum ni-  
 mio rigore perstrictus, nec coquere poterit, nec epati aliquid propinare, in  
 quo tota uirtus ad nutriendum corpus per dispensationem ciborum sanguis  
 preparatur. Tabescit semper, iecurque eius minuitur ad similitudinem arboris,  
 quæ radicibus ex maiori parte præcisis, cum à paruis aliquandiu sustenta-  
 ta portauerit frondes, celeriter exarescit. Quorum manifesto periculo hac  
 ratione tentatur occurrere. Inter principia facies unctionem, ceræ libras duas,  
 resinæ terbentinæ libram, medullæ ceruinæ libram, axungie ueteris sine sa-  
 le libram, propulegij semilibram, irisillyricæ libram, samfuci libram, olei lauri  
 ni quantum satis fuerit, decoques carbonibus lentis, & ad ceroti molliciem  
 perlocabis, cui adhuc tepenti mîsces puluerem irisillyricæ & cretæ cimoleæ,  
 donec infrigescat agitabis. Ex quo medicamento totum iumentum perunges,  
 & multorum manibus confricabis, donec calefiat & sudet. Quod interposi-  
 to triduo conuenit fieri, ita ut coopertum animal sit, & cotidie paulatim exer-  
 ceatur, ut digerat. Cui hæc præparabitur potio: abrotani uncias 4. santoni-  
 ci uncias 4. trixaginis uncias 4. camepitos uncias 4. gentianæ uncias duas,  
 muri hæ uncias 2. opopanacis uncias 1. eiusdem radicis, succari semiuunciam, ru-  
 tæ aliquatulum, omnia bene trunais & cribras, ex quibus duo cochlearia in uino  
 ueteri decocta cum succo ptisanæ in qua (atro) decoctum est, admiscebis, adiun-  
 ges etiam erui pollinis cochlearia duo, quæ cum per nouem dies continuos dederis,  
 intermittis aliquandiu ut uires colligat, et resumat, et per singulos (periodos) alia hebdomada  
 alternis curabis. Nec cessabis donec sanitas redeat. Diebus autem uacuis of-  
 fas ex farina triticea in lacte conspersa ad substantiam digeris, fursures quoque  
 triticeos & paleas dabis, hordeum non dederis nisi fortassis infusum, dene-  
 gabis etiam herbam uiridem donec reparare coeperit corpus.

De ictérico



## ARTIS VETERINARIAE

### De Ictérico. Caput .LVI.

**I**cterici ista sunt signa: Oculi uirides, de quibus profluet lippitudo, ad similitudinem fabae indurefcit corium, fit horridum pilis, insequitur fatigatio, ambulans genibus claudicabit. His sanabitur medelis: Panacis syriatici et apij seminis singulas libras contundito atq; cribrato, & cum mellis attici libra misceto, tunc aquae, in qua lupini crudi fuerint decocti, sextario, ex medicamento superius descripto, quatuor cochlearia miscebis, & in potione dabis per dies v. Si tardius adiuuat, uini sextarios 3. in pultario nouo, canini stercoreis albi uncias tres admisceto, & ponito sub diuo, ex qua potione quinque diebus per os digeres. Praeterea aquam in qua ciceres decocti fuerint, & ster cus caninum simili ratione praebebis.

### De Stropho. Caput .LVII.

**S**trophus diuersae causae, & diuersae sunt curae. cuius ista sunt signa: Volutatur, patitur torsiones, ilia sibi respicit, stercus durum assellat, terram pedibus tundit dolore cogente, intermissis horis refrigerationē sentit & requiem. Hac potione curandū est: acori, anisi, opopanacis singulas libras pariter contundis & cernis, ex quo puluere duo cochlearia in uini ueteris sextario & olei pondo semis admisces, & tepidum per os dabis triduo. Si strophosus fuerit & non facit uentrem, caudā inter coxas suas mittet, & ad uentrem suum conuersus attendet. cui puluerem de semine rutae syluaticae cū uino per os dabis. Praeterea cepas decem ueteres, ficus siccae 8. nitri scrupulos 5. stercoris colūbini scrupulos 4. ex quibus addita urina collyria facies, & bina uel terna in anum immittes. Si uero fortius uenter induruit, conuenit adhibere clysterium, sed prius uentrem aqua calida perfouebis. Tunc succum (cantabricum) in quo fuerint bletae maluaeque decoctae, cum nitro & hemina olei, & columbini stercoris quatuor scrupulis, prouum constitues, & per anū inijcies iumento, ita ut post clysterem inambulet aliquantulū. Alij finum leporis cum nouem cochlearibus mellis, & quindecim granis piperis addito caulium succo per os salubriter defundunt.

### De dolore fecoris. Caput .LVIII.

**I**ecoris dolor solet infestare iumenta, cuius ista deprehēduntur indicia: Cibi fastidium, potus appetentia, uentris inflatio, macies. Cui primo cremorem ptio



ris ptisanæ sextariū .i. cū olei rosatij tribus cyathis per os digeres . Si passio permanet, alia potione curabitur. Apij seminis uncias 3. hyssopi uncias tres, abrotani uncia .i. olei uiridis quantū sufficit, uel succi paulominus. Si uiridē abnegat tempus, ex uino optimo ad tertias decoques, per aliquot dies potionē dabis. Similis quoq; huius passionis est ratio. Sine febre enim animal nō erit, nec facile cibū conficiet, testiculus dexter tumebit et indurescet, cui ista subuenit medicina: foenigræci cyathos quatuor mittis in aquæ fontanæ sextarios quatuor (.i. grana triginta) & decoques ad terciā partē. hemina per os data potione curabis. Nōnulli turis drachmas 2. tritas, cum uino quantum sufficit miscent, & inde totum corpus multorum perfricatur manibus, saccis cooperiunt ut sudet.

De inflatione uentris. Caput .LIX.

**I**Nflatio uentris interdū iumenta (sine dolore) conturbat. Cuius passionis ista sunt signa: testes eorū sudabunt, alternis pedibus terrā tundunt, subito inde alterna parte se cōuertūt, caput ad ilia sua ponūt tanquā qui locū doloris ostendāt, gemitus interdū & tremor totius corporis insequitur. Hunc paulatim deambulare facies, manum unctam in anum mittes, & stercus extrahes. deinde sale & melle mistis in anum infundes, ut assellandi augeat uoluntatem. Si hyems fuerit, oleo & pice liquida lumbos & auriculas illius saturabis, hanc daturus potionem: Laurum uiridem uel baccas ipsius, piper & cuminum, petrosilini & feniculi semen, semen agrij & nitri, quæ pariter admixta, tinsa & cribrata cum uino, & oleo tepido, & calidæ aquæ paruula portione potionabis, & deambulare compellis moderate, donec dolor cesset.

De intestini uexatione. Caput .LX.

**I**Ntestini quoq; uexatio, quod colon uocatur, & inflationes et dolores cōsuevit inferre. Quæ his agnoscitur signis. Cum ambulare cœperit, prioribus pedibus transuaricat & dolores subglutit, & crebras deambulationes & calores stabuli, si diligenter etiam operiatur diligere consuevit. Cui per nares suffundes laser & cyriacum in uino tepido solutum.

De tussi. Caput .LXI.

**F**Requēter omni genere deforme uilium, eo q̄ maximæ aīali ū parti accedit, tussis est



## ARTIS VETERINARIAE

dit, tuſſis eſt, quæ interdum ſponte deſinit, interdum medicamentorum rōne curatur, interdū inſanabilis penitus inuenitur. Difficultas aut curationis e=mergit, quia cauſæ ex quibus tuſſis euenerit, à medēlibus nec diſcernūtur, nec intelliguntur interdum. Quam paſſionē uniuerſis authoribus euolutis, quan=to crebrius accidit, tanto ſtudioſius credimus exponendam.

### De tuſſi quæ uenit ſi quid faucibus hæſerit. Ca. LXII.

**E**Xaſperatio, aut iniuria faucium grauiſſimam commouet tuſſim, quo= ties aut puluis, aut ariſta, aut os, aut ſurculus, aut lapillus, aut aliquid in hæſerit gutturi. Quæ res adeo periculosa eſt, ut niſi celeriter ſubue= niatur, aīalibus per impatientiā doloris inſaniā generet. In ſole igitur diligē= ter inſpicio, ſi quid hæſerit euellito. Ex tepida etiā, addito nitri puluere, inſu= ſa ſpongia ter gyo. Deinde oleo roſatio tepido cū lana obturato locū qui indi= gnationem ſuſtinet. Poſt diē teritiū lanam eiicies, eadē ex aqua calida ſoue= bis & tale medicamentum imponis: ſuccari 3 .4. aluminis colati 3 .1. ex tepido ui= no inſundis, & ſic exaſperata ſanabis.

### De tuſſi ex perfrictione. Caput .LXIII.

**E**X perfrictione quoq; naſcitur tuſſis. Cuius iſta ſunt ſigna: cum tuſſie= rit, caput deorſum mittit uſq; ad terram, & cū biberit, aqua ei per na= res currit. Quam hac ratione curabis: Machinam ori inſeres, manū planam inijcies, cōperies in parte ſuperiore quaſi ueſiculā, quam unguibus rumpis. Deinde tres pillulas bene cōtuſa axungia molliſſimas facies, quos in ſubtiliſſimo lomento, hoc eſt, farina fabacea, conuolues, & per os digeres. als (una auina  
nel brutillo) Deinde per tridū (uenaculo) & ſale perfricabis, & paſtillos cum ſpeciebus calidis & uino in potionibus dabis.

### De tuſſi à colibus. Caput .LXIII.

**T**uſſis à colibus ſi fuerit, his ſignis agnoſcitur: coles iniuriæ pleni ſunt ac tumbunt, dum bibunt continuo ruminant. Ouum in aceto acerri= mo mittis, reſolutaq; teſta, ita ut integra membrana permaneat, pice liquida perunges, & faucibus digeres. Poſt alumen, axungiam, ſalem in uino cōteres, offis facies, & ex melle deiicies, ita ut aqua calida, & ſi facultas ſup= peti, cum euſco decocta aſidue ſomentare non deſinas. Hanc quoq; potionē adijcies



adijces: myrrhæ uncias 2. piperis albi semiunciam, nuclei pini purgati sextarium semis, uuae passæ sextarium semis, mellis uncias tres, pastinacæ unciam unā, cariotæ uiridis selibrā, decoques pariter ex aqua, & addito uino tepido quinq; uel sex diebus potionare non desinas.

De tussi ab interioribus. Caput .LXV.

**A**B interioribus grauior & penè insanabilis tussis est, quæ hac ratione dinoscitur: nares iumentis præcludit, ut spiritum readere non possit, tunc illa ei inspicias, quæ si spissis pulsibus duxerit, scito esse tussim ex causa iecinoris, pulmonis, uel præcordiorum, uel (recentem) si lentis pulsibus illa duxerit & uentrem, indicat tussim de interioribus, hoc est, de his locis, in quibus intestina iumentorum ligantur, quorum tensione & iniuria cōpelluntur tussire. Nā si cursu nimio uel latiore saltu cōuexata illa fuerint hæc nascitur causa. Ex nimio quoq; æstu, uel intolerabili frigore interiora uitiantur, & faciunt tussicos. Vnde uulsi appellatur. Siue igitur ex superscriptis, siue ex alijs causis interioribus nata fuerint uulnera, etiā si post sanitatē duxerint cicatrices, strictius tamen cōtrahendo se et asperitatē faciūt, & assidua titillatiōe ppetuā excitāt tussim. Quæ causæ lenissimis medicamentis adiuuari uel suspēdi aliquatenus possunt, p̄sanari omnino nō possūt. Hinc est quod in herba uiridi uel pascuis uulforū uitia celātur. Sed omni tpe hæc cōpositio est salutaris: fœnigræci heminā, seminis lini heminā, traganti unciam 1. thuris masculi unciam 1. myrrhæ un. 1. succari, erui pollinis añ unciam 1. tunsa et cribrata in calida infusa permaneant, altera die ex aqua tepida singulas cotylas dabis ad cornu, cyathis olei rosati permixto, per plurimos dies. Ex qua cōpositione recens causa sanabitur, uetus sentiet leuamētum. Ad quæ uitia nunquam dederis austeriorem potionem, ne exasperet & decidat: sed leuem & simplicem, & refrigeratorem. Cauendum etiam est ne in tali passione unquam sanguinem detrahas. Plærunque tracanton ex oleo debere dari per biduum, Tertio dei decoctus raphanos atque contusos propinare cum uino, refrigeratorium pastillum addentes in æstate. Ad tussim diuersæ sunt potiones, quas proprie omnes inserere necessarium duximus, ut pro qualitate passionū, medentis arbitrio remedia cōmodentur: Farinæ fabæ frictæ sextarios 2. infundis in passi sextarijs 3. et in mortario diutissime cōteres. piperis triti grana triginta, sepi hircini libras 3. pariter amisces & omnia



## ARTIS VETERINARIAE

tusa & cribrata per os ad cornu per triduum dabis. Nonnulli uero duobus sextarijs, cōditi fabae frixae heminā ante triduum fundūt, post deterūt diligenter, & aequatis partibus per triduum digerunt. Alijs placet farinae fabaceae sextarium unū, tribus sextarijs, uini ueteris infundere, additaq; olei optimi libra pariter deterere, ac dare per cornu. Si tuſſis ex ruptura uel uulſione prouenerit, anagallicum primo tundes, post herbam paritariam pro duabus partibus teneram admisceſ, adiunctaq; axungia ueteri conteres diligenter, & palis (experta) stillos facies, quos impari numero & imparibus diebus cum resolutio butyro ac melle diffundes. Ad leuem tuſſim uiatoria sunt (expeditaq;) remedia, porros decoquere, & cum herba paretaria bene tonsa miscere, factisq; pastillis in ouo resolutis & oleo roseo, necnon & passo & melle conuoluere per triduum deijcere, succū ipsius iuris in quo decocti sunt porri, insuper dare per cornu. Itē laser. i. opiū syrenicū ad magnitudinē fabae, cū uino ueteri deteres et p cornu dabis. Tuſſi et grauedini capitis medebitur oleum roseū uel certe simplex & uiride cum aqua calida per narē dextrum per triduum diffusum.

### De uulſis. Caput. LXVI.

**V**ulſis glutinare creditur, si draganti uncias 2. pridie infundas in calida, foeni quoq; greci heminā, lini seminis heminā, separatim infundas, die postero in cacabo decoquas & pariter teras, post medullae ceruinæ uncias 2 sepi hircini librā, radicis tracontiae uncia 1. gentianae uncia 1. centaureae uncia 1. sepi taurini uncia 1. cōtundes, & illis quae prius parata sunt addas; quae oīa in mortariū mittes, & diutissime cōteres. Ad ultimū passi sextarios tres & aquā in qua foenigrecū uel semen lini fuerat infusum adijcies & decoques, ac per triduum ad cornu dabis. Grauitur tuſſientes & uulsi hac potioe recreantur: De masculo pinguis porcinus acro decoquitur, donec omnis caro soluat, abiectisq; ossibus uniuersis cū iure quo deferbuerāt & tribus sextarijs (passi) succidi: Deinde rursus in cacabū mittis glutis taurini semiuncia, aceti acerrimi hemina dimidia cōiungitur et feruet ut quilon fiat, draganti uncias 3. lini seminis et foenigraci unciae singulae decoquuntur extrinsecus et teruntur: adiūges etiam medullae ceruinæ et sepi hircini uncias 3. quae ad ultimū cū omnia pariter calefacta fuerint & colata, facies potionē, ex qua per cornu dabis animalibus diebus septem, aut nouem curaturus, aut tepefactam digeras ut inspissentur, adiecto passo & aquae illius copia in  
quae



qua cocta sunt semina. Præterea aliquāti caput agninum tam diu decoquūt, donec omnis cōpago soluatur, abiectisq; ossibus terunt, adiectoq; ad ius ipsius melle, diebus septē ad cornu digerunt. Quod si tussis ex faucibus ueniat, myrrhæ uncias 3. cardamomi uncia 1. nuclei sextariū, uuæ passæ sextariū, deteres diligenter, additoq; melle agitando lentis carbonibus decoques, cum intepuerit, pastillos ad nucis magnitudinem facies, quos ternos cum butyro diebus quinq; uel septem digeres. Item si ex faucibus causa est, occisum pullum palpitantem aperies, & tollis eius uentriculum, quē cum suo stercore calenter, & integrum in melle conuolues, & per cānalē digeres. certissimū ac uerum remedium est. Si exasperatio gutteris mouerit tussim, murrhæ uncias 2. piperis uncias 2. seminis lini frixi & contusi sextarium, cardamomi semiunciam, uuæ passæ sextariū, nuclei sextariū, mellis pondo duo, diligenter trita cōmifces ac decoquis, pastillos ad nucis magnitudinē facies, ternos in die digeres.

### De tussi quæ generat̃ ex humoris acerbitate. Ca. LXVII.

**T**USSI quæ ex acerbitate humorum prouenit, tali ratione succurritur: In primis purgandum est corpus tussientis. Cucumerem itaq; syluaticum uel radices eius cum nitro Alexandrino conteres, adiunctoq; uino uetere per os dabis ad cornu. Quæ potio cum laxauerit uentrem, post diē tertium squillæ ualidioris 3 quatuor contundes, & optimi laseris quantum fabæ patitur magnitudo commifces, uiniq; odorati sextarium, & olei ueteris librā addis, & cum diligenter omnia cribraueris, triduo per os defundes ad cornu. Item alia. Istis quoq; suffumentis nō minus quā potiōibus adiuuabis: Sandarici uncias 3. asphalti uncias 3. allij & ceparum uncias 3. quæ cum pariter triueris, in tres partes equaliter diuides, & per triduum cooperto ori uel capiti subiectis carbonibus suffumiges, ut odor impleat nares. cuius tamē oculos prius ligabis ne medicamenti acerbitate ledantur. Herba quoq; marrubij fasciculum quā magnum uolueris deteres, et cum ouo & uino succido admifces, addita adipe ceruina, uel si defuerit, uerbenaceam cum cera resoluis, & cum tepida ad cornu digeris. Grauiſſimæ subuenit tussi si pillulas cypressi decoquas, & purges diligenter, addita axungia, & argallico, & folijs tenebrioribus herba paritarie, cōtundas in pila, et pastillos ad nucis magnitudinē facias, quos quotidie impares cum melle & oleo et uino passo, ouis intinctos deijcies. Si placet pro pillulis etiam folia cypressi cōtusa miscere cum omni-



## ARTIS VETERINARIAE

bus suprascriptis poteris, pici s liq d e facere potionē, et dare p cornu. Ad oēs  
tusses talē dedere pleriq; potionē; draganti, myrrhæ, spicæ nardi añ uncia 1.  
detriuere sollerter, et cū duobus sextarijs passi per triduum diffudere.

### Ad tussim siccam, uel suspirium. Ca. LXVIII.

**A**D arteriam exasperatam, et ad spasmū: hyssopi librā, scenigræci se-  
librā, seminis lini, tracanti, anagallici, rutæ uiridis singulas selibras,  
salis heminam dimidiam conteres, et usq; ad tertiam decoques cum  
passo, tussienti per triduū, uulso per nouem dies dabis. Alij petroselini mace-  
donici unciam 1. semis, dauci unciam 1, myrrhæ, spicæ nardi, costi, tracanti,  
singlas uncias, prius in mulla tepida diffusas, acori, pipis, succari añ uncia 1.  
guttæ armeniacæ uncias 2 castiæ uncia 1, pariter deterunt, pastillos ex mul-  
sa faciunt, post cū passo deiiciunt tediāti. Ad tussim ueterē, et ad suspiriū, ul-  
anhelitū, et ad synanchen, Si mox dederis storacis rubæ uncias 3. murrhæ  
trogloditis uncias 2. opopanacis unc. 2. irisillyricæ uncias 2. galbani unc. 2.  
resinæ terbentinæ uncias 3 herbæ simponiacæ uncia 1. pariter commisces et  
deteris, pastillos facies cū melle. Præterea axungie librā semis, caricæ quæ-  
als (raueam) decim (pineam) combustā, et in puluerem redactā, liquaminis optimi hemi-  
nam, mellis librā cum cauliculis excoctis, offas faciūt et cum passo digerūt.  
Aliquanti hederæ folia, itē populi albi folia, æquo pondere deterūt, et cū uino  
albo per nares defundunt. Alij rutæ folia cū melle deterūt, et cū uino optimo  
p nares defundūt Alia. Cucumeris syluatici folia foeno miscēt, radicēq; ipsius  
contundūt, et cū lini semine et hordeo cōmixta offerunt. Experimēto pro-  
batū est tussim suspiriūq; sanare. Alia. Sulphur uiuū et rosmarinū cū melle  
et uino ueteri per sinistram narē digeris. Aliquanti panacis radicē detritam  
cū uini optimi hemina, et tribus cyathis olei, per cauernas naris sinistræ in-  
fundunt. Præterea rosmarini 3. myrrhæ scrupulos 2. cū uini ueteris sexta-  
rio, olei hemina, per nares triduo defundūt, ita ut in die detur hemina. Aneti  
acetabulum, irisillyricæ acetabulū, rutæ scrupulū 1. olei heminā dimidiā per  
os digerūt. Suspirium quoq; ac tussim releuat, si radicis mori scrup. 1. herbæ  
heliotropij uncias 3. diligenter cōteras, et cū hemina uini candidi per os de-  
fundas. Recens quoq; tussis expimēto curationis sedatur. Lentis sextariū se-  
mis emolis, farināq; molliissimā facies, ex qua singulas heminas cum singulis  
heminis aquæ per os per triduū digeres. Vetus aut tussis aboleri creditur, si  
cyathis



cyathos tres ex succo porri cum hemina olei pluribus diebus per fauces de-  
fundis. Tussientes ac uulsi hac potione curantur: panacis radicis uncias 2. sul-  
phuris uiui uncia 1. thuris masculi uncias 2. myrrhæ trigloditis uncia 1. com-  
mixta in puluerem rediges, ex quo duo cochlearia cū duobus ouis, addita ui-  
ni ueteris hemina, diebus quinque uel septē per os dabis. Expertū dicitur, ulmi  
cinerem leuissimū. i. fauillā aqua tepenti pmiscere, & olei boni equā mēsurā  
addere, iunctisq; tribus ouis, diebus quot uolueris dare per fauces.

Ad uomicam & tussim. Caput .LXIX.

**V**Alidissima contra tussim & uomicas compositio est: succi marrubij  
expressi heminam, caricis siccas xxv. mellis attici uel cymini sexta-  
riū semis, in olla noua ad mediū decoques, post myrrhæ trogloditis  
uncias 2. dauci uncia 1. cassiæ fistulæ uncia semis, cinnami semiunc. thuris mas-  
culi uncia, aristologie uncias 2. opopanacis uncia, irisillyricæ uncia semis, ra-  
dicis panacis uncia, uniuersa cōterito atq; cribrato, & supra medicamēto in  
quo mel et ficus coxeris mittito, et studiose agitans feruere facito paulatim car-  
bonibus lentis, post in pixidē plūbeam uel ligneā cōdito, ex qua bina cochlea-  
ria cū hemina uini p os quotidie digeres. Vulsis uel tussientibus prodest singu-  
los sextarios lentis, fœnigræci, & lini seminis frigere separatim ei puluerem  
facere, et de singulis speciebus singula cochlearia cū succo anagallici, et succo  
plantagnis quantum uolueris addito uino per os dare.

Diuersæ potiones uulforū & tussientiū. Cap. LXX.

**V**T diuersæ causæ sunt, ita et difficiles curæ. Quapropter studiose quæ  
expimētis nostris uel aliorū p̄bata cognouimus intimamus. Ad unū  
itaq; aīal talis potio præpatur: fabæ frixæ sextariū sine sale cū aqua  
decoqs quēadmodū hoībus cōsueuit apponi. præterea fœnigræci sextarium  
sepatim mittis in cacabū, et cū feruere cōpit primā aquā fundes, post addis  
aquæ sextar. v. caricis xx. liqritiæ unc. 2. tantū ferueat donec 4. sextarii re-  
maneāt, tūc fabā istā coctā, et fœnigræcū, cū caricis uel liqritia in mortario  
diligēter deteris, addis insup butyri, sepi hircini añ unc. 2. ad calorē diligēter  
resoluitas. q̄ cū oīa miscueris, addito iure in quo fœnigræ. decoxeris tepesacta  
p cornu plus q̄ singlas hemias diebus singlis faucibus digeris. q̄ si spissiorē ui-  
deris potionē, tantū passi addis ut possit p cornu exire. Barbarorū usus ad-  
uersus tussim inue-



## ARTIS VETERINARIAE

Inuenit salutare remedium. Radicē herbae, cui nomē est enula, quā cāpanam pleriq; appellant, colliges, in umbra siccabis, postea deteres, in puluerem rediges, ex quo terna maiora cochlearia in singulos sextarios uini ueteris pridie infundis, & cum bene agitaueris claudes, ne odor herbae salutaris exhalet, per os triduo, uel quot uolueris diebus digeres. Item alia. Lentis alexandrinae, foenigraci, lini seminis heminas singulas decoquis, addisq; ei traganti unciam semis, pridie in tepida infundis, & anagallici uncias 3. diligentissime resolutas, quae cum omnia in mortario triueris, in cacabo nouo cū tribus aquae sextarijs decoqs, exinde tertiā partē cum sextario passi tepidū per os dabis triduo. continuo sanare creditur uulsos. Si iumentum ex uulneribus faucium tussis urgebit, irisillyricae unciam 1. piperis nigri semiunciam, succari 3. 1. myrrhae troglitis semiunciam, thuris pollinis semiunciam, traganti prius infusi & triti unciam 1. oua quinque cum passi sextario cōmises, & triduo per fauces digeris ad cornu. Post mel, butyrum, axungiam, salem & piculam cōmises, offas facies, & in passo intinctas digeras. Si ab internis tussierit, succi ptisanae hemina, defruti cyathū misces, & per triduū dabis. Si grauius tussierit animal, fabae frixae & coctae sextariū, seui hircini uncias 3. alij capita tria pariter decoquis, & in mortario deteris, & cum passo dabis. Curat aut uulsos & ruptos, foenigraci sextariū 1. cum xx. caricis fasciculo apij, & fasciculo rutae in aqua ad mediū decoquis, ita ut postmodum traganti resoluti uncias tres, & anagallici contusi uncias 3. alij tres addantur, & oīa cōterantur, offulisq; ad nucis magnitudinē factis, ternae, quinae, septenae p triduū digerūtur

### De Scabie. Caput .LXXI.

**S**cabies iumentis deformē passionē, et interdum periculum generat. Cōtagiosa nanq; est, et transit in plures. Cui nascenti medicamentis nō oportet occurrere, ne praclusa cute in uisceribus residens cōuertatur in morbum. Sed ut eruperit foras, primo purgatio uentris adhibetur, si puluerē ex radice cucumeris syluatici cum uino faucibus aīalis infundis, uel certe si radicem cōcisam copiose cum hordeo subministras. Quod cum ex ratione processerit, interposito triduo, aliquātulum sanguinis, si caput et collum scabies infestat, de ceruice detrahes. Si uero scapuli uel armi aut pectus in causa est, de brachiolis sanguis emittitur. Cum spinā, uel lumbos, aut coxas pabulis aestuans contagio peruasit, de femorū uenis sanguis emittitur, Asphaltum, Sulphur



Sulphur uiuū, picem liquidam in butyrum æquis pōderibus pariter deteris, & in sole diutissime cōfricans totū iumentū corpus perungis, aceti acris sextariū, piculæ uncias 4. cedrinæ unc. 4. pariter decoquis, scabiosum aīal ex lotio humano et calida permixta diligentissime perfricaturus, tunc penicillo infuste ligato medicamentū inducis in sole, asphaltū et sulfur æqualiter conteris addita adipe porcina, & olei ueteris tantundē, quæ cū decoxeris, perunges in sole. Adipis librā, sulphuris uiui uncias 2. bituminis uncia 1. olei selibrā, picis liquidæ cyathos 2. omnia conteris & decoquis, & perungis sicut supra scriptum est. Lotij ueteris humani fecis 3. 4. stercoris ouilli selibrā, olei heminam, sulphuris uiui uncias 3. picis liquidæ cyathos 3. oīa contere & decoque & in sole calido animal semel in die perunge. Bituminis pondo duo, sulphuris uiui selibrā, ceræ librā, mānæ thuris selibrā cōmises in oleo in quo prius fasciculus aricuse decoctus est, & perungis in sole. Alia. si minus habeat integras uires, Ranas in aqua decoquis, unctamq; earū colligis, & cum polline lenticulæ, adipe et oleo permises, tepefacto perungis. Itē alia. cucumeris syluatici radices lauas & tundis in cacabo nouo cum oleo quātum sufficit decoquis et uteris. Sulphur quoq; cū uino decoctū similiter iuuat. Si uetustate scabies occalluit, prius obradenda ferro uel testis ad uiuū est, insuper humano lotio cū aqua marina uel salsa mixto confricandum est, post sulphuris, bituminis, picis liquidæ, axungie ueteris, sepi caprini, ceræ, aluminis spissi singulas libras contūdis, mises, & decoquis, & sic aīal perungis in sole. Folia de rodedafnes cum oleo uetere decoques, addita pice liquida, & aceto, et cera, certum est de experimento remedium. Memineris tamen in omni unctione, contra pilum iumentum in sole diutissime confricandum.

Si animal fœno malo lædatur. Caput .LXXII.

**V**iciatum aliquoties uel modicum fœnū ad similitudinem ueneni aīalibus nocet, quorum ista sunt signa: Oculos habebunt uagos & semper micantes, ipse gradus eorū erit incertus. His de matrice auferendus est sanguis, de brachiolis flebotomandi sunt, & potionandi ita, Caricis in uino odorato decoctis, rursum detritis, abstincendi ab hordeo & fœno. dandæ etiam duriticiæ potiones.

Si hordeo malo lædatur. Caput .LXXIII.

**S**imili obseruatione curatur, quæ nimio hordeo aut malo læduntur. Sed

Q hæc etiam



## ARTIS VETERINARIAE

hæc etiam in aqua frigida aduersus torrentem diutissime detinentur. Vtriq; remedium est, pelliculam de uentre pulli siccata fumo deterere, additisq; octo scrupulis piperis, et quatuor cochlearibus mellis, et uncia pollinis ex thure, cum sextario uini ueteris tepesfacto per os dare.

### Ad Fascinum. Caput .LXXIIII.

**F**ascinatum animal triste est, grauatur incessu, macescit, et nisi subuenere incidet in morbum. Bituminis igitur et sulphuris parū cū granis lauri ex aqua defundis per nares. Præterea coriandrū uel semē ipsius cū sulphure et teda carbonibus circūferes, ex aqua feruenti animal consperges suffumigabis. Vniuersis quadrupedibus remediū præstat ista suffumigatio, curat atq; morbis resistit.

### Remedium contra omnes morbos. Ca. LXXV.

**A**dversus uniuersas infirmitates et morbos equorū uel boū, ubi primū cœperint egrotare potio ista succurrit: Radix scyllæ, radices populi, quæ græce appellatur rhamnos (nā est fuscior et nubellula) et sales cōmunes quātū sufficit mittes in aquā, eāq; aīalibus usq; ad sanitatē dabis in potu. Quod si desperatas uoletudines præoccupare uolueris, ne unq; accidat aīalibus tuis, incipiēte uere hāc illis præparabis potionem, et per xiiij dies continuos dabis in potu.

### Si aīal lædatur cū accipit potionē. Cap. LXXVI.

**O**stenlendū aut est potiōes ipsas oportere curatione defundi. Siq; dem als (salent) frequēter euenit, ut dū aīalia potionātur tuſſiant (sudēt) grauiter, et tremorē musculorū oīm patiantur, follientes, et submisso capite se sustinere uix possunt. Qd accidit si quando per imperitiā artis dantis, potio in arterias et spirituales partes pulmonis resilierit. unde fit et piculū præsens. Quare obseruandū est ne tuſſienti iumēto et pendentī adijcias potionē, sed statim eū soluas, paululūq; deambulet, et magis ei alia potione subuenias: aqua tepide oleū rosatū cōmiscēs et agitas, et per os sæpius dabis. Pusca quoq; puleiata nares eius fouebis, et emendabitur culpa. Obseruandū quoq; est, ut subtracto hordeo, et negato potu digerit animal potiones.

### Si aīal mordeatur à uenenatis bestiolis, Ca. LXXVII.

Plerunq;



**P**lerumq; à nociuis aīalibus. i. à colubris, scorpīs, sphalangīs, & muribus cecis aīalia feriuntur, & in periculū ueniunt. Cuius ista sunt signa: fastidium ciborū, pedes trahuntur, & cū producuntur succubunt ad singulos gressus, per nares defluet sanies, grauedo nascitur capitis, ita ut deiciatur ad terrā, ad surgendum uel incedendū deficiūt corporis uires. Generaliter curatio ista succurrit: Locus qui percussus est ante oīa fumigandus est succensis testis ouorū gallinæ, quæ prius infundes in aceto, addito etiā cornu ceruino uel galbano. Post fomentū loca ipsa scarificabis, & sanguinē ex his emittis, Vel certe candenti ferro comburis loca uenenata quæ pestis attigit. Obseruare autē debes, ne aut supra articulos aut neruosis in locis in quacūq; passione unquam cauterium imponas. Aduſtis enim neruis uel articulis, perpetua debilitas consequetur. Sed diligenter considera, ut aut superius aut inferius pusillum quān nerui aut articuli sunt, cū necessitas fuerit, apponas cauteria. Animal autē quod uenenata bestiola tetigerit expedit ut sudet, et calidis coopertorijs inuolutū deambulet, & farinā hordeaceā in cibo sumat, additis frondibus fraxineis & uitibus albis. (credo) In plaga autē mel atticum uel cuminū in uino ueteri mixtum calefactū oportet imponi. Nōnulli stercus suillum recens & mel atticū cum uino miscent, et calefactum quasi cataplasma inducunt, addentes urinam humanam.

Si bustrepem aīal comederit in fœno. Ca. LXXVIII.

**E**quus si bustrepē comederit in fœno uel in pabulo, hæc signa statim sequuntur: Venter ei inflatur, à cibis resilit, & stercora minutatim et frequenter reddit: qui statim sternendus est, et cogendus ad cursum. Post ei uena tangenda est de palato leuiter, ut sanguinē suū defluentē transglutiat, assidue deambulet, triticum cum passo infusum & porros adferes ad cibandum. Vinum autem tepesactum cum uua passa diligenter contritum ad cornu dabis eidem in potu.

Si uipera animal percusserit. Cap. LXXIX.

**V**ipera si momorderit iumentum, ex morsu eius pus confucit exire. Nam si prægnaſ erit, totum rūpitur corpus. Ad morsum tamen uiperæ, uel sphalāgij, aut muris aranei, cōe remediū est, terrā formicarum cū uino miscere et dare per fauces: Vel certe de ipsa terra frequētissime



## ARTIS VETERINARIAE

uulnū cōfricare. Ad quas causas etiā terra talparū creditur posse prodesse. Quod si in itinere aut in locis ubi desit copia fumētorū neceſſitas ipsa contingit, piperis grana. xxx cum sextario uini ueteris tepifac̃to faucibus digerēs, & herbam thymū tritam cum uino si dederis prodesse creditur. Morsus uiperæ uel cuiuscunq; serpētis ostenditur, si humor putidus de plaga incipit currere. Præſens remedium est, si hedum uel gallum uel agnum in recenti occideris, & calentes pulmones eius cum sanguine, uel corde, uel iecore uulneri apposueris, diligenterq; constrinxeris ut omne uirus educat. daturus continuo potionem: acori pontici semiunciam tritā cum uini ueteris sextario, salis triti heminā pariter misces, & tepesac̃tum faucibus digeris. Si perseuerat tumor, uitem albam syluestrem copiose comburito, et ex cineribus eius lixiuū facito, & in potionem triduo ad unum sextariū dato. Cinerem quoq; ipsum cū aceto in modū cataplasmat̃is uulneri imposito. Si nihil profecerit, cauterijs urito, uſq; solenniter curato. Farinam quoq; hordeaceam cū uino & sale, oleoq; decoctam in cicatricem oportet imponi.

### Si araneum comederit. Caput .LXXX.

**I**umentum si in pabulo araneum comederit, hæc erunt signa: Totum corpus tumebit, sed circa auriculas, & oculos, & nares inflatio cū indignatione maior apparet, cui hac ratioe subuenis: De palato sanguinem tollas, eumq; exceptū cū sextario aceti & hemina salis miscebis, et circa plagā uel loca tumētia punges, diligēterq; operies ut sudet. hac rōne sanabitur.

### Si sphalangius percusserit. Caput .LXXXI.

**S**i sphalangius iumentum percusserit, his apparebit indicijs: Stat ei uentreum præ dolore, & uidebis uelle mingere, cui ista ratioe subuenies: piperis unciam i. piretri unciam, uuæ syluaticæ unciam, terito, & cum uino ueteri per fauces dato.

### De mure araneo. Caput .LXXXII.

**M**us araneus pestis uenenata, & tam equis quàm bobus noxia, atq; ideo cum captus fuerit mersus necabitur in oleo, ibiq; in putredinē uertitur, ex quo medicamento cum animal mordetur, plaga linitur, & curatur animal. Vel si inuentus non fuerit, cuminum tritū cum pice liquida.



quida axungiaq; miscetur, ad spissitudinē malagmatis coquitur, impositūq; à periculo liberat & sanat. Quod si in suppurationē fuerit plaga conuersa, lamina ferrea candenti aperiēda est, & quicquid uitiosum est inurendū, atq; ita pice liquida uel oleo curādum. Ne aut mus araneus aīal mordeat, ipsum animal uiuū de creta circundabitur, quæ cum indurauerit, suspēditur in col lum, & non contingetur à morſu. certissimum est. Aduersus morſum com= probatur, allium tritum cum nitro, & si nitrū defuerit, cum sale et cymino permiscere, atq; ex eo puluere loca, quæ morſu contacta sunt, cōfricare. Qd si eruperint uulnera uenenata, hordeum combustū in puluerem rediges, & diluto aceto uulneri inspergis, & hac ratione sola curabis. daturus potionē, pollinem tritici, hordeū, cedriam, & uini sextariū per fauces digeres. Quod si prægnaus mus araneus fuerit qui percusserit, his agnoscitur signis: Pustu le per totum corpus exeunt, sed simili, ut supra scriptū est, ratione curabitur.

#### Ad ictum scorpionis. Caput . LXXXIII.

**S** Corpius si iumentum percusserit, his agnoscitur signis: Genua cotra= huntur, claudicat, non manducat, de naribus fluent pituitæ uirides, ut accumbit uix resurget. Simili ratione curatur sicut serpētis ac uiperæ morſus: ster cus tamen asininū uelocius in plagam oportet imponi.

#### De morſu canis rabidi. Cap. LXXXIII.

**C** Anis rabiosi morſus & iumentis, & hominibus exitium inferre con= suevit, usq; eo ut ipsi qui contacti fuerint hydrophobos faciat, & con= uertat in rabiem: qui hac ratione curatur: Locus qui morſus est, fer= reis, uel quod utilius est, cuprinis cauterijs urito, in loco tenebroso eum cōsti tuito. Sic etiam eum adligabis in tenebris ne quicquam uideat. Quod si canē ipsum occidere poteris, iecur eius decoctum dabis ad manducandum, uel de= tritum faucibus digeres. Fœni quoq; flores combures, & cum axūgia ueteri deteres, & ad morſum appones, salutare remedium est. Sed specialiter pro= dest, si radicē cynorhodon, id est, herbæ quæ appellatur rosa canina, effode= ris, & lotam prius atq; cōtusam diligenter, siue homini siue animali, quod ra biosus canis momorderit, in plaga apposueris, contritamq; cum uino ueteri propinaueris quotidie ad bibēdum. Hac enim sola ratione nec hydrophobus fiet, & imminens crimen euadet. Canis rabidi morſibus subuenit, si tres ani



### ARTIS VETERIN. VEGETII LIBER III.

tri, iudaici bituminis scrupulum unū tritum cum hemina uini ueteris tepentis triduo per os digerat. Samsuci quoq; grana uel succū de folijs aut de cortice exprimes, & cum uino ueteri dabis in potu. Sed tunc efficax est hæc potio, si de eo samsuco dederis, quæ nō in terra, sed in alia arbore fuerit innata.

#### Si stercus gallinæ animal comederit. Ca. LXXXV.

**S**i finum gallinarum animal in hordeo comederit, uel fœno sumpserit, quasi à uenenatis bestiis percussū cruciatur continuo, internorum dolor & inflatio subsequitur, ad similitudinem quoq; strophii et uolutio ac tuſsis asperrima. Aduersus quā necessitatem, apij seminis deteris uncias 2. & cum uini ueteris sextario, & hemina mellis temperas, & per os defundis, & tam diu deambulare cōpelles, donec potio uentrem moueat. Quod si nimius dolor etiam obrobatio fuerit subsecuta, baccarū lauri librā, nitri selenitram, aceti sextarios duos, olei sextariū, diligenter trita permisces, & ad focum calefacies, & in loco calido per triduum unges, & contra pilum diligenter fricabis, certissimū daturus ex sudore remedium. Aduersus huiusmodi casum physicū remedium experimenta docuerunt; Pullum si occideris uel gallinam, uentremq; eius crudum & adhuc calentem cum stercore suo equo uel mulo inuolutum melle digerere per fauces, optimum creditur. Tres pillulas gipsi cum uino ueteri deterere, & tepidum per os dare, eadem optime sanare firmatur. Lixiuum quoq; de arbore ulmi, uel cuiuscūq; generis ligni cinerem, dummodo bene cretum, cum oleo miscere, ac liquidum & tepidū defundere per fauces, physicū & salutare laudatur.

### FINIS LIBRI TERTII.



# VEGETII RENA

TI ASTIS VETERINARIAE LI.

BER QVARTVS.

DE NVMERO ET POSITIONE  
ossium. Caput primum.



**I**N VMENTVM IGITVR HABET  
in capite ossa duo, à fronte usq; ad nares alia duo, ma-  
xillaria inferiora duo, dentes quadraginta. i. molares  
xxiiij. caninos viij. rapaces xij. In ceruice autem sunt  
spondili viij. spatulae renū sunt octo. à renibus usq; ad  
anum septem, muscarium habet commissuras duode-  
cim. In armis prioribus sunt ragulae duae. Ab armis  
usque ad brachiola duo. A' brachiolis usq; ad genua duo. In genibus parasta-  
ticae duae. à tibia usque ad articulos duo, bases quae appellantur numero duae,  
usq; ad pumices ungulae ossa minuta sedecim, in pectore unum, Costae tamen  
in interioribus triginta sex. Item à posterioribus à (cumulari) usq; ad mola-  
ria duo, à molaribus usque ad uertebras duo, costales duo. Ab acrocolesio  
usque ad gambam duo, à gamba usq; ad cirros tibiales duo, minuta usque ad  
ungulas sedecim. Et sunt ossa omnia centum septuaginta. als (columellari)

De numero & qualitate membrorum. Ca. II.

**N**unc mensuras numerūq; membrorū oportet exponi. In palato gra-  
lus sunt xij. longitudo linguae habet pedem semis, labrū superius ha-  
bet uncias sex, inferius uncias quinq; maxilla singulae uncias denas,  
à cirro frontis ad nares habet pedē, auriculae singulae cōtinent uncias senas.  
In oculis aut singulis unciae quaternae. à cirro ubi desinit ceruix usq; ad mer-  
curium continetur calculi octo, Spina continet subter spatulas triginti duas, à  
commissura renū (quod cumulare dicitur) usq; ad imū muscariū cōmissurae  
sunt xij. Sagulae longicia uncias xij. ab armis usq; ad brachiolū uncias vi. à  
brachiolis



## ARTIS VETERINARIAE

brachiolis usq; ad genua longitudo cōtinet pedem. Ab articulis usq; ad ungulas uncias 4. In longitudinem uel prolixitatem pedes sex. Hæc cumetria equi conuenit staturæ honestæ ac mediæ. Cæterum non dubitatur in buricis minora ista, & in primæ formæ equis esse maiora.

### De numero & qualitate neruorum. Cap. III.

**N**eruum quoq; numerus, qualitas, ac mensura pandenda est. A' medijs naribus per caput, ceruicem, ac mediam spinam, usq; ad anum muscarium descendit filum duplex, quod continet pedes duodecim. Duo nerui in ceruice palmarij continent pedes quatuor. Ab armis usq; ad geniculū nerui duo. à geniculo usq; ad basim uerui quatuor. In prioribus sunt nerui decem, in posterioribus decē. A' renibus usque ad testes nerui quatuor. fiunt in se omnes nerui trigintaquatuor.

### De qualitate uenarum. Caput .IIII.

**C**onsequenter uenarum quoq; indicandus est numerus. In palato uenæ sunt duæ, suboculares duæ, in pectore duæ, de brachiolis duæ, de subcirris quatuor, de talis duæ, de coronis quatuor, de feminibus quatuor, de femoribus uero duæ, de subgambis duæ, de muscario una, uenæ matricis in ceruicibus duæ. fiunt pariter uenæ xxix.

### De indiçijs & ætate equorum. Cap. V.

**A**etatem iumentorum ex dentibus alijsq; signis oportet agnosci, ne uel lamentis imperitiæ subeamus incōmodum, uel curantes egrotantis ignoremus ætatem. Quia sicut hominibus, ita & equis, aliud conuenit, cum iumenta sunt feruida, aliud cum senectute iam frigida. Manifestum est autem notas corporis cum ætate mutari. Pullis enim bimis & sex mensiū medijs dentes superiores cadunt, quos lactantes uocant. Cum aut quartū annum agere cœperint, deciditibus his qui canini appellātur, alios supponēt. Deinde intra sextum annū molares cadunt. Sexto anno quos primo mutauit exæquat. Septimo omnes explentur æqualiter, & ex eo cauatos habere incipiunt dētes, nec postea quot annorum sint scire ad fidē nullus potest, nisi signis alijs, quæ usus edocuit. Decimo nanq; anno tempora cauari incipiūt, & supercilia nonnunquā canescere. Duodecimo anno nigredo in medietate dentium



dentium apparet. Pleriq; adserunt, domitis et freno assuetis animalibus rugas, quæ in labris sunt superioribus computandas, ita ut ab angulo ubi coeperit morsus incipientes, usq; ad extremū labrum perueniamus. quia annorū numerū, rugarum ostendit. Postremo, rugarum multitudine, tristitia frontis, deiectione ceruicis, pigricia totius corporis, stupore oculorū, palpebrarumq; caluicie senectus ipsa se prodit.

### De signis quibus cognoscitur patria. Cap. VI.

**I**N permutandis equis uel detrahendis, maximam fraudem patriæ solet afferre mendaciū. Volentes enim charius uendere, generosissimos fingūt. Quæ res cōpulit nos, qui per tam diuersas & longinquas peregrinationes equorū genera uniuersa cognoscimus, & in nostris stabulis sæpe nutriuimus, uniuscuiusq; nationis explicare signa uel merita. Nam ut uiliora ministeria taceamus, equestribus usibus uel maxime necessarios cōstat prælijs circeis, uel ad bellum hunnūscorum longe primo docetur utilitas patientiæ, laboris, frigoris, famis toringos. Deinde & Burgundiones iniuriæ tolerantes. Tertio loco Frigiscos, non minus uelocitate quàm cōtinuatione cursus inuictos. Postea Epirotas, Samaricos, ac Dalmatas, licet contumaces ad frena ac uiles, armis ac bellis asseuerant cruribus. Capadocū gloriosa nobilitas Hispanorū par uel proxima in circo creditur palma. Nec inferiores propè Sicilia exhibet circo, quamuis Aphrica hispani sanguinis uelocissimos præstare cōsuevit ad usum sellæ. Persis prouincijs omnibus præstat equos patrimoniorū censibus æstimatedos, tam ad uehendum molles & pios incessibus, nobilitate pretiosos, sequuntur Armeni atq; Saphareni, in qua nec Epirotas Siculosq; despexeris, si mores ac pulchritudo nō deferat. Hunuscis grande & aduncū caput, extantes oculi, angustæ nares, latæ maxillæ, robusta ceruix & rigida, iubæ ultra genua pendentes, maiores costæ, incurua spina, cauda syluosa, ualidissimæ tibiæ, parue bases, plenæ ac diffusæ ungulæ, ilia cauata, totumq; corpus angulosum, nulla in clunibus aruina, nulli in musculis thori, in longitudine magis quàm in altitudine statura, propensior uenter exhaustus, ossa grandia, macies grata, & quibus pulchritudinem præstet ipsa deformitas, animus moderatus & prudens, & uulnerū patiens. Persis & statura, & positione à cæteris equorū generibus nō plurimum differt, sed solius ambulationis quadam



## ARTIS VETERINARIAE

tur & quadam gratia discernuntur à cæteris, gradus est minutus et creber, et qui sedentem delectet et erigat, nec arte doceatur, sed naturæ ueluti iure præstetur. Inter colatorios enim, & eos quos totonarios uulgus appellat, ambulatura eorum media est, & cum neutri sint similes, habere aliquid creduntur ab utrisq; commune sicut probatum est. In breui amplius gratiæ, in prolixo itinere seuior patientia, animus superbus, & nisi labore subiugatus, assidue aduersum equitem contumax mens, tumens, prudens, et quod mirum est, in tanto feruore cautissime decoris est obseruantior, incuruata in arcum cervice, ut recumbere uideatur in pectore.

### De temporibus uitæ. Cap. VII.

**A**etas longæua Persis, Hunnicis, Epirotis, ac Siculis: breuior Hispanis ac Numidis. Frequens opinio est Barbaricis nulla adhibenda medicamina, quod usq; adeo naturæ beneficio egroti cōualescant, ut eis nocitura sit cura. Sed falsa erat ista persuasio. Nam quanto fortiora membra sunt, tanto diutius uiuunt, si ex aëre uenientibus medela non desit. Spadonibus tamen inter authores constitit sanguinem de matrice nunquam, nisi forte ex nimia & extrema necessitate, tollendum: propterea quod caloris maximā partem cum testibus amiserunt. De palato tamen si non impediat negligētia, omnibus propè mensibus tam spadonibus, quàm testiculatis, mi uendus est sanguis. Admissarij uero si cohibeantur à uenere, ubi dematriculati fuerint, cecari sæpe dicuntur. Quamuis eo anno quo admissam faciunt, non sit eis uena laxanda, ne generationi intentum corpus cura geminæ necessitatis exhauriat. Studiosis equorum, quæ cura stabuli, qui alimentorum cultus, quæ obseruationis sollicitudo præstanda sit, primus ac secundus indicat liber. Nūc decursis omnibus his, quæ huius artis doctrina possidet, ad compositiones necessariarum potionum medicamentorumq; descendimus, in quibus & explorata congeßimus, & ea quæ non tam ad utilitatem curandi, quàm ob caritatem emendi Mulomedicorum cupiditas inflauerat submouimus. Constat namq; non tam multis neq; pretiosis speciebus, sed paucis, et ad causam de qua agitur accommodis posse sanari. Primum igitur ut pingui sint iumenta tam in currilibus quàm in sellaribus decet, deinde ut sana permaneant, post ut egrotæ curentur, confectiones (ut dictum est) medicaminum proferemus electas



electas ex authoribus multis, de experimentis manifestissimis approbatas.

Potio ad reficienda animalia. Ca. VIII.

**T**raditur Chiron ad reficienda iumenta uel curanda, hanc addidisse portionem, qua internos extergeat morbos, qua tuſſim reprimat, uulſos ac tuſſicos curet: Ptisanæ sextarium, lini seminis heminam, croci unciam unam, intestinum porcinum recens, quod longanonem uocant, prius diligenter lotum, uel acronem; quæ si in præsentia forte non suppetunt, hedinum caput cum pedibus & intestinis ac uentre, & diligenter quasi ad hominum usus curatum, in cacabum mittis, addes superioribus hyssopi fascēs duos, cochleas germanas purgatas quindecim, bulbos quindecim, ficus duplices uiginti, rutæ fasciculum unum, baccarum lauri sextarium unum tritum, dactylos uiginti, allij purgati capita tria, sepi caprini uncias sex, pulegij sicci fasciculum. Quæ omnia trita decoquis in aqua cisternina uel cœlesti, donec liquefacta carne defluant ossa: sed aquam sæpius adijcies, ne medicamentum ustura constringat. Sed cum spissum uideris, colabis, abiectisq; excrementis & ossibus, tracanti uncias tres pridie calida infusas ut inturgescat & solui possit, adijcies, passi sextarios tres, oua cruda sex, olei rosati oua plena sex, butyri resoluti uncias tres, anagallici uncias tres, amili uncias tres, pulueris quadrigarij uncias tres, lomenti fabæ .i. farina sextarium: hæc omnia ita temperabis, ut per cornu defluant, & sextarios singulos ieiunis animalibus per triduum dabis. Et si uolueris septem diebus interpositis repetis & das à capite portionē. Iumenta à morbis uindicat & custodit: Gentianæ, aristologiæ rotundæ, myrrhæ trogloditis, rasuræ eboris, & baccarum lauri æquis ponderibus puluis immixtus, ex quo grade cochleare plenum sumis, Addes hyssopi triti scrupulos quatuor, mellis uel passi uncias tres, uini sextarium, gisni resoluti pastillum unum, post cursum siue post laborem conditi bene (piperati) al's (præparati) heminam adijcies, æstate roris uel absynthij tantundem, & per os dabis ad cornu. Si æstu animal fatigatur, puscā cū pulegio trito mīscēs, narēsque & faciem confouebis, oua quoque trita cum hemina uini ueteris optimi faucibus infundis, ut per oui refrigerium uini uirtus accrescat. Maciē languoremq; depellit, si semiunciam sulphuris cū myrrhæ scrupulis 4 in puluerē resolutis ouū crudū et uini ueteris sextarius addatur, frequēterq; p fauces detur.

R

2

Diapenton



## ARTIS VETERINARIAE

Diapenton est (ut supra retulimus) necessariū pluribus causis ac morbis, & semper diligenti cofectione seruandum: Gentianæ, aristologiæ rotundæ, myrrhæ, rasuræ eboris, & baccarum lauri, de recentibus speciebus in unū redactis minutissimus puluis, ex hoc febrientibus plenum cochleare cū tribus uncijis mellis, & aquæ tepidæ sextario, in qua radices iunci, & apiū sufficiens decoctum fuerit, per os dabis, ita ut triduo similiter cura procedat. Idem puluis si ultra cochleariū cū sextario uini ueteris, & olei uiridis hemina detur, animal à quibuslibet uenenis, uel serpentū, aut bestiolarū morsibus liberat. Cui si piperis atq; pulegij, necnon etiā cymini pulueris aliud cochleare addideris, & cū uini ueteris sextario dederis, omne frigus expellit.

### Ad tussim & uulsos. Caput .IX.

**T**ussim quoq; insanabilem curat cū hemina passi, & tribus uncijis olei & ouo crudo, si per triduū defundis faucibus, addito fabæ polline, & fœnugræco binis cochlearibus. Præterea ualde tussientibus prodest, fabæ frixæ sextarius sine sale coctus, sepi caprini uncia 3. alij purgati capita 3. decocta cum succo ptisanæ, data per triduū. Quo medicamento ualidius creditur: ficus siccae pondera 2. fœnigræci sextariū, tracanti uncia, pridie in calida infusa, anagallici uncia, rutæ uiridis fasciculū, apij fasciculos tres, pariter in aqua diutissime decoques, & faucibus per triduū defundes. Curare etiā uulsos creditur, si septē uncias cineris mūdissimi colligas, addasq; olei uncias tres, bulbos tritos vij. anagallici uncia, butyri uncia, sepi caprini uncia, mellis uncias 3. plantaginis uiridis tritæ uncias 3. passi hemina, ptisanæ uel lini seminis hemina: quæ ita temperata ut per cornu defluant, per triduū, uel ut neceſſitas cogit per plures dies, ieiunis singulos sextarios dabis. Desperatam tussim sæpe curauit potio uilis ac facilis: pulueris ex faba uncias sex, pulueris ex fœnigræco uncias sex, enulæ tunsæ siccae pulueris uncias 6. pulueris anagallici tūsi uncias 3. butyri uncias 6. quæ omnia cū tribus boni uini sextarijs additoq; passi sextario uno semis, pariter agtabis, & uni equo ieiuno ante lucem bina cornua per os dabis, donec omnē ebibat potionē. Curā quoq; nō parū profuisse experimenta docuerūt, hæc ratione compositā: fabæ frixæ sextariū sine sale decoques, addesq; sepi hircini resoluti uncias 3. butyri uncias 3. in mortario deteres uniuersa, Præterea fœnigræci sextariū bene purgatū feruere



feruere facies, primamq; aquā inter initia feruores effundes, addesq; aquae sextarios v. pinguiſſimas caricās xx. & liquiritiae uncias 4. pariter decoquas donec aqua ad tres sextarios redigatur, in mortario deteris ſoenigracū, liquiritiam & caricās, miſcesq; cū faba, ſupfundis etiam calidā in qua caricā cū cæteris coctæ ſunt; cōparatisq; oībus ſi liquor ſpiſſior fuerit, tantū paſſi addis ut per cornu facile poſſit exire. diebus plurimis ex eo per os ſingulos sextarios tuſſientibus dabis.

### Ad coſſos, uermes, uel tineas. Ca. X.

**C**oſſos, uermes, uel tineas, cæteraq; animalia uentris extinguit, ſi hemina cineris ex oliuæ ligno arido collecti, cū hemina olei uiridis p tri duū dabis ad cornu. Alia quoq; conſectio, ſed quæ ſæpe mortiferā liberat paſſionē: pulueris ſantonici, itemq; abſynthij pontici, necnō lupini crudi, & herbe centaureæ, & erui pollinis, et ſeminis raphani binas uncias mit tis, addisq; cornu ceruini uncia, ſinopidis pontici paſtillos tres, opopanacis ſemiuncia, uini tenetani uel alterius aſteri sextarios 2. olei uiridis sextariū, quæ tepefaicta ita aīali defundis, ut per os cornu accipiat, in cliuo conſtitutū, quatenus ſuccus facilius ad interiora pueniat. Poſtero die idem aīal prouum conſtituatur in cliuo, & per clyſterē illius tepidæ potionis sextarius ingera tur, quatenus alternis diebus ex utraq; parte inieicta potio, coagulare qđ ap pellatur, poſſit infundere, in quo illæ noxiæ beſtiolæ coguntur, & pertuſo uē triculo ex cruciata doloribus aīalia pereunt. Eſt et tertia conſectio nō minus ualida; Radicis capparis ſiculi, uel baccas cū folijs ad unā librā deteris pa riterq; cōmiſces, addisq; aceti sextarios 2. Quod medicamentū interdū per os (ſicut ſuperius dictum eſt) interdum per inteſtinū inijcis animali, ut inter nos hoſtes potionis aſteritate conſumas.

### Aduerſum omnia genera morborum. Ca. XI.

**A**duerſum oīa genera morborū ſalutaris conſectio præparāda eſt, ut al's (Caſſia etc.) inter ipſa initia ex cōditis poſſit occurrī. (Cauſa) enim medicinæ quæ renda eſt: Myrrhæ librā, thuris maſculi librā, mali punici corij tun ſi lib. pipis uncias 3. croci uncias 3. acatiæ ruſæ ſelibrā (cathimiæ) butrotis ſe al's (caſmiæ) librā, reſinæ uſtæ ſelibrā, abſynthij pontici ſelibrā, pulueris ſerpilli ſelibrā, betonica ſelibrā, centaureæ ſelibram, ſagapini ſelib. ſaxifragæ ſelib. peucedani ſelib.

R 3



## ARTIS VETERINARIAE

ni selib. quæ omnia bene tusa & cribrata in mellis optimi 3. sextarijs misce, et ad carbonem leuiter paululum coquis, post in uase stagnæo uel uitreo condita seruas, ex qua confectiōe morbidis si febriunt ad diē singula cochlearia maiora cummulata cum hemina aquæ tepidæ & olei floris tribus uncijs dabis. Quod si absq; febre sunt morbidī, uel conualescere etiam cœperint, cum uino & oleo plurimis diebus dabis, donec animal liberetur. quàm ualidiſſimam & approbatam noueris potionem.

### Confectio suffimentorum salutaris. Cap. XII.

**S**uffimentorum compositio fascinum pellit, lustrat animal, fugat dæmones, submouet morbos. Odor namq; fumi ac spiritus per os ac nares ingrediens, penetrat ad ulcerum omnes recessus, ac curat sæpius loca quæ potiones non potuerunt curare. Etiam in hominibus suffimentorum uapor præcipue sequitur. Deniq; desperatos & periculosissimos morbos, aut sicut **Mulomedici** adserunt, non ex pabulo aut aquarum uitio, sed aëris corruptione descendentes. Et ideo facilius languorem quem pestilens morbus ingessit, suffimenti salubris huius curat adflatus. Ac talis compositio suffimentorum: Sulphuris uiui librā, bituminis iudaici librā, opopanax unc. 3. galbani selibrā, castorei selibrā, (ciceris) crudi selibrā, albitis selibrā, salis armoniaci unc. 3. rasuræ cornu ceruini unc. 3. sinopidis unc. 3. gagatis scæi unc. 3. lapidis gagatis unc. 3. lapidis ematitis unc. 1. lapidis sideritis unc. 1. lapidis argeritis unc. 1. caballiones marinos 7. stellas marinas 4. pallas marinas 7. caudas marinas 7. ungues marinos 7. uuæ marinæ unc. 3. modullæ tedæ pineæ pōdera 3. cedriæ pond. 3. picis liquidæ pond. 3. ossa sepiæ 7. hæc siccata piter denterūtur atq; miscētur, ex qbus unū cochleare, cū opus fuerit, uiuis carbōibus aspergis, et cooperto capite, ut fumū p os naresq; suscipiat aīal suffis. Qd suffimentū præter curam iumentorum, sanat incurrentes hoīm passiōes, grandinemq; depellit, dæmones abigit & laruas.

### Compositio pulueris quadrigarij. Ca. XIII.

**Q**uadrigariū puluerē uocāt, q ex diuerso pigmentorū genere mixtus et p se adiuuat aīalia, et alijs potionibus pro modo uel curatiōe miscetur. Huius **Chiron** talē cōpositionē saluberrimā credit: Tracanti pōdera 3. aloës unc. 6. myrrhæ unc. 6. et 3. costi unc. 1. et 3. armoniaci un. 1. & scrup



1. cassie unc. 1. 2. gentiane lib. 1. aristologie lib. cetauree lib. betonice  
 lib. saxifrage librā, sansuci lib. opij lib. abrotani lib. eupatorij unc. 6. carda  
 momi unc. 6. folij unc. 3. spice nardi unc. 3. spice celtice unc. 6. asari lib. dauci  
 unc. 3. castorij unc. 6. opopanax unc. 6. galbani unc. 6. strutij unc. 6. panacis  
 radice unc. 6. ligritie unc. 6. absynthij fascēs 3. succi herbe peristerei sicce et  
 cribrate unc. 5. hæc oīa pariter cōteres, et diligentissime in uase uitreo uel sta  
 gneo seruabis. Pelagonius uero quadrigarij pulueris eiusmodi cōposuit cō  
 fectionē: Cinnamomi, spice syriacæ, spice indicæ, croci siculi, myrrhe troglo  
 ditis, scieni, pipis nigri, piperis longi, mannæ croci, betonice, catie nigre, tri  
 xaginis, folij, nardi lentici. i. cepe indicis, nardi, storacis, acori pontici, thuris  
 masculi, irisillyricæ, thymi cretici, pipis albi, calami aromatici, asari pōtici,  
 petroselini, mannæ croci, mali terreni, gētianæ, rose aride, cassiæ fistulæ, enu  
 le; oīa æquis ponderibus pro modo aīaliū misces, conteris, cribras, in pixide  
 uel uitreo doīo cōdis, et cū opus fuerit, singula cochlearia, uel amplius, si ui  
 res patiūtur iumentis singulis dabis, addito uino et oleo. Interdū alijs potiōi  
 bus misces, si ratio artis uel cura mādauerit. Absirtus quadrigariū pulue  
 rem hac ratione cōposuit; Folū, spice nardi, crocus, piper album, piper lon  
 gum, piper nigrum, opopanax radix, cassia nidafantis, cassia marmalitis,  
 cassia nar. lina, irisillyrica, apij semen, malum terre, peucedanū, sauina, gen  
 tiana, herba rosina, thymum, myrrha, trixago, costum, thus masculum, gesse  
 mantium, malam punicum, calamum aromaticum, rosa sicca, ruta agrestis,  
 petroselinum, aristologia longa, amomum, calamum syriacum, herba arte  
 misia; hæc omnia pro numero animalium preparas æquis ponderibus inter  
 misces et tundis, cribrāsque, et seruabis, aduersus passionēs usus.

### Compositio Caustici. Cap. XIII.

**C**austricum humectata siccatur, laxata constringit, luxata parat, læsa cō  
 firmat. Huius Chiron talem compositionem demonstrat: Bitumi  
 nis iudaici pondera duo, bituminis apollonij pondera duo, mannæ  
 thuris uncias sex, bdellij arabici uncias duas, medullæ cruine pondera  
 duo, propulei uncias duas, galbani uncias duas, guttæ storacis uncias duas,  
 ceræ communis pondera duo, resinæ cabialis libram unam, uisci italici un  
 cias 3. apoximæ unc. duas, succi hyssopi unc. 2. guttæ armoniacæ unc. 2. picis  
 britiæ



## ARTIS VETERINARIAE

brittie librā. Pelagonius causticū, quod suffusiones uescasq; siccaret in genibus uel articulis, hac ratione cōposuit: Cerae punice librā, resinæ pondera duo & semis, galbani uncias 3. asphalti iudaici pondera 2. myrrhæ secundariæ pondera 2. bituminis librā, armonici uncias 6. costi uncias 6. Verū cetera decoquis in cacabo fictili nouo, qui cum refrixerit, addis asphaltum et armoniacum et costū pro mēsurā, qua scriptū est, tritum ad modum farinae, & agitas bis, & iterū coques ut sit una substantia, quo uteris aduersum uenas & uescas & suffusiones, quæ nascūtur in genibus, aut in tibijs, aut inter nodos, aut in articulis, usq; eo ut ossulagnem curare credantur. Malagma quoq; causticum hac uoluit ratione componi: Picis pondera duo, cerae pondera 2. galbani uncias 3. resinæ librā, adipis taurinæ pondera 2. bdellij uncias 7. thuris polinis uncias 3. resinæ terbentinæ uncias sex, uisci pondera 2. glutis uncias 3.

Absirtus huiusmodi causticum hac ratione composuit, glandularis resinæ frixæ uncias 3. picis duræ uncias 3. bituminis iudaici uncias 3. euisci uncias 3. galbani uncias 3. bituminis græci uncias 3. hæc omnia in uino decoquis. Bitumen uero contundis & superimittis.

### Compositio malagmæ. Ca. XV.

**C**ompositio malagmæ ad tumores duros & ueteres: Galbani uncias duas, resinæ librā, armoniaci selibrā, picis britiæ selibrā, cerae librā, olei quod temperare possit. Item malagma ad tumores duros & ueteres. Galbani libras 2. armoniaci selibrā, resinæ terbentinæ selibrā, opopanax lib. storacis libram, cerae rusæ librā, bdellij lib. piperis albi unc. 1. bacca lauri lib. piperis lōgi unc. 1. picis britiæ selib. olei irini quantū sufficit.

### Compositio Collyrii fistularis. Ca. XVI.

**C**ollyrium fistulare, quod conficitur ut mittatur in fistulas uulnerrum quæ ab initio curata fuerint negligenter. Formatur aut ad mensuram ipsius fistulæ, ut cū immissum fuerit eadē possit implere, ut celerius iā consumpta duricia, caro uiua ducat solidam cicatricē: Misi librā, feculæ lib. eruginis lib. calcitis librā, cymini uncias sex, teres cū aceto, et collyria facies.

Item aliter componitur collyrium fistulare: Misi, eruginis, calcitis, lib. sin  
als (lactis) gulas, mellis unc. sex (zungitis) pondera 2. coquas ex uino ueteri, pastillosq; inde facies fistulis inserendos.

Compositio



## Compositio malagmæ crudæ. Cap. XVII.

**C**alcis uiuæ libras 2. sinopidis alexandrini librā, ficus siccæ uncias 6.  
axungie quantum sufficit, immisces, contundis, & uteris.

## Compositio syncrismæ. Ca. XVIII.

**C**eræ rufæ pondera duo, resinæ frixæ pond. 2. olei laurini librā, sepi-  
taurini librā, axungie libram, medullæ ceruinæ lib. olei cyprini, eru-  
ginis, hyssopi, axungie ueteris libras singulas; hæc omnia pariter ad  
carbones decoquis & uteris.

## Compositio Traumatici. Cap. XIX.

**T**raumaticum medicamentū curationi uulnerū ualde cōuenit. Nā ab-  
sumpta putredine, uiuā carnē ad sanitatē reducit. Huius talis est com-  
positio: Misi librā, calcitis pondera 2. eruginis librā, pariter colabis,  
& supra tegulam in ignē pones, et coques ut rubeū fiat. Post in mortario te-  
res, & ad similitudinē farinæ puluerē facies. Deinde duos sextarios mellis in  
olla noua coquis cū uino, & cū feruere cōeperit, puluerē superscriptum agi-  
tabis, & pariter decoques, refrigeratōq; ad cancrumatas plagas, ad fami-  
cem & cicatrices reducendas uteris. Traumaticum quoq; hac ratione com-  
ponitur: Misi, cathimie, aloes (acori) libras singulas, eruginis libras 2. calci-  
tis librā, mellis lib. 2. in olla noua decoques, refrigeratōq; uteris.

## Compositio malagmæ Basilicæ. Ca. XX.

**M**alagmæ quoq; istiusmodi compositio approbata est: Mellis librā,  
galbani, storacis, bdellij, piperis albi singulas libras, armoniaci pon-  
dera duo, medullæ ceruinæ, baccarū lauri añ libram, thuris pollinis  
uncias 2. sepi caprini uncias 5.

## Compositio alia malagmæ. Cap. XXI.

**M**alagmæ quoq; medicamentū hac ratione componitur: Armoniaci  
uncias tres, ceræ librā, nitri floris unc. 2. resinæ terbetinæ pōdera  
duo, storacis uncias 3. baccarū lauri unc. 6. olei cyprini unc. 3. olei  
laurini uncias 3. medullæ ceruinæ unc. 6. olei rosati uncias 3. adipis anserinæ  
uncias 6. hyssopi unc. 4. adipis ceruinæ unc. 6. opopanacis unc. 6. piperis al-  
bi unc.



## ARTIS VETERINARIAE

bi uncias 2. galbani uncias tres, axungiae ueteris libram, aceti acerrimi hemi-  
nam, thuris masculi uncias 4.

### Compositio prima anacollimatis. Ca. XXII.

**A**bsirtus compositione anacollimatis eiusmodi composuit et produxit: Floris nitri sextarium, opopanax uncias tres, croci siculi unc. 2. pipis albi unciam, pollinis thuris unc. 3. cochleas contusas x. bulbos xx. aueclanas xx. quae omnia contusa et permixta, si aceto temperaris, diuulsa coniungis. Efficacius tamen est, si locis dolorosis emissum sanguinem ipsius animalis addideris. Compositio syncrismæ. Storacis uncias 4. armoniaci unc. tres, medullæ ceruinæ unc. 2. olei glaucini unc. 6. olei cyprini unc. 3. seui taurini unc. 3. resinae terbentinae uncias 4. adipis ursinae uncias 3. adipis leoninae uncias 4. propulei unc. 3. olei ueteris uncias 6. axungiae ueteris librā, olei sauren-  
sis lib. opopanax, galbani unc. 3. hæc ad carbones lentis uaporibus deco-  
quuntur, et unctionem saluberrimam præstant.

### Compositio malagmæ crudæ. Ca. XXIII.

**C**ompositio malagmæ crudæ talis est: ceræ punice se librā, armoniaci se librā, bdellij unc. 3. storacis uncias 2. sagapini unc. 4. thuris pollinis unc. 6. olei ueteris unc. 4. propulei uncias 2. medullæ ceruinæ unc. 6. sepi taurini unc. 2. resinae frixæ unc. 2. adipis ursinae unc. 2. adipis leonis un-  
cias 2. opopanax, baccarū lauri añ unc. 2. olei cyprini unc. 4. gentianæ unc. tres, resinae colophonie unc. 6. galbani uncias 6. Itē alia compositio malag-  
mæ: Ceræ, armoniaci añ lib. storacis unc. 6. sagapini unc. 3. thuris pollinis un-  
cias 3. medullæ ceruinæ unc. 4. opij hispani unc. 2. propulei uncias 4. sepi ca-  
prini uncias 6. galbani uncias 6. picis britiæ unc. 4. resinae terbentinae unc. 3. resinae frixæ uncias 4. aceti acerrimi un. 4. olei lentiscini unc. 6. olei irini un. 4.

### Compositio malagmæ ad uligines. Ca. XXIII.

**C**ompositio malagmæ ad uligines. Salis afri lib. 1. bulbi libram, sulphu-  
ris libram 1. misce libras 2. olei lib. his coctis diligenter, uteris.

### Compositio malagmæ ad neruos. Ca. XXV.

**S**ulphuris uiui, aluminis, resinae, picis britiæ añ lib. 1. ceræ pond. 2. medul-  
læ ceruinæ lib. 1. hæc omnia pariter diu agitas aut uerberas.



## Compositio Traumatici. Cap. XXVI.

**C**ompositio traumatici. Gallæ unc. 4. æris usti unc. 3. corticis mali punici unc. 3. misî unc. 4. uini unc. 1. aceti unc. 3. in olla noua excoquis et

## Compositio Collyriorum. Ca. XXVII. (uteris.

Compositiones collyriorû Absirti, Pelagonij, Chironisq; subiecimus.

**c** Ad album enim de oculis tollendû & abstergēdum Absirtus tradidit: nuces auellanas combustas donec redigantur in cineres, in mortario deteres, addesq; mannæ thuris idē pondus, quæ diutissime trita, & melle optimo adiecto cōprehendātur, & sic inungatur aīal. Idem Absirtus eiusmodi collyriū laudat. Piperis albi grana 8. mellis attici unc. 2. croci unc. 2. sepia marinæ (diligenter statissim) & rutæ unc. 2. balsami unc. 1. Pelagonius tale collyrium monstrat (propter). Oleū, sal, resinam, cerusam, opobalsamū, addito melle deteris atq; cōponis, alternis diebus inducis usq; ad sanitatē. Nardinū quoq; collyriū hac ratione composuit. Violæ unc. 1. spicæ nardi uncia semis, cassiæ, myrrhæ unc. 3. croci unc. 3. olei cyprini unc. 6. pipis albi unc. 2. cymini unc. 3. Item alia collyria cōposuit. opobalsami, croci, myrrhæ, salis hispani, lepidis, ossis sepia singulas uncias, cathimiæ unc. 2. afronitri unc. 1. mellis attici librā. Chiron etiā uetera glaucomata hac collyrij indicat confectiōe purgari. Cornu bubulini extremū ubi solidū est cōbures, ac thuris masculi puluerē, stercoris quoq; humani cōbusti & salis armoniaci pari mēsurā puluerem facies, piper longū, ossa sepia, flos eruginis, uetus uinū, crocus, ruta, pariter detrita cōmiscēs, addito optimo melle qđ sufficit, & inungis. Aliud quoq; collyriū simile cōposuit. Ossa sepia marinæ, crocus, myrrha, trogloditis; item sal ac stercus crocodili, hæc oīa pariter ac diutissime deteruntur, & bene trita cernuntur, additoq; optimo melle unctionis utilitatē aīalibus præstat. Licet parua & propē nulla de his, quæ diuersi authores retulerūt (præterissent) doceamus, tamen quæcunq; uidebantur probata conscripsimus. Verum ne longior liber confusionem magis legentibus, quā instructionē uideretur afferre, modū plenum credimus faciendum. Aliud iterum uerumq; commonentes, ut diligenti cura passionum occurratur exordijs. Nā etiam incurabiles ægitudines, si præsentēs fuerint ui, medentis arte uincuntur. In ueteratas causas etiam faciles, curari sæpe nō posse legi.



## ARTIS VETERINARIAE

### Alia quaedam medicamentorum genera.

**Cephalicum**, quod facit ad omnia uulnera difficilia claudenda et sup-  
plenda; Herbe panacis radices, thus masculum, myrrham, pollinē crui, ro-  
se folia arida bene trita et cribrata. hic puluis cōfectus difficilia uulnera clau-  
dit ac curat. Nunc etiā si melle decocto, & huic medicamēto mixto collyriū  
facias, et altis sub uulneribus fistulae subijcias, citius supplere et sanare cogit.

**Medicamentum consuetum**, in usu quotidiano necessarium,  
propter compendium & moras ita facies: Eruginem, chalcitem, aeris florē,  
æs ustū; hæc bene trita et cribrata æquo pondere catastaticum faciūt, quod  
carnē supercrescentem comedendo effouet. Hoc idem cum aceto & melle de-  
coctum ad mellis crassitudinem, facies medicamentū, quod facit ad omnia uul-  
nera & cancos elympidanda, & ossa scabrosa.

**Chlora medicamentum**, quod facit ad omnia uulnera complete  
lympidanda, uel sine difficultate claudenda: cerā punicā, resinam terbentinā  
medullam ceruinam, eruginem, oleum, ita conficies quantum sufficit.

**Tetrapharmacum**, quod facit ad omnia uulnera elympidanda, &  
uelocius curanda († ualde per hoc medicamentum cataloticum) Adipē tau-  
rinā, cerā, picem, oleū. Igitur medicamentū, quod supra dixi cataloticū est.

**Glicium**, quod facit ad omnia uulnera sordida et cancosa: Amurcā,  
salem, acetum: his mixtis quantum uolueris ad crassitudinē mellis uteris.

**Ostoclare medicamentum**, qđ facit ad oīa ossicula, et († dariscus  
quo loco factum si deiiciendum uolueris) Picem liquidam, axungiam ueterē,  
eruginem bene tritam & admixtam, colas bene coctum, post decoctionē su-  
prascripta purgat uulnera diligenter.

**Stypticum**, quod facit ad omnia uulnera humecta, et fongos exiccā-  
dos: Alumen scissum, gallas minores, cortices mali granati, subcorticem de  
ipsa arbore. hæc oīa trita, puluis ipsius uulneribus exiccādis ualde prodest.

**Medicamentum** quod facit ad omnia uulnera claudenda: Absyn-  
thium, sinopidem, lepidam. hæc tria bene commixta faciunt medicamentum  
siccum, quod ad omnia uulnera prodest.

**Implectoricum medicamētum**, quod facit ad omnia caua sup-  
plenda: Pollinem thuris, pollinem herbi, lepidam. hæc bene trita medicamen-  
tum



tum faciunt ad supplenda uel elympidanda uulnera.

Ad oculorum rupturas & tuniculas seruandas prodest, si sel caprinum lacti caprino misceatur, & sic penna nigra oculi inungantur. Ad oculorum album siue glaucoma sic facies: uini sextarios 4. gariofloris sextarium unum, mellis uncias 4. pariter decoquis et uteris. Ad (uecentē) oculum percussum: Croci, myrrhæ, thuris masculi, gummi, medullæ ueruccinæ, anagallici succi, mellis, cardami, binas uncias.

Syncrisma: Cereusæ pondera 2. axungie pondera 4. opopanax uncias 2. olei ueteris pond. 2. galbani unc. 3. myrrhæ pond. 4. armoniæ pō. 3. olei cyprini pond. 4. medullæ ceruinæ pond. 2. hyssopi pond. 2. storacis pōd. 4. olei lentiscini pondera 4.

Syncrisma ad alia genera: Galbani pond. 2. opopanax pond. 1. cereusæ pond. 4. medullæ ceruinæ pond. 3. thuris masculi pond. 2. piperis albi pondus 1. resine terbentinæ pond. 3. storacis pond. 1. adipis anserinæ pond. semis, euforbij uncias 6. adipis leoninæ, mellis, castorei, libras singulas, olei myrrhæ lib. 2. olei lentiscini pond. 2. olei syriaci lib. 2. olei ueteris lib. 2. olei mellini pondera 2. olei storacis pond. 2. opij pond. 3.

Lipparia sic facies: Spumæ argenti pondus 1. cerusæ uncias 2. uini sextarios 3. olei pondus 1. & semis, omnia conficies, & sic uteris.

Lipparia alio genere sic facies: Spumam argenti, cerusam, thus masculum, acetum album, oleum, hæc omnia in unum conteres, & cum uino mellificato admisces, & sic uteris.

Traumaticum sic facies: Chalcitidis pond. 1. misi pond. 1. semis, eruginis unciam 1. stercoris columbini pond. 1. adarcis uncias 3. & scrupulos 3. decoquis una, et sic uteris. Item alio genere ad flegmonas tollendas: Sinapis alexandrini unc. 6. fici asæ unc. 3. axungie ueteris uncias 6. aceti scrup. 3.

Item Traumaticum alio genere ad uerrucas tollendas: Floris chalcitis uncias 2. nitri uncias 2. lasari uncias 3. aceti heminā. Item alio genere ad suffraginosos: Eruginis, aluminis añ pon. 5. herbæ syderitis, ferrariæ pond. 1. aceti acris sextarium unum.

Ad flegmonas discutiendas: Radicis, erui, axungie, aceti acris, linis in linteo, & sic uteris.

Causticum ad ueruos crassos, uel quæcūq; in notitia sunt: Galbani,  
S 3 opopana



## ARTIS VETERINARIAE

opopanacis, medullæ ceruinæ, resinæ terbeninæ, armoniaci, propulei, uiolæ, thuris pollinis, bina pondera, resinæ frixæ pondera 5. bituminis pond. 3. picis duræ pond. 5. resinæ pituinæ pond. 5. ceræ pond. 5. olei cerini pond. 3. incomij pond. 2. storacis pond. 2. uisci pond. 2.

**Causticum ad neruorū dolores:** Galbani, storacis, uiolæ, propulei, resinæ singula pond. colophonix uncias sex, resinæ terbeninæ pond. 6. opopanacis pond. 1. thuris pollinis, hyssopi, armoniaci, baccæ lauri singula pond. picis britiæ pond. 1. et semis, uini (inei) pond. 1. semis, resinæ bituminis pond. 1. hæc omnia in uno cacabo coques, in linteolo induces calida.

**Malagmam cocticam** sic facies: Ceræ albæ, galbani uncias singulas, resinæ terbeninæ pond. 2. adipis taurinæ pond. 3. hyssopi pond. 2. bdellij pondus 1. semis, irisillyricæ pond. 2. adipis anserinæ pond. 1. hæc omnia decoquis & uteris.

**Malagma ad neruorum dolorem,** Ceræ unc. 6. adipis ceruinæ unc. 3. galbani piperis, armoniaci, resinæ terbeninæ uncias ternas, tracenti uncias 5. singula contundis, permisces, & uteris.

**Malagma ad neruos uexatos,** Mentæ, galbani, rubricæ, storacis, uiolæ an pond. 6. similaginis pond. 4. hæc omnia cum similagine & uino decoques in cacabo, & liquida facies, deinde similaginem & uinū in unū permiscebis, inlinis in linteolo, & alligabis feruentia.

**Malagma ad tumores** sic facies: Ceræ uncias 6. adipis ceruinæ uncias 3. galbani uncias 3. uiolæ, piperis albi uncias ternas, armoniaci unciam, resinæ terbeninæ unc. 3. storacis unc. 3. gentianæ unc. 1. singula contundis, postea permisces in uino, & sic uteris.

**Emplastrum,** Ceræ uiridis pond. 1. et semis, olei cyprini unc. 5. olei myrthini uncias 2. adipis anserinæ uncias 2. thuris pollinis unc. 2. hæc oīa in cacabum mittis, coquis, & linteolis inlinis.

**Cerotum ad ulcera, (strumenta)** pond. 2. ceræ rufæ pond. x. olei myrthini pond. 6. olei ueteris pond. 8. aluminis pond. 5. olei cyprini pond. decem, calcis pond. quinq;.

**Fomentum ad tumores siue ad duriciam quālibet** sic facies: euis-cum ex uino decoctum conteris cū axungia, & sic uteris. Si minus, herbā sauinam cōteris, et ex rosatio concoquis, & sic uteris ad sanitatem.

Compositio



Compositio ad colices, Asari pontici, petroselini, feniculi uncias singulas, piperis nigri uncias 2. marrubij mas. unc. 1. abrotani unciam semis, mellis optimi pond. 2. coques & despumabis, & hæc omnia contundes et cer nes, & sic in melle commiscebis, inde figuram facies nucis auellane, & ex a- qua dabis, et aque congruū 1. in potū. Item diebus quibus eo morbo tenetur, fe niculi seminis cum uino cochlearia tria aut quatuor fricabis in mortario, adij cies uini cibarij sextariū 1. mittes in ampullam aut cornu, & dabis ut bibat, & cum sagis bene munies.

Malagma ad neruos claudos, Sepi hircini libram, mollicidenæ selibram, resinæ libram, eruginis selibram.

Compositio ad genua. Aceti hemina, salis pusillum, æris usti seli- bram, sinopidis quod satis est.

Potio hyemalis. Croci, costi, petroselini macedonici, murrhæ, thu ris masculi, tracanti, cymini alexandrini, crocomagmæ, piperis uncias sin- gulas, uini & olei quod sufficit (oua) hæc omnia permisces, & dabis cū succo ptisanæ, cui immittis palmas xxv. bulbos xxv. hyssopi fascem (caprinos adi pes catulum breuem uiuum mittis) quem cum madefactum uideris, tunc oīa exiccabis, & adijcies olei quod sufficit, tūc illa oīa permisces & potionabis.

Potio æstiuālis. Traganti, croci, abrotani, cardamomi, glaucij, pe- troselini macedonici binas uncias, gingiberis unc. 1. hæc temperas, & cum dare cœperis, mittis quotidie heminas singulas singulis iumentis. Addes por ri sectiui, porclæ sil gallici, thus, apiū, olei afri heminam, temperabis quod sufficit & uteris. Sed hæc uide lib. 1. cap. 17.

F I N I S.

BASILEAE. ANNO. M. D. XXVIII.

EXCVDEBAT IOANNES FABER

EMMEVS IVLIACENSIS.



































